

Digitaliseret af | Digitised by



Forfatter(e) | Author(s):

Titel | Title:

Udgavebetegnelse | Edition Statement:

Udgivet år og sted | Publication time and place: København : Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1838

Fysiske størrelse | Physical extent:

Mørch, O. J. N.

Stedsegjeldende Fortegnelse over Blomsterfrø,
som ere at erholde hos O. J. N. Mørch.

2. Oplag.

36 s.

DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommersielle formål, uden at bede om tilladelse. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always remember to credit the author.





O. J. N. Mørch:

Blomsterfø.

2. Opl. 1838.

26,-74

DET KONGELIGE BIBLIOTEK



130021926524



Stedsegjeldende Fortegnelse

26.-74

o v e r

Blomsterfro,

som ere at erholde hos

D. J. N. Mørch,

botanisk Gartner i Kjøbenhavn.

Andet Oplag.

NB. Nummerne ere de samme som de foregaaende, de nyere tilkomne
ere betegnede med Bogstaver.

Kjøbenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.

1838.



Nærværende Fortegnelse er gielvende for hvert Aar; de nye Sorter, som senere komme til, bekjendtgjøres ved Supplementer, som aarlig udkomme.

Da Prisen for hvert Art er ligestor, nemlig 4 β , folger af sig selv, at Portionernes Størrelse er indrettet derefter; dog er ingen mindre, end at den er tilstrækkelig til almindelig Behov. Jeg troer paa denne Maade at gjøre det muligt for Blomsterelseren at anskaffe sig, til en lav Priis, en betydelig Mængde Arter, og det selv af de nyeste og sjeldneste Sorter.

Jeg tillader mig at giøre opmærksom paa følgende:

- 1) Ved Bestillingerne er det tilstrækkeligt blot at opgive Lobe-nummeret af de Sorter som forlanges af Afdelingen: Diverse Blomstersorter, og Bogstavet og Nummeret af de af Afdelingen: Florblomster.
- 2) I Tilfælde af at een eller anden af de forlangte Sorter ei længer havdes i Forraad, bedes bemærket, om Man ønsker den erstattet ved en anden Sort eller ikke, i første Tilfælde vilde det være hensigtsmæssigen at opgive flere Sorter, hvoraf da det bestemte Antal funde udvælges.
- 3) Dersom Man idet hele vil overlade Udvalget af Sorterne mig, og altsaa blot forlanger et vist Antal, ønskedes tillige opgivet: om til Friland eller til Potte, hoie eller lave, for Sol eller Stygge, eller til hvilket andet særligt Diemed man maasee funde forlange enten alle eller en Deel af de attræede Arter udføgte.

- 4) Da jeg bestreber mig for at staffe Blomsterfros fra de paalideligste Kilder, og da dette, især hvad Florblomsterne angaaer kun ene og alene kan erholdes fra saadanne, som besatte sig med disse Planters specielle Cultur, og hidtil har maattet søges i Uelandet, skulde det være mig kjært, at kunne tage mit Forraad her i Landet; jeg beder derfor de Gartnere, som ønske at afhørende deres selvavlede Blomsterfros, i frankerte Breve at underrette mig, senest i hvert Aars November eller December Maaned om hvilke Sorter, og til hvilken Priis pr. Lod eller pr. Pund der kunne overlades mig.
-

Om Dyrkningen af eenaarige Biirplanter,

Med Hensyn til Dyrkningsmaaden af de eenaarige Sommerværter kunne disse bequemmest inddeltes i tvende Hovedafdelinger, nemlig de som strax saaes paa Friland, og de som først saaes i Mistbœnk og siden udplantes.

A. Friland.

De forhen horende Værter inddeltes igjen i tvende Underafdelinger.

- 1) Dem, som saaes paa Blivestedet først i April eller saa tidligt Jorden er bequem.

Dertil høre de haardføre Værter, hvis Frs udfordre jvn Fngtighed, og i Neglen en Tid af 14 Dage à 3 Uger til at spire, ligesom de fleste ei taale at omplantes, da de derved kun vantrives. Disse ere betegnede med Bogstavet: a.

- 2) Dem, som saaes midt i Mai, eller naar man pleier at

lægge Stangbonner og Agurker — efter gammel Vedtægt, naar Kirsebærtræet blomstrer. Disse ere betegnede med Bogstavet: b.

B. I Mistbænk.

Hertil høre saadanne Værter, der ellers vilde blomstre sildigt og intet Fro give — eller ogsaa hvis Flor man ønsker tidligere, f. Ex. Sommerlevkoier; disse saaes af den Alarsag først i April paa Mistbænk eller i Mangel deraf i Potte. De kunne ogsaa saaes paa Friland paa samme Tid som de under § 2 anførte, men paa et solrigt, varmtliggende Sted, f. Ex. paa en Rabat, ved en Bygning, Muur eller Plankeværk, som vender mod Middagssolen, og da siden derfra udplantes. Disse ere betegnede med Bogstavet c.

Almindelige Regler ved Dyrkningen.

De Sorter, som have meget fint Fro bedækkes kun med et meget fint Lag Jord; det er endog tilstrækkeligt blot at trykke Froet fast i Jorden med Vagen af Haanden; de større Frosorter bedækkes med $\frac{1}{2}$ Tomme Jord, og de største, som Lathyrus og Lupiner, lægges 1 Tomme dybt; — man saaer enten i Kredse eller i Linier.

De under begge Hovedafdelinger henhørende Planter kunne ret godt trives i en almindelig god Havejord, dog ere nogle blandt dem vanskeligere at tilfredsstille, disse maa gives en temmelig sandblandet Jord, hvori der aldeles ingen Gjedningsdele findes, saadanne ere Cuphea, Centaurea avaveolens, Clarkia, Oenothera, Salpiglossis, Zoegea leptaura.

De saakaldte toaarige Væxter faaes helst paa en Rabat i Friland i Mai Maaned, og udplantes siden; saaer man dem tidlig i April, har dette til Folge, at nogle Sorter blomstre samme Aar og døe bort om Vinteren.

Almindelig Regel ved Dyrkningen af de heri denne Fortegnelse forekommende Potteplanter.

Med Hensyn til Saaningen gjelder det samme som ovenfor er bemerket om de eenaarige Planter, derimod bor man være mere paapassende og forsiktig med Vandningen, saa at denne deels skeer vaersomt, at det fine Fro ei bortstilles, deels at Potterne hverken holdes for torre eller fugtige, hvilket funde have til Folge, at Spiren enten udtorres eller Froet raadner. I Forstningens maa man vogte de spede Planter for Middagssolen, da de ellers let falde om og bederves; og overhovedet bevare dem for store Afverslinger af Temperatur, Fugtighed og Tørke, Blæst eller Solstин, som ialmindelighed virke langt skadeligere paa de spede Planter end Jordarten — der i alle Tilfælde ei maa indeholde gjedende Substanse, men helst bestaae af sand- og leeragtige Dele; de vanskeligste i denne Henseende ere de Planter, hvis Rodder eller Stammie ere faste rige som f. Ex. Levkoier, Salpiglossis.

Med Hensyn til Spiringen vil det maastee ikke være uden Nutte her at gjenstange hvad jeg i denne Anledning har omhandlet i Havetidendens første Aargang pag. 136.

Mange Haveelssere beklage sig ofte over Frohandlerne, naar en eller anden Frosort ikke er opkommet og tillægge strax dem Skylden, uagtet den vel ofte hviler hos dem selv, og det af følgende Aarsager:

1) Naar Frostornet er bragt til at spire i Jorden ved varmt Veirlig, og Frost da indtræffer, som naer det Sted, hvor Frostornet ligger, bliver derved dets Kraft til at spire standset og tilintetgjort.

2) Øste er Frost allerede opkommet, men endnu ikke blevet bemærket, og forderves strax derpaa af en Mattefrost, eller det bliver ved den ligesom hævet ud af Jorden. Denne Udhævning af Jorden falder man i Mørge Tøllen.

3) Det hænder ofte hvor der findes Jordlopper og Snegle, at man om Morgenens glæder sig over hvor godt de unge Planter, saae, men ved Middagstid ere de fortærede af disse besværlige Gjester — har man nu ikke bemærket Planternes Fremkomst og Forsvinden saa haaber man forgjæves, at Planterne endnu skulle fremkomme.

4) Nogle saae Frost for oversigt, og bringe det ikke dybt nok i Jorden, saa at saavel Binden kan bortfore det som fuglene inden fort Tid opæde det.

5) Andre derimod gjøre det Modsatte og bringe Frost, der neppe maae bedækkes med $\frac{1}{3}$ Tomme Jord, en heel Tomme ned, hvorved det bliver umuligt, at det kan spire.

6) Fjunt Frost, som Timian, Merian, Portulak og Sellerie, samt Blomsterfrost, der er af samme Beskaffenhed, maa kun bedækkes med let og fijn Jord. Saaer man det i en tung Jord, og vander det stærkt, eller der kommer stærk Regn og slaaer Jorden fast, saa vorer sjeldent et Korn deraf, eftersom Frost forraadner under den haarde Jordskorpe, som det ikke er i stand til at gjennembryde.

7) Andre udblode først Frost og lægge det derpaa i Jorden; kommer nu ikke dertil strax fugtigt og varmt Veirlig, saa gaaer det allerede spirende Frost over i Forraadnelse, eller forstyrres af Orme, eftersom det ikke strax kan vedblive at vorre.

8) Mange feile ogsaa deri, at de naar de have faaet Frø, som det endnu er for tidligt at udsaae, gjemme det paa et fugtigt Sted, hvor det enten mugner eller bliver fortørret af Insectorer.

9) Nogle Frøesorter maae faaes meget tidligt om Foraaret, eller ogsaa om Efteraaret for at spire med Foraarsfugtigheden (især hvis Jorden er meget let og sandet), dersom man vil vente et heldigt Udfald, og det saameget mere, jo ældre Frøet er. Det er især saadanne Frøesorter, der have en haard Frøbelsædning, der i denne Henseende ere seene til at spire, og det af følgende her i Catalogen forekommende Blomsterfrøsorter, nemlig: Adonis, Argemone, Blitum, Canna, Datura, Delphinium, Eceremocarpus, Eschholtia, perennerende Lupiner, der ofte ligge et Aar, Primula, Viola etc.

Om de forskjellige Anvendelser af eenaarige Jørplanter.

De eenaarige Jørplanter eller Sommervæxter, — som man i daglig Tale kalder dem, ere i de senere Aaringer saaledes blevne forøgede, tildeels med sjonnere Sorter, at den uhyndige Kjøber ganske maa overlade Udvælget til Sælgerens Smag, der ofte kun seer paa sin egen Fordeel og folgelig helst vælger saadanne Sorter, af hvilke han har truffen rigelig Frø. Den uhyndige troer sædvanlig, at de nye Sorter maa være langt smukkere end de ældre, men dette er langtfra ikke altid Tilfældet; disse have som oftest kun Interesse for den Plantekyndige, der bør kjende enhver ny Form; saadanne nye Planter, der ei udmaerk sig ved andet end Formen, ere f. Ex. Collomia grandi-

flora og pumila, Eutoca multiflora, Gilia capitata, Lupinus micranthus, Argemone etc.; til disse høre unegtelig ogsaa en Deel af de ældre og ældste Ævirplanter, f. Ex. Amethystea cærulea, Anthemis arabica, Aretotis hypochondriaca, Bidens grandiflora, Calendula stellata, Lupinus albus, angustifolius, varius, og en utallig Mængde andre. Desvagt fortjene, de dog under visse særegne Hensyn at optages iblandt en Haves Planter, og jeg vil derfor under de efterfølgende §§ bestræbe mig for at ordne dem efter disse Hensyn. Da de saakaldte toaarige Planter i Almindelighed ogsaa henregnes til Sommerværter, fordi der dog ere nogle Sorter, der blomstre den første Sommer de ere saaede, saa følge de under en egen Afdeling.

§ 1.

Udmærkede Ævirplanter.

De udmærkede Ævirplanter, som formedelst deres Udseende fortjene Plads i enhver Have ere:

Adonis autumnalis og miniata. Amaranthus caudatus. Aster chinensis. Cacalia sonchifolia. Calandrinia grandiflora. Calendula officinalis fl. pl. Caliopsis bicolor. Carthamus tinctorius. Centaurea Cyanus, moschata, sphaerulosa. Chrysanthemum carinatum og elegans, coronarium fl. pl. Clarkia pulchella, elegans. Convolvulus tricolor. Cuphea selinoides. Datura Ceratocaulon. Delphinium Ajacis humile og Consolida fl. pl. Elychrysum lueidum. Gilia tricolor. Helianthus annuus, indicus, lenticularis. Iberis umbellata og superba. Ipomæa purpurea. Lavatera trimestris. Malope grandiflora. Nigella damascena, hispanica, orientalis. Nolana atriplicifolia, grandiflora. Oenothera Lindleyana, rosea-alba. Papaver Rhæas fl. pl.,

somniferum fl. pl. *Phaseolus multiflorus* og *bicolor*.
Polygonum orientale. *Salpiglossis* fl. Sorter. *Seabiosa atro-purpurea*. *Schizanthus pinnatus*, *humilis*, *obtusifolius*, *porrigens*, *retusus*. *Senecio elegans* fl. pl. *Tagetes erecta* fl. pl., *patula* fl. pleno. *Tropaeolum majus* og *atrosangvineum*. *Viola tricolor*, *grandiflora* og *nigra*. *Zinnia multiflora*, *tenuiflora*. *Zoegea leptaura*.

Af Toårige fortjene følgende Ópmærksomhed:

Althaea chinensis fl. pl., *ficifolia*, *rosea plena*. *Antirrhinum majus* og *bicolor*. *Campanula Medium*. *Delphinium grandiflorum*. *Dianthus barbatus* og *chinensis*. *Digitalis alba*, *Ianata*, *purpurea*. *Eschholzia californica*. *Hedysarum coronarium*. **Hesperis matronalis* og **tristis*. *Lunaria annua*. **Mirabilis jalappa* diverse Farver og **longiflora*. **Pyrethrum Parthenium* fl. pl.

NB. De med * ere tillige vellugtende.

§ 2.

Med Hensyn til Bladform.

Den mindre kyndige og smagfulde Blomstertynder antager i Almindelighed kun saadanne for ret smukke, der behage enten ved Udseende eller Vellugt; men den mere Kyndige lader sig ikke tilfredsstille med dette alene, men finder Behag i andre Egenskaber hos Planten, og dertil hører fornemmelig dens Bladform, samt dens maleriske Udtryk; dette Slags Planter ere fornemmelig kun passende for større Haver, og navnligen for Parkanlæg. Foruden en Mængde fleeraarige Urter, som for nærværende Tid hertil bruges, men som ikke vedkomme os her, høre følgende eenaarige og toaarige herhen; eenaarige: *Atriplex sanguinea*. *Datura ferox*, *Tatula*. *Malva crispa*. *Nicandra physaloides*. **Ricinus communis*. *Silybum*

Mariæ. *Sorghum caffrorum*, *nigrum*. *Zea Mais*; to-aarige: *Althaea officinalis*, *rosea plena*. *Anchusa italicica*. **Heracleum speciosum* (4—6 Alen høi). *Vercaseum speciosum*. — Anmærkn. De med * betegnede bør plantes enkelt-staaende, de andre i Grupper.

§ 3.

Til Blomsterpepper.

Af disse ville følgeligen kun gøre ved at sædes eller plantes i Masse. (See Havetidens første Aargang p. 90.)

Agrostemma Cælirosa. *Anagallis cærulea*. *Cheiranthus elius* og *maritimus*. *Convolvulus tricolor*, som man i denne Hensigt lader løbe hen ad Jorden. *Kanlfussia amelloides*. *Lonas annua*. *Lychnis corsica*. *Sanvitalia procumbens*. *Silene orchidea*, *pendula*, *vespertina*, *quinque-vulnera*. *Veronica persica*. *Viola tricolor*. — Forovrigt kan enhver lav Bært benyttes hertil, f. Ex.: *Aster*, Sommer-lejkoier og lave Riddersporer.

§ 4.

Til Grupper.

Uagtet næsten enhver Plante egner sig hertil, ere der dog visse Sorter, som paa denne Maade frembringe den bedste Virkning.

Af eenaarige:

Amaranthus caudatus, *giganteus*, *hypochondriacus*, *sanguineus*. *Lavatera trimestris*. *Malope grandiflora*. *Polygonum orientale*. *Reseda alba*. *Zea Mais*.

Af toaarige:

Agrostemma coronaria. *Antirrhinum majus*. Cam-

panula Medium. *Delphinium grandiflorum.* *Digitalis alba,*
lanata, purpurea.

§ 5.

Til ziirlige Grupper.

Hertil vælges Planter, der enten hver Sort for sig, eller blandede, afgive et ziirligt og let Udsende; vælger man den sidste Maade, saaes de i Kredse efter følgende Nummer, begyndende med Nr. 1 i Midten.

1 *Gypsophila elegans* eller *viseosa.* **2** *Schizanthus pinnatus.* **3** *Chenopodium Botrys* eller *ambrosioides.* **4** *Amethystea cærulea.* **5** *Silene Armeria.* **6** *Saponaria Uaccaria.* **7** *Silene Muscipula.* **8** *S. quinquevulnera,* **9** *Briza viridis.* **10** *S. pendula.* **11** *Briza maxima.* **12** *S. orchidea.*

§ 6.

Med Frøgjemmer af besynderlige Forme.

Astragatus cristagalli og *cristatus.* *Biserrula Pelecinus.* *Blitum capitum* og *virgatum.* *Calendula stellata.* *Catananehe lutea.* *Coronilla securidaca.* *Datura ferox,* *Tatula.* *Fumaria vesicaria.* *Glaucium fulvum,* *luteum,* *phæniceum.* *Hippocrateis multisiliquosa.* *Lunaria annua.* *Lotus tetragonolobus.* *Medicago intertexta* og *scutellata* med Flere. *Momordica Elaterium.* *Nicandra physaloides.* *Pigella damascena.* *Scabiosa stellata.* *Scorpiurus vermiculata.* *Solanum Lycopersicum* med Varieteter. *Trifolium clypeatum* og *stellatum,* samt de forskjellige Græskararter (bekjendte under Navn af Lustfurbis); ogsaa den fortskallede Ert er mærkelig.

§. 7.

Med farvede Blad.

Det er at bemærke, at man stiller dem saaledes, at Bladene sees mod Solen.

Eneårige:

Amaranthus sanguineus, giganteus, hypoehondriacus.
Atriplex sangvinea. Salvia Horminum.

Toårige:

Deta cicla brasiliensis, samt den tresfarvede Kaal.

§ 8.

Vellugtende:

Cheiranthus annuus (Sommerlevkoi). Lathyrus odrathus. Lupinus luteus og mutabilis, Redesa odorata.

Toårige:

Hesperis matronalis og tristis. Mirabilis Jalappa og longiflora.

§ 9.

Aromati^ge og sødt duftende.

Chenopodium Botrys, ambrosioides. Cynoglossum linifolium. Dracocephalum Moldavica. Eltsholzia eri-stata. Erodium mosehatum. Lonas annua. Melilotus ærulea. Mimulus mosehatus. Pyrethrum Parthenium,

§ 10.

Evighedsblomster.

Ogsaa kaldte Immorteller eller Eterneller. Foruden Blomsterne funne ogsaa Fregjemmerne af visse Sorter benyttet til bestandige Blomsterbouquetter, disse ere bemærkede med en *.

Ammobium alatum. *Briza maxima* og *virens.* *Catananche lutea.* **Cynoglossum linifolium.* *Elichrysum lucidum.* *Gomphrena globosa.* **Lunaria annua.* **Scabiosa stellata.* *Xeranthemum annum,* foruden adskillige Sorter Græsarter.

§ 11.

Til Indsatninger.

Agrostemma Cælirosa. *Aster pumilus*, *tenellus.* *Cheiranthus Chius*, *maritimus.* *Cynoglossum linifolium.* *Delphinium Ajacis humile.* *Iberis amara* og *umbellata.* *Nigella damascena* og *coaretata.* *Silene orchidea*, *pendula.* *Viola tricolor grandiflora.*

§. 12.

Sildig blomstrende

Det er ofte meget magtpaalgende, at have Sommerværter, der blomstre lige til Frosten indfunder sig. De, som naturlig fremkomme med deres Blomster til hen i November Maaned ere:

Amaranthus flere Sorter. *Calendula officinalis* fl. pl. *Carthamus tinctorius.* *Cosmea bipinnata.* *Cerinthe major.* *Chrysanthemum coronarium.* *Elichrysum lucidum.* *Galinsoga trilobata.* *Gilia capitata.* *Lopexia mexicana.* *Lupinus albus, angustifolius, luteus, multiflorus, varius.* *Polygonum orientale.* *Reseda alba* og *odorata.* *Scabiosa atropurpurea.* *Rudbeckia amplexicaulis.* *Tagetes Arterne.* *Viola.* *Xeranthemum annum* og *Ximenesia encelioides.* *Zinnia Arterne;* men ogsaa de øvrige Sommerværter funne ved at faaes sildigt frembringe en sildigere Flor, ligesom man ved oftere at afføre dem, og ei tillade dem at ansætte Fro,

kan forlænge deres Flor. Dertil høre fornemmelig: *Adonis autumnalis*, *Aster*, *Levkojer*, *Delphinier*, *Reseda*, *Lathyrus* og flere.

§ 13.

Planter til alvorlige og triste Partier,

(isærdeleshed passende for Grøfsteder).

Amaranthus Arterne. *Amethystea cærulea.* *Anthemis arabica.* *Aretotis hypochondriaca.* *Catananche lutea.* *Cerinthe major* og *minor.* *Chenopodium ambrosioides* og *Botrys.* *Datura Arterne.* *Eltsholzia cristata.* *Lotus tetragonolobus.* *Nigella Arterne.* *Nicandra physaloides.* *Reseda alba.* *Rudbeckia amplexicaulis.* *Salvia Horminum.* *Sanvitalia procumbens.* *Scabiosa atropurpurea.* *Tagetes patula.*

§ 14.

Til blandede Blomstergrupper.

Baade i større og mindre Anlæg har man ofte Partier, som man ei vil anvende synderlig Cultur paa. Saadanne besaaes hensigtsmæssigen med Fro af flere Plantearter, der trives godt sammen, give en smuk broget Blomsterflor, og forresten ei fordré føregen Omhu, ja saae sig endog selv. Imidlertid maa man dog sagttage, at ikke visse Sorter tage Overhaand. Forinden man saaer dem, blandes et vist Quantum af hver Sort Fro sammen. (Eftersee mere derom i Høvetidendens første Aargang p. 91.) De meest passende Planter hertil ere:

Adonis autumnalis og *miniata.* *Agrostemma Cælirosa.* *Amethystea cærulea.* *Anagallis cærulea.* *Argemone mexicana* *Blitum capitatum virgatum.* *Calendula*

officinalis fl. pl. *Collomia grandiflora*, *coccinea*, *pumila*.
Eutoea multiflora. *Delphinium Ajacis* fl. pl. *Nigella da-*
mascena, *coaretata*, *hispanica*. *Reseda odorata*. *Silene*
Armeria, *muscipula*, *orchidea*, *pendula*, *vespertina*, *qui-*
nquevulnera. *Viola tricolor*. *Veronica persica*.

§ 15,

Efter Dagstiden.

Da der ere nogle Planter, der kun udfolde deres Blomster om Morgenens og i Middagstunden, og efter andre om Aftenen, ville maaßke disse her anmærkede ei være uden Interesse.

Om Morgenens:

Convolvulus tricolor. *Ipomaea purpurea*. *Hibiscus Trionum* og *vesicarius*. *Madia elegans*.

Om Midtagen:

Anagallis collina, *cærulea*. *Calandrinia grandiflora*.
Calendula pluvialis. *Nolana Arterne*. *Oenothera Lindleyana* og *roseo-alba*. *Eschholzia californica*, *crocea*.

Om Aftenen:

Datura Arterne. *Mirabilis Arterne*. *Nicotiana nyctagineflora*. *Oenothera longiflora*, *odorata*.

Af denne Classification over de eenaarige Jærplanter haaber jeg at man vil overbevise sig om, at fordi en Plante ei kan henføres til den 1 § eller til de udmærkede Jærplanter, bør man dog derfor ikke ansee den for aldeles usikker eller ubrugelig, men tage de ovenfor udviklede Hensyn i Betragtning og derpaa anvise den en til dens Charakteer svarende Stilling.

I. Diverse Blomstersorter.

Sorten à 4 β pr. Portion.

Forskring over Bogstaverne.

Tr. betyder træagtige Planter.

F. " fleuraarige eller verenne Planter.

To. " toaarige Planter.

E. " eenaarige Planter.

P. W. " Potteplanter, der maa holdes varme eller i en Temperatur af 15 til 20 Graders Varme om Sommeren.

P. T. " Potteplanter, der maa holdes tempereret eller i en Varmegrad af 10 til 15 G. om Sommeren og 5 til 10 G. om Winteren.

a. " som saaes først i April paa Blivestedet, see pag. 4.

b. " som saaes midt i Mai paa Blivestedet, see pag. 4.

c. " som saaes i Mistbanke eller i Potter for siden at udplantes, see pag. 5.

d. " eenaarige Planter til Indfatninger.

ab. " ejerblaat lb. betyder leverbruunt.

br. " bruunt mr. " morterodt.

bb. " blegblaat mb. " mortefblaat.

bl. " blaat og. " orangeguulst.

ch. " castaniebruunt pr. " purpurreodt.

cr. " carminrodt pg. " vaalle eller straagult.

eg. " citronguulst rr. " rosenrodt.

fl. " fleerfarvet r. " rodt.

g. " guult sg. " svovelguulst.

gg. " guldguult sr. " flarlogenrodt.

hb. " himmelblaat tf. " teglesteensfarvret.

h. " hvidt v. " violet.

in. " incarnat eller ansigtsfarvet. vb. " violblaau.

L " lilla.

N

- 1 *Acacia Lopantha speciosa* Tr. P. T. g.
- 2 *Adonis autumnalis* E. a., Høst Adonis. 2 Jod. mr.
- 3 " *miniata* E. a., monterod dito. 2 J. sr.
- 4 *Ageratum cœruleum* E. e., blaa Ageratum. 1 J. hb.
- 5 " *mexicanum* E. e., mexicansk Ag. 1 J. hb.
- 6 *Agrostemma Cœliosa* E. a. d., Himmelrose. $\frac{1}{2}$ J. rr.
- 7 " *coronaria* To., rød Fireernellike. 2 J. sr.
- 8 " *alba* To., hvid dito. 2 J.
- 9 *Althaea chinensis* To., chinesisk Stokrose. 3 J. rr.
- 10 " *ficifolia* To., sigenbladet dito 6 J. g. br.
- 11 " *rosea plena* To., dobbelt dito i fl. Farver. 6 J.
- 12 *Amaranthus caudatus* E. b., rød Rævehale. 4 J. pr.
- 13 " E. b., hvid dito. 4 J. h.
- 14 " *bicolor* E. P. W., tosfarvet dito. r. g.
- 15 " *giganteus* E. b., Kjempe dito. 5 J. r.

- 16 Amaranthus hypocondriacus E. b., sorgende dito. 4 f. mr.
 17 " sanguineus E. b., blodrød Rævehale. 4 f. mr.
 18 " tricolor E., P. W., trefarvet dito.
 19 Amethystea cœrulea E. a. Blaamand. 2 f. mb.
 20 Ammobium alatum F., P. T., vinget Ammobium. h.
 21 Anacyclus aureus E. c., guldfarvet Anacylus. 1 f. gg.
 22 Anagallis cornuta E. a., fjedfarvet Urve. $\frac{1}{2}$ f. in.
 22a " Cœrulea E. blaa dito. $\frac{1}{2}$ f. ab.
 23 " latifolia E. a. d., bredbladet dito. $\frac{1}{2}$ f. ab.
 24 Anthemis arabica E. b., arabisk Camille. 1 f. gg.
 25 Antirrhinum majus To., Lovemund. 2 f. er.
 26 " fl. albo To., hvid Lovemund. 2 f.
 27 " variegata To., spraglet dito. 2 f. ff.
 28 " si. bicolor To., tofarvet dito. 2 f. h. cr.
 29 " siculum F., siciliansk dito. r.
 30 Aquilegia vulgaris pl. F., dodbælt Akeleie. 3 f. ff.
 31 Argemone ochroleuca E. b., guul Pigvalmue. 2 f. sg.
 32 " Barelayana E. b., Barlaigs dito. 2 f. h.
 33 " grandiflora E. b., storblomst. dito. 2 f. h.
 34 Aster chinensis E. c., chinesisk Asters, 12 diverse Farve. 1 f. ff.
 34a " pamila E., Øverg-Aster. $\frac{1}{2}$ f. ff.
 35 " nyestribet pragtsuld.
 36 " nye fugeldannet carmosin med hvidt.
 37 " nye fugelvænnet mørkeblaa.
 38 " tenellus E. a. d. $\frac{1}{2}$ f. l.
 39 Atriplex hortensis sanguineus E. a., blodrød Molde. 3 f.
 40 " Intens E. a., guul dito. 3 fod
 41 Beta cicla brasiliensis To., carmosin Mangold. 6 fod.
 42 " guul dito
 43 " farlagensrød dito.
 44 Bidens grandiflora E. b., storblomstret Brondsel. 2 f.
 45 Bisentelle auriculata E. a., vret Brillebælg. 1 f.
 46 Blitum capitatum E. a., Jordbærspinat. 1 f. r.
 47 " virgatum E. a., riisdannet dito. 1 f. r.
 48 Briza maxima E. b. d., storblomstret Bævregræs. $\frac{1}{2}$ f.
 49 " virens E. b., lysgrøn dito $\frac{1}{2}$ f.
 50 " minor E. b., lidet dito. $\frac{1}{2}$ f.
 51 Brassica oleracea alba To., hvidbladet Grønkaal. 2 f.

- 52 *Brassica oleracea tricolor* To., tresfarvet Kaaſ.
 53 *Browallia elata* E., P. W., hojstænglet Browallie. hb.
 54 *Cacalia sonchifolia* E. c., heirod Cacalie. 1 f. sr.
 54a *Cactus Ottonis* F. P. W. gg.
 55 *Calandrinia grandiflora* E. c., storblomst. Calendrinie $\frac{3}{4}$ f. v.
 56 " speciosa Tr., P. T., stjønblomst. dito. v.
 56a " speciosa nova Tr. P. T. dito nye.
 57 *Calceolaria pendula* F., P. T., hængende Loffelblomst. g.
 58 " pinnata E., P. T., finnet dito sg.
 59 " hyl rida F., P. T., 30 Sorter meleret. ff.
 60 *Calliopsis bicolor* E. c., Skjenhedseie. 3 f. gg.
 60a " basalis E. c., dito 3 f. bg.
 61 " atrosanguinea, blodrød dito. 3 f. bg.
 62 *Calendula officinalis* pl. E. a., dob. Morgenfrue. 2 f. og.
 63 " minima E. a., lidet dito. $\frac{3}{4}$ f. g.
 64 " pluvialis E. a., Regnspaaende dito. $\frac{1}{2}$ f. h.
 65 " stellata E. a., stjernedannet dito. 2 f. g.
 66 *Campanula Medium* To. storbl. Kloſſe, i 6 Farv. 2 f. b. h.
 67 " *Lorei* E. a., blaa Loreis dito. 1 f. hh.
 68 " *alba* E. a., hvid Loreis dito.
 69 " *pantagonia* E. a., femkantet dito. $\frac{1}{2}$ f. bl.
 69a " *pyramidalis* F. P. T. hb.
 70 " *Speculum album* E. a. d., hvid Venuspeil. $\frac{1}{2}$ f.
 71 " *cœroleum* E. a., blaa dito. $\frac{1}{2}$ f.
 72 " *roseum* E. a., roſenfarvet dito. $\frac{1}{2}$ f.
 73 *Canna rubra* F., P. W., indiſt Blomſteror. sr.
 74 *Capsicum annum* E., P. W., Spanſpeber.
 75 " " fr. Inteo, Spanſp. med gule Frugter.
 76 " " fr. rotundo med runde Frugter.
 77 *Carthamus tinctorius* E. c., Saflor. 3 f. og.
 78 *Catananche cœrulea* F., blaa Raslebomst. 2 f. ab.
 79 " *lutea* E. a., guul dito 1 f. g.
 80 *Belosia cristata* E., P. W., Hanekam i flere Farver.
 81 " " rød dito.
 82 " " guul dito.
 83 " " orange dito.
 84 " " violet dito.
 85 *Centaurea americana* E. c., amerikansk Kornblomst. 4 f. v.
 (Plectocephalus americanus).

- 36 *Centaurea crocodilium* E. b., Krokodilsblomst dito. 1 f. g.
 37 " *cyanus* E. a., danskt Kornblomst i forst. Farver. 2 f. fl.
 38 " *moschata* E. b., blaa Turban Kornblomst. 2 f. l.
 39 " *alba* E. b., hvid dito dito. 2 f.
 40 " *suaveolens* E. b., guul vellugt. dito. 1 f.
 41 *Cerinthe major* E. b., stor Borblomst. 2 f. g.
 42 " *minor* E. b., lidet dito. 2 f. g.
 43 *Cheiranthus annuus* fl. pl. E. c., dobbelte Sommer-levkoier i flere Farver. fl.
 44 " *Cheiri* To. c., blaa Gyldenlaf.
 45 " *Cheiri* To. c., morkebrunn Gyldenlaf.
 46 " *Chius* E. a. d., Chios Strandlevkoj. 1 f. l.
 47 " *maritimus* E. a. d., Strandlevkoj. ½ f. l.
 48 " *ineanus albus* To. Tr. P. T., hvid Vinterlevkoj.
 49 " *ruber* To. Tr. P. T., red dito.
 50 " *cæruleus* To. Tr. P. T., blaa dito.
 51 *Chenopodium ambrosioides* E. a., vellugt. Gaasfod. 2 f.
 52 " *Botrys* E. a., Drue dito. 2 f.
 53 " *chiloensis* E. a., Chilist dito. 2 f.
 54 *Chrysanthemum carinatum* E. b., tresfarvet Guldbl. 2 f. h.
 55 " *elegans* E. b., elegant dito. eg.
 56 " *coronarium alb.* E. c., hvid dob. dito. 3 f.
 57 " *luteum* E. c., guul dob. dito.
 58 *Clarkia elegans* E. a., ziirlig Clarkia. r.
 59 " *pulchella* E. a., pragtfuld dito. 2 f. l.
 60 " var. E. a., med flere Farver.
 61 " *alba* E. a., hvid Clarkia.
 62 *Coix Lachryma* F., P. W., Jobs Taaregræs.
 63 *Collinsia bicolor* E. a. d., tosfarvet Collinsie. 1 f. l. og h.
 64 " *grandiflora* E. a., storblomst. dito ½ f. bl.
 65 *Collomia coccinea* E. a. d., red Collomie. ½ f. cr.
 66 " *grandiflora* E. a., storblomst. dito. 2 f. chamois.
 67 *Commelinæ cœlestis* F., P. T., himmelblaa Comeline. hb.
 68 *Convolvulus tricolor* E. b., tresfarvet Jordfruskjort, enten henstrakt eller opbundet. 4 f.
 69 *Corydalis sempervirens* E. a., stedsegren Jorddrog. 1 f. og.
 70 *Coronilla securidacea* E. b., sværddannet Kronville. 1 f.

- 121 *Cosmea bipinnata* E. e., tofinnet Cosmie. 3 f. rr.
 122 *Crepis rubra* E. b., rød Christus Die. 1 f. rr.
 123 " *alba* E. b., hvid dito. 1 f.
 124 *Cucumis prophesarum* E., P. W., Prophetagurk.
 125 *Cuphea silenoides* E. b., sileneagtig Cuphee. 1 f. pr.
 126 *Cynoglossum linifolium* E. b. d., hvid Hundetunge. ½ f.
 127 *Datura ceratocaulon* E. e., hornstænglet Pigæble. 4 f. h.
 128 " *ferox* E. b., langtornet dito. 4 f. h.
 129 " *fastuosa alb.* pl. E., P. W., hvid pragtfuld. 4 f. h.
 130 " *violacea* pl. E., P. W., violet dob. 4 f. v.
 131 " *lævis* E. b., glat Pigæble. 4 f.
 132 " *Metel* E., P. W., hvid Pigæble. 4 f.
 133 " *striata* E., P. W., stribet dito. 4 f.
 134 " *Tatula* E. b., bleegblaa dito. 4 f.
 135 *Delphinium Ajacis humilis* fl. pl. E. a. d., lave dob-
belte Riddersporer i flere Farver. ½ f. ff.
 136 " " *elatum* fl. pl. E. a., høje dobbelte
Riddersporer. 1 f. ff.
 137 " *Consolida* pl. E. a., franske dob. Riddersp.
i flere Farver. 2 f.
 138 " *grandiflorum* F. storblomst. Ridderspore.
2 f. ab.
 139 *Dianthus barbatus* E., Studenter Nellike. 1½ f. ff.
 140 " *caryophyllaceus* E., dob. Kron Hauenellike. ff.
 141 " *chinensis* To., chinesisk Nellike. 1 f. ff.
 142 *Digitalis purpurea* To., purpurrod Fingerblomst. 3 f.
 143 " *alba* To., hvid dito 3 f.
 144 " *lanata* To., 3 f. g.
 144a *Dolichos Lablab*. E. P. W., Søjaplanten. v.
 145 *Dracocephalum Moldavica* E. a., yselugt. Dragehoved.
1 f. bl.
 146 *Eccremocarpus scaber* Tr., P. T., Skjønhedsranke eller
Pragtdrue. og.
 147 *Elichrysum lucidem* E. b., guul Straablomst. 2 f. gg.
 148 " " fl. albo E. b., hvid dito.
 149 " " *pallida* E. b., lysegul dito.
 150 " *fulgidum* F., P. T. pg.
 151 *Eltsholzia cristata* E. a., lamartet Elsholzie. 1 f. bl.

- 152 *Eschholzia californica* To. E. a., gnul Eschholzie. 1 f. gg.
 153 " *crocea* To. E. a., safranguul dito. 1 f. og.
 154 *Euphorbia litterata* E. b., mørket Vortemelk. 1 f.
 155 *Eutoca multiflora* E. a., mangeblomstret Eutoca. 1 f. I.
 155a " *Menziesie* E. a. Menzies dito. 1 f.
 155b " *viscida* E. a., 1 f. og flæbrig. hb.
 155c " *Wrangeliana* E. a., 1 f. b. Wrangels dito.
 156 *Fumaria vesicaria* E. a., blærebærende Jorddrog.
 157 *Galinsoga trilobata* E. b., trelappet Galinsoga. 3 f.
 157a *Gallardia aristata* F. 2 f. stakket G. og.
 158 *Gaura biennis* To., Pragt Natlys. 3 f. r. og h.
 159 *Georgina variabilis* pl. To., dobbelste Georginer i flere
farver. 4—6 f.
 160 *Geum coccineum* F., ildred Nellikerod. 1½ f. sr.
 161 *Gilia achilleæfolia* E. a., reslikebladet Gilie. 1½ f. mb.
 162 " *capitata* E. a., blaa knapdannet dito. 3 f. ab.
 163 " " *alba* hvid dito.
 164 " *lacinata* E. a., fliget dito. 1 f. v.
 165 " *tricolor* E. a., tresfarvet dito. 1 f. ff.
 166 *Gomphrena globosa* alba E., P. W., hvid Gomphrena.
 167 " " *carnea* E., P. W., hødfarvet dito.
 168 " " *rubra* E., P. W., rød dito.
 169 " *variegata* E., P. W., rød og hvid Gomphrena.
 170 *Glaucium fulvum* To., Horn-Balmur. 2 f. og.
 171 " *luteum* To., gnul dito. 2 f. g.
 172 " *phoeniceum*, starlagensrod dito. 1 f. pr.
 173 *Gossypium herbaceum* E., P. W., den ægte Bomuldsplante.
 174 *Gypsophila elegans* E. a., zürlig Gibbsurt. 2 f. rr.
 175 " *viscosa* E. a., flæbrig dito. 2 f. h.
 176 *Hedysarum coronarium* alb., hvid Haneblomme. 3 f.
 177 " " *rubrum*, rød dito. 3 f.
 178 " *gyrans* E., P. W., bevægelige.
 179 *Helianthus chinensis* E. b., chinesisk Soelblomst i 3
Sorter førstilt. 5 f. og.
 180 " *annuus* E. b., enaarig dito i 6 Sorter
førstilt. 6 f.
 181 " " *pyramideum* dito med 60 Blom-
ster paa engang.

- 182 *Helianthus annuus nanus* E. b. d., Øværg dito fun
1 F. høi.
- 182a " *giganteus* E. b., Kjæmpe dito. 12 F.
- 183 " *indicus* E. b., indiff dito 5 F.
- 184 " *lenticularis* E. b., lindseformig dito. 6 F.
- 185 *Heracleum giganteum* To., Kjæmpe Bjørneløe. 8 F. hv.
- 186 *Hesperis matronalis* To., hvid og blaa Aftensysterne. 2 F.
- 187 " *tristis* To., Ratviol. 2 F. br. g.
- 188 *Hibiscus Trionum* E. b., Timeviseren. 1 F. sg.
- 189 " *pruriens* E. To., P. W., stivhaaret Timevis. g.
- 190 " *vesicarius* E. b., opblæst Timevis. 1 F. g.
- 191 *Hippocratea multisiliquosa* E. b., Hestesko. 1 F. g.
- 192 *Humea elegans* To., P. T., ziirlig Humea. r.
- 193 *Iberis amara* E. a., hvid Flipkrave. 1 F.
- 194 " *umbellata* E. a. d., fjermblomst. Flipkrave. ½ F. l.
- 195 " " *superba* E. a. d., purpur dito. ¼ F. pr.
- 196 " *pinnata* E. a., finnet dito. 1 F. h.
- 197 *Impatiens balsamina* pl. E., P. W., dob. Balsamine i
flere Farver.
- 197a " " *pumila* E. P. W., Øverg dito. ½ F.
- 198 " *camelliæflora* E., P. W., Camelliæbl. Bals. h. r.
- 199 *Incarvillea sinensis* To., P. T., chinesisk Trompetbl. 3 F. r.
- 200 *Ipomœa purpurea* E. b., Trætblomst i fl. Farver. 6 F.
- 201 " *granitiflora* E. b., storblomst. Trætblomst. 6 F. pr.
- 202 " *Nil* E., P. W.. himmelsblaau dito
- 203 *Kaulfussia amelloides* E. b. d. nedliggende Kaulfusie. ½ F. hb.
- 203a *Lasthenia californica* E. b., Caleifornisk L. 1 F. g.
- 203b " *glabrata* E. b., glat dito. 1 F. g.
- 204 *Lathyrus odoratus* E. b., vellugt. Erteblomst i fl. Farv. 4 F.
- 205 " *sativus* E. b., blaa dito. 4 F. hb.
- 206 " " *albus* E. b., hvid dito. 4 F.
- 207 " *tingitanus* E. b., tangerst dito. 4 F.
- 208 *Lavatera trimestris* alb. E. a., hvid Poppelrose. 3 F.
- 209 " *rubra* E. b., red dito. 3 F.
- 210 *Leonurus nepalensis* E. b., nepalst Hjertespand. 3 F. rr.
- 211 " *occidentalis* E. b., østerlandst dito. 3 F. rr.
- 211a *Leptosiphon androsaceus* E. b. 1 F. b.
- 211b " *densiflorus* E. b. 1 F. in.

- 212 *Linaria bipartita* E. a., blaabuntet Torskegab. 1½ f. v.
 213 " *triphylla* E. a., trebladet dito, 1½ f. g. v.
 214 *Lianum africanum* Tr. P. T., afrikansk Hor. g.
 215 " *austriacum* E. b., østerlandsf. dito. 2 f. hb.
 216 " *grandiflorum* E. b., storblomst. dito. 2 f. hb.
 217 " *multicaule* E. a., mangestænglet dito. 1 f. hb.
 218 *Lobelia campanulata* E., P. T., floffedannet Lobelie. bb.
 219 " *debilis* E., P. T., violet dito. bb.
 220 " *crinoides* E., P. T., finbladet dito. bb.
 221 *Lonas annua* E. b., eenaarig Athanasie. ½ f. gg.
 222 *Lopezia mexicana* E. b., mexikanf. Lopezie. 2 f. cr.
 223 *Lophospermum scandens* Tr., P. T., slingende. rr.
 224 *Lotus tetragonolobus* E. b., Aspargesert. 1 f. mr.
 225 *Lunaria annua* To., eenaarig Maanenviol. 2 f. v.
 226 *Lupinus albus* E. b., hvid Lupin. 2 f.
 227 " *augustifolius* E. b., smalbladet Lupin. 2 f.
 228 " *arboreus* Tr., P. T., træagtig dito. bl.
 229 " *bicolor* E. b., tosfarvet dito. 1 f. bl. h.
 229a " *flexuosus* F. 2 f. b.
 230 " *hirustus* E. b., stor blaa dito. 2 f.
 231 " *tutens* E. b., gul vellugtende dito. 1 f.
 231a " *Intens pumila* E. b. 1 f. g.
 232 " *linifolius* E. b., horbladet dito. 2 f.
 232a " *mieranthus* E. b. 1 f. b.
 233 " *mutabilis* E. b., foranderligf. vellug. Lup. 3 f. bl. g.
 234 " *Cruiksehanckii*, morkebla dito. 3 f.
 235 " *pilosns*, red dito. 2 f.
 236 " *polyphyllus* F., mangebladet dito. 3 f. ab.
 237 " *perennis* F., vedvarende dito. 2 f. bl.
 238 " *tomentosns* Tr., P. T., florelsbladet dito.
 239 " *variegatus* F., broget dito. 2 f. bl. h.
 240 " *Marshallianus* Tr., P. T., Marshall's dito. bl.
 241 " *Milleri* Tr., P. T., Millers dito. bl. g.
 242 " *nanus* E. b., Øverg og rügblomst. dito. 1 f. bl. h.
 243 " *varius* E. b., buntet dito. 2 f. bl.
 244 *Lychnis fulgens* F., ildrod Pragtsjærne. sr.
 244a " *corsicus* E. a. ½ f. in.
 245 *Madia elegans* E. a., elegant Madie. 2 f. g.

- 246 *Malope malacoides* E. b., pragtsuld Malope. 2 f. r.
 247 " *grandiflora* E. b., storblomst. dito. 3 f. cr.
 248 " *trifida* E. b., tredeelt dito. 1 f. r.
 249 *Malva crispa* E. a., kruset Malva. 3 f. r.
 250 " *mauritiana* E. a., mauritanst Malva. 3 f. r.
 251 " *miniata*, monierod Malva. 3 f. r.
 252 *Martynia proboscidea* E., P. W., Elephantsnabel.
 253 *Maurandia Barclayana* Tr., P. T., Barkla's Maurandie. pr.
 254 " *semperflorens* Tr. P. T., stedseblomst. dito. v.
 255 *Medicago intertexta* E. a., vindsvins-Sneglebælle. 1 f.
 256 " *sentellata* E. a., Sneglebælle. 1 f.
 257 " *turbinata* E. a., turbandannet. 1 f.
 258 *Melilotus caerulea* E. a., blaa vellugt. Melilot. 2 f. bb.
 259 " *cretica* E. a., rundbladet dito. 2 f. g.
 260 " *italica* E. a., italienst dito. 2 f. sg.
 261 *Mesembryanthemum crystallinum* E., P. T., Jispanten. h.
 262 " *pinnatifidum* E., P. T., finnet dito. g.
 263 " *pomeridianum* E., P. T. storbl. dito. sg.
 264 " *tricolor*, tresfarvet dito. h. r.
 265 *Mimosa pudica* E. Tr., P. W., folsomme Mimoze. 4 Korn.
 266 *Mimulus andicola* F., rod og hvid Abeblomst. $\frac{1}{2}$ f.
 267 " *alatus* F., vinget dito. 1 f. r.
 267a " *Cardinalis* To. 1 f. sr.
 268 " *Groomei* F., storplette dito. $\frac{1}{2}$ f. g. r.
 269 " *guttatus* F., finpræsset dito. 1 f. g.
 270 " *luteus* F., guul dito. 1 f. g.
 271 " *moschatus* F., mosfus dito. $\frac{1}{2}$ f. g.
 272 " *quinquevulnera* F., semplettet dito. $\frac{1}{2}$ f. g. r.
 273 " *sylvestris* F., stor eanplette dito. $\frac{1}{2}$ f. g. r.
 274 " *rivularis* F., blodplette dito. $\frac{1}{2}$ f. g. r.
 275 " *roseus* F., rosenrod dito. 1 f. rr.
 276 *Mirabilis Jalappa alba* To., hvid Jalappa. 2 f.
 277 " " *rubra* To., rod dito. 1 f.
 278 " " *lutea* To., guul dito. 2 f.
 279 " " *variegata* To., rod og guul dito. 2 f.
 280 " *longiflora* To., langblomst. dito. 2 f. hv.
 281a *Mitella grandiflora* P., storblomstret Bisstopshat. 2 f. g.
 281 *Molucella laevis* E. b., glat Drægtbæger. 2 f. hv.

- 282** *Momordica Elaterium* E. a., Springagurk. $\frac{1}{2}$ f.
283 " *Balsamina* E. a., Balsamniagurk. $\frac{1}{2}$ f.
284 *Nemophila phacelioides* E. a., lyseblaas Kjærlighedsblomst.
285 " *atomaria* E. a., fynblettet dito. $\frac{1}{2}$ f. h.
286 " *insignis* E. a., stor himmelblaas Kjærligheds-
 blomst. $\frac{1}{2}$ f. hb.
287 *Nicandra physaloides* E. b., Ulvetirsebær. 4 f. hb.
288 *Nicotiana alata* E. b., vinget Tobak. 3 f. h.
288a " *multivalvis* E. b., mangeklappet.
289 " *nyctaginiflora* E. b., natblomst. Tobak. 3 f. h.
290 " *Langsdorffii* E. b., Langsdorffs dito. 3 f. g.
291 " *quadrivalvis* E. b., firplappet dito. 2 f. h.
292 " *sanguinea* E. b., blodred dito. 3 f. r.
293 " *vincæflora* E. b., vincablomstrende dito. 3 f. b.
294 *Nigella damascena* E. a. d. Jomfruen i det Grenne. 1 f. ab.
295 " *nana* E. a. d., lav dito. $\frac{1}{2}$ f. ab.
296 " *hispanica* E. a., spænk dito. 1 f. bb.
297 " *orientalis* E. aj., østerlandsk dito. 1 f. bb.
298 *Nolana atriplicifolia* E. b., mesdebladet Nolane. $\frac{1}{2}$ f. hb.
299 " *paradoxa* E. b., lilleblomstrende dito. $\frac{1}{2}$ f. v.
300 " *prostrata* E. b., fremliggende dito. $\frac{1}{2}$ f. bb.
301 *Ocytimum maximum* E., P. W., storbladet Basilikum.
302 " *minimum* E., P. W., liden dito.
303 " *nigrum* E., P. W., sort. dito.
304 *Oenothera grandiflora* To., storblomstret Natlys. 4 f. sg.
305 " *Lindleyana* E. b. rosenviolet dito. 2 f.
306 " *odorata* E. b., vellugtende dito. 2 f. g.
307 " *purpurea* E. b., rød dito. 1 f.
308 " *Romanzowii* E. b., violet dito. 1 f.
309 " *roseo-alba* E. b., rosenrød og hvid dito. 1 f.
310 " *stricta* E. b., ranf dito. 2 f. g.
311 " *tetraptera* E. b., firvinget dito. 1 f. h.
311a *Oxalis rosea* E., P. T., rosenrød Suurklover.
312 *Papaver Rhæas* pl. E. a., ranunkelartet Rosenvalmue i
 flere Farver. 2 f.
313 " *somniferum* pl., Have dito i flere Farver. 2 f.
314 " *braeateatum* F., storblomst. Balmue. 3 f. sr.

- 314a *Papaver orientale* F., orientalskt dito.
 315 " *croceum* E., safranguul dito. 1 f.
 315a *Passiflora gracilis* E., P. W.; tyndstænglet Passionsblomst.
 316 *Pentstemon confertum* F., tætblomst. Pentstemon. 2 f. g.
 317 " *Digitalis* E., fingerbolsblomst. dito. 3 f. l.
 318 " *diffusum* F., udbredt dito. 2 f. ab.
 319 " *glandulosum* F., fjærtlet dito. 2 f. v.
 320 " *ovatum* F., ultramarinblaa dito. 2 f. ab.
 321 " *pulchellum* F., blodrød dito. 2 f.
 322 " *pubescens* F., haaret dito. 2 f. r.
 322a " *roseum* F., roseurød dito.
 323 *Phaseolus multiflorus* E. b., Prælsonne. 6 f. sr.
 324 " " *bicolor* E. b., rød og hvid Prælsonne. 6 f.
 325 *Podolepis gracilis* E. b., nydelig Skjelblomst. 1 f. l.
 326 *Polemonium cœfulenm* To., blaa Polemon. 2 f. bl.
 327 *Polygonum orientale* E. b., østerlandskt Boghvede. 4 f. cr.
 327a Poly. or. alba, hvid dito. 4 f. hv.
 328 *Potentilla atrosanguinea* F., blodrød Potentil. 2 f.
 329 " *formosa* F., nepalst dito. 2 f. rr.
 330 *Primula chinensis* F., P. T., chinesisk Aurikel. 1.
 331 " *auricula* F., Aurikler i udmarkede Sorter.
 332 " *veris* F., Primuler ligeledes.
 333 *Pyrethrum Parthenium* pl. F. To., dobbel Cameelblomst. 2 f. hv.
 334 *Phytolaca decandra* F., tibannet Kermesbær. 6 f. rr.
 335 *Reseda alba* To., hvid Reseda.
 336 " *odorata* E. a., vellugtende Reseda. 1 f.
 337 *Rhodochiton volubile* Tr., P. T., pragtfuld Rosenflynger. pr. br.
 338 *Ricinus africanus* E. e., afrikansk Christus Palme. 6 f.
 339 " *americanus* E. e., amerikansk dito. 6 f.
 340 " *communis* E. e., almindelig dito. 6 f.
 341 " *crappa* E., dito. 4 f.
 342 " *glaucus* E. e., graa dito. 4 f.
 343 " *inermis* E. e., glatfrugtet dito. 4 f.
 344 " *lividus* E. e., glindsende dito. 6 f.
 345 " *viridis* E. e., græsgron dito. 6 f.

- 346 Rudbeckia amplexicaulis E. b., stengelomfattende Rudb.
3 f. g
- 347 Salpiglossis integrifolia E. F. b., Trompettunge.
(*Petunia mirabilis*) smuf rødblomst. Salpigl. 2 f. pr.
- 348 Salpiglossis diverse.
- 349 " hybrida (*Petunia*) i flere Farver. 2 f.
- 350 Salvia Hormium violacea E. a., violet Salvie. 2 f. v.
- 351 " rubra E. a., rød dito. 2 f. r.
- 352 Sanvitalia procumbens E. b. d., fremliggende Sanv. $\frac{1}{2}$ f. g.
- 353 Saponaria calabrica To. E. e., calabriß Sæbels. 1 f. er.
- 354 " vaccaria E. a., væragtig dito. 2 f. rr.
- 354a Sarracha ruscosa Tr. P. W., flæbrig Sarr., røde Bar.
- 355 Scabiosa atropurpurea E. b., purpursort Enkebl. 3 f. ff.
- 356 " grandiflora E. b., storblomst. dito. 3 f. ff.
- 357 " nana E. b., Øverg dito. 1 f. ff.
- 358 " stellata E. b., stjernet dito. 3 f. bb.
- 359 Schizanthus humilis E. b., lav Kloftkrone. 1 f. l.
- 360 " obtusifolius E. b., buttbladet dito. 2 f. l.
- 361 " pinnatus E. b., finnet dite. 2 f. l.
- 362 " porrigenus E. b., flingrenet dito. 2 f. l.
- 363 " retusus To., P.T., pragtfuld dito. 2 f. er. gg.
- 363a " elegans E. b., elegant dito. 2 f. l.
- 364 Scoparius vermiculata E. b., Ormeklover. 1 f.
- 365 Senecio elegans albo pl., dobbelt hvid Brandbæger. 2 f.
- 366 " atropurpur., purpurred dito. 2 f.
- 367 " rosea, rosenred dito. 2 f.
- 368 " rubra, rød dito. 2 f.
- 369 Sida Dilleniana E. b., blaa Sida. 2 f. v.
- 370 Silene Armeria E. a., rød Silene. 2 f. er.
- 371 " alba E. a., hvid Silene. 2 f.
- 372 " bicolor E. a., tofarvet dito. 1 f. h. r.
- 373 " compacta To., tætgrenet dito. 2 f. cr.
- 374 " Muscipula E. a. mygfangende dito. 1 f. r.
- 375 " orchidea E. a., orchis dito. $\frac{1}{2}$ f. rr.
- 376 " pendula E. a., hængende dito. $\frac{1}{2}$ f. r.
- 377 " trinervia E. a., trenervet dito. 1 f. r.
- 378 " quinquevulnera E. a., femplette dito. 1 f. mr.
- 379 " vespertina E. a. d., aftenbl. dito. 1 f. r.

- 380 *Silybum Mariæ* E. a., Marie Tidsel. 4 f. v.
 381 *Solanum Lycopersicum* E. c., Kjærligheds-Æble.
 382 " *Melongenum* E., P. W., æggepl. dito.
 383 " " fr. violacea, violet dito.
 384 *Sonchus tingitanus* E. b., tangerst Svinemelk. 2 f. gg.
 385 *Sorghum bicolor* E. c., tofarvet Negerhirse 6 f.
 386 " *nigrum* E. c., sort dito. 6 f.
 387 " *rubrum* E. c., rød dito. 6 f.
 388 *Stenactis speciosa* F., pragtfuld Straalestjerne. 1 f. v.
 389 *Tagetes erecta aurant.* E. b., orangefarvet Floretsbl. 2 f.
 390 " " *fistulosa* E. b., rerdannet dito. 2 f. gg.
 391 " " *minima* E. b., lidén dito. 2 f. g.
 392 " " *ranunculoid.* E. b., ranunkeld. dito. 2 f. g.
 393 " " *sulphurea* E. b., svovlgul dito. 2 f.
 394 " " *nana* E. b., Øverg dito. 2 f. gg.
 395 " *patula pumila* pl. E. b., lav dito. $1\frac{1}{2}$ f. b. g.
 395a. " " *pleno* E. b., 2 f. b. g.
 396 " " *punctata* E. b. punkteret dito. $1\frac{1}{2}$ f. b. g.
 397 " " *striata* E. b., stribet dito. $1\frac{1}{2}$ f. g. br.
 398 " " *variegata* E. b., broget dito. $1\frac{1}{2}$ f. g. br.
 399 *Thunbergia alata* E., P. W., vinget Thunbergia. chamois.
 400 *Tolpis barbata* E. b., guul Præstekrave. 1 f.
 401 *Trachymene coerulea* E., P. T., blaa Trachymene. 2 f. hb.
 402 *Trifolium elegans* E. a., ziirlig Klover. 1 f. rr.
 403 " *incarnatum* E. a., fjædred dito. 2 f.
 404 *Tropaeolum majus* E. a., Rosturtium. 4 f. og. mr.
 405 " " *atropurpureum*, sortred Rasturt. 4 f.
 406 " " *coccineum*, ildrod dito. 4 f.
 407 " " *miniata*, menierod dito. 4 f.
 407a " *bicolorum* E. a., tofarvet dito. 4 f. og. mr.
 407b " *minus* E. a., lidén dito. 3 f. og.
 407c " *trimauleatis* E. a., treplette dito. 4 f. og. m.
 408 *Verbascum phœnicium* To., purpurrød Kongelys. 3 f. pr.
 409 " *speciosum*, To., ziirlig dito. 8 f. g.
 410 *Verbena venosa* F., aaret Jernurt. 1 f. v.
 411 *Veronica persica* E. a. d., himmelblaa Ærenpriis. $\frac{1}{2}$ f.
 (forhen under det urigtige Navn af V. filiformis.)
 412 *Viola tricolor maxima* E. a., stor engelst Stedmoders-
 blomst. 1 f. ff.

- 413 *Viola tricolor* grandiflora, storbl. Stedmodersbl. 1 f. ff.
 414 " fl. nigro, sortblomstret dito. 1 f.
 415 *Ximenesia enceliooides* E. b., øret Ximenesia. 3 f. g.
 416 *Xeranthemum annum* E. c., Papirsbl. i fl. Farver. 2 f.
 417 " fl. alb., hvid dito. 2 f.
 418 " fl. cœrulea, violet Papirsbl. 2 f.
 419 *Zea Mais altissima* E. c., højstænglet Mais. 6 f.
 419 a " *gigantea* E. c., Kjemppe dito. 12 f.
 420 " *Curagna* E. c., saugtaftet dito. 2 f.
 420 a " *rubra* E. c., rød dito. 2 f.
 421 " *Mais hirsuta* E. c., haaret dito. 2 f.
 421 a " *plotystachya* E. c., fladaxet dito. 2 f.
 421 b " *trimestris* E. c., tremaaender dito. 2 f.
 421 c " *variegata* E. c., buntet dito. 2 f.
 422 *Zinnia multiflora* E. c., rød Zinnie. 2 f.
 423 " *lutea*, gul dito. 2 f.
 424 " *teuniflora* E. c., smalblomst. dito. 2 f. sr.
 425 " *verticillata* E. c., fraudsblad. dito. 2 f. mr.
 426 " *elegans* E. c., ziirlig dito. 2 f. l.
 274 *Zoegea leptorea* E. b., redgul Fnokurt. 1 f.

NB. Forevrigt funne, saavidt samme ere i Horraad, enhver anden Frosort erholdes til samme Pris, nemlig 4 Sk. Port.

Af Planter funne desuden erholdes Georginer, Nellifer, Legværter o. s. v.

II. Flor-Blomster.

A Et Sortiment weimarske extra dobbelte engelske og halvengelske Sommerlevkoier samt Vinterlevkoier.

Aum. Da Erfaring har overbevist mig om at ikke alle de weimarske Levkoisorter falde lige godt dobbelt, har jeg kun valgt de allerbedste, hvorfor ei olle Sorterne foresindes.

a) Engelske d. e. med tætsiddende Blomster.

M 1 afferosa, 2 hjødfarvet, 3 kobberbrun, 4 rosa, 5 mørk-rosa, 6 rodbrun, 7 aftegraa, 8 kaneelbrun, 9 blegbaun,
10 carmin, **11** bleeglilla, **12** hvid, **13** valmuegraa,
14 mørkmordoré, **15** mørkortebrun, **16** mørkeblaa,
18 mørkarmin, **19** bleeegblaa, **20** violet, **21** mørkamois-
sin, **24** carmosin, **25** lyserød, **26** bleeegrosa, **27** kobberød,
28 æbleblomstret, à **25** Korn 4 β.

b) Engelske med Gyldenlakblade.

M 32 kobberød, 33 bleeegteglsteensrød, 34 mørkaneelbrun,
35 hvid, 36 violet, 38 carmin, 39 hjødfarvet; **40** affer-
rosa, **41** aftegraa, **42** mørkegraa, **43** bleeegblaa, **45** bleeeg-
brun, **46** bleeegrod, **47** bleeglilla, à **25** Korn 4 β.

c) Halvengelske d. e.: med adsprede Blomster.

M 50 hvid, **51** bleeegblaa, **52** rosa, **53** hjødfarvet, **55** isabell,
56 bleeglilla, **57** kaneelbrun, **58** carmin, **60** mørkeblaa,
61 fortebrun, **62** carmosin, **63** kobberfarvet, **64** fastanie-
brun, **65** bleeegblaa med Gyldenlakblade, **66** hvid med
Gyldenlakblade, à **25** Korn 4 β.

d) Hostlevkoier.

M **67** hvid, **68** violblaa engl., **69** fastaniebrun engl., **70** hvid
halvengl., **71** hjødfarvet halvengl., **72** mørkebrun engl.,
73 teglrod engl., **74** kobberrod engl. med Gyldenlakbl.,
75 fastaniebrun engl. med Gyldenlakbl., **76** carmin engl.
med Gyldenlakbl., **77** bleeegblaa halvengl., **78** carmin engl.,
79 carmin halvengl., **80** rodbrun halvengl., **81** bleeegblaa
halvengl. med Gyldenlakbl., **82** rodbrun engl., **83** violet
halvengl. med Gyldenlakbl., **84** mørkrosa engl., **85** mørk-
kobberrod halvengl., **86** fortebrun halvengl., à **25** Korn 4 β.

Vinter Levkoier.

A carmosin, B hvid, C carmin, D bleeegrosa, E førsten-
blomstrod, F mørkeblaa, G violblaa, H mørkebrun, I førsten-
blomstrod vistammet, K teglrod, L hvid, hoistammet, M carmosin,

N lysblaas, O hvid med Gyldenlakbl., P rødbrun med Gyldenlakbl., Q carmin med Gyldenlakbl. à 25 Korn 4 β.

B. Dobbelt Gyldenlakker.

№ 1 lysbrune, 2 mørkebrune, 3 gule, 4 mørkeblaas, 5 Øverg storblomstret à 4 β. Port.

C. Et Sortiment extra dobbelt Fjeder eller Voraster.

a) Høie.

№ 1 mørkerød, 2 mørkerød med hvidt, 3 mørkeblaas, 4 mørkeblaas med hvidt, 5 bleegrod, 6 bleegrod med hvidt, 7 bleegblaas 8 solvhvid, 9 fjedfarvet, 10 afsegraa, 11 bleegrodbaanget, 12 mørkerød baandstribet, 13 mørkeblaas baandstribet, 14 bleegblaas baanget, 15 lysblaas med hvidt, 16 mørk carmosin, 17 hvid med rødt, 18 guulagtighvid, à Sort 4 β.

b) Halvhøie.

19 mørkearmosinrød, 20 bleegrod, 21 mørkerød, 22 mørkerød med hvidt, 23 carmosinrød, à Sort 4 β.

c) Øvergaster.

24 mørkerød, 25 mørkerød med hvidt, 26 mørkerød baandstribet, 27 mørkviolet, 28 lysviolet med hvidt, 29 violet med hvidt, 30 bleeghvid, 31 bleegrod, 32 rød tyrkist, 33 rød baandstribet, à Sort 4 β.

D. Et Sortiment ndmærkede smukke Lathyrus.

№ 1 leddet, 2 haaret, 3 mexicanske, 4 stribede, 5 hvid velsugtende, 6 rødspraglet, 7 purpurrød, 8 fortppurpurrød og hvidt, 9 rød, 10 fortppurpurrød, 11 rød med hvide Striber, 12 tangerst, à Sort 4 β.

E. Et Sortiment ndmærket smukke Salpiglossis.

№ 1 atropurpurea stricta, 2 Barclayaua, 3 B. aurea et fusca, 4 B. eximia, 5 B. intermedia, 6 B. Inteseens, 7 pieta superba, 8 straminea, 9 straminea striata,

10 striata, **11** lillacea, **12** violacea, **13** lillacea spectabile, **14** grandiflora.

F. Et Sortiment udmærket smukke Binnier.

a) elegans.

N **1** mørkviolet, **2** hvid, **3** fjødfarvet, **4** starlagenrød, **5** storblomst. starlagenrød, **6** smuk rød, **7** mørkilla, **8** heirosenrød, **9** monierod, **10** violet, **11** guul, **12** mørkrosa.

b) almindelige.

13 tvivelagtig, **14** storblomstret, **15** mangeblomst. guld-farvet, **16** rød, **17** guul, **18** violet, **19** smalblomstret, **20** krandsblomstret.

G. Et Sortiment extra dobbelte Riddersporer.

a) Lave: *Delphinium ajacis humile* fl. pl.

N **1** hvid, **2** bleegilla, **3** rosa, **4** mørkeblaau, **5** fjødfarvet, **6** teglrød, **7** lilla, **8** rodlighvid, **9** rød med blaat Skjer, **10** lyseblaau, **11** leverfarvet, **12** violet, **13** melkehvid, à Sort **4** β.

b) Høie: *Delphinium Ajacis elatum* pl.

14 hvid, **15** rosa, **16** violet, **17** rød, **18** lilla, **19** fjødfarvet, à Sort **4** β.

c) Franske: *Delphinium consolida* fl. pl.

20 hvid, **21** Rosa, Lyseblaau, **22** Lyseblaau, **23** violet, **24** asfegråa, **25** asfekblaau, à Sort **4** β.

H. Et Sortiment dobbelte Balsaminer.

16 Sorter blandede, à Portion **4** β.

I. Et Sortiment extra dobbelte Scabiosa.

a) Høie.

N **1** hvid, **2** hvidrosa, **3** bleegrød med hvidblomstrende Rand-

kroner, **1** incarnat, **5** chamois, **6** hødfarvet, **7** førstens blomstret, **8** lysrosa, **9** hoirosa, **10** lyscarmin, **11** carmin med hvid Rand, **12** carmin incarnat, **13** carmin bleegrosa, **14** lyserød, **15** mørkerød, **16** blaaagtig carmin, **17** carmosin, **18** carmosin med bleeglilla, **19** purpurfarvet, **20** mørk-purpurfarvet, **21** purpurbrun, **22** kirsebærbrun, **23** sorte-brun, **24** kirsebærsortbrun, **25** lilla, **26** mørklilla.

b) Lave.

27 hvidagtig, **28** bleegincarnat, **29** incarnat, **30** bleegrosa, Spidserue carmin, **31** rosa, **32** lyscarmin, **33** bleegearmin, **34** lillacarmin, **35** carmosin, **36** lillacarmosin, **37** purpviolet, **38** mørkpurpur.

J. Et Sortiment Hanekamme.

(*Celosia cristata.*)

17 Sorter blandede, à Prise 4 β.

K. Et Sortiment extra dobbelte Stokroser.

N **1** lysviolet, **2** lysorange, **3** brændende carmosin, **4** mørk orange, **5** hvidred, **6** lilla, **7** svovlgul, **8** blodred, **9** rosen-farvet, **10** carmosin, **11** mørkcarmosin, **12** paille gul, **13** lyserød, **14** mørkhødfarvet, **15** lyscarmin, **16** lilla med hvidt, **17** lysastegraa, **18** brunrod, **19** hoirosa, **20** carminrød, **21** hoired, **22** carmosin med hvidt, **23** violet med hvid Rand, **24** Gyldenløk Malve, **25** sort, à Sort 4 β.

L. Et Sortiment Figur-Græskar (Lust-Kürbis).

N **1** stor Melon, **2** Herkuleskolle, **3** Flaske, **4** Kokusnod, **5** stor Eg, **6** Paraply, **7** Negle, **8** lange Smor fra Barbariet, **9** lille gule Box, **10** graagronne Cylinder, **11** Turban, **12** tresarvede Egble, **13** gule Egble med maigronne Pletter, **14** lille stribede Egble, **15** Appelsin, **16** Vibeg, **17** Stikkelsbaer, **18** tofarvet Klofke, **19** gule Klofke, **20** gule Klofke med Vorter, **21** gule Vorte, **22** gronne Vorte, **23** gule Orange med gronne Vorter,

24 stribede Pære, **25** gule Pære med maigrønne Pletter,
26 trefarvet Pære med Borter, **27** lange Pære, **28** lille
 gule Pære.

M. Et Sortiment Centaurea Cyanus.

14 Sorter med Navne.

N. Et Sortiment Commelina.

9 Sorter med Navne.

O. Et Sortiment Mirabilis.

8 Sorter med Navne.

Fra af nogle nyere Kjokkenurter.

Rhabarber.

I Havetidendens første Aargang pag. 93 har jeg omtalt denne Plante som en almindelig yndet Kjokkenurt i England. Siden denne Tid har jeg bestrebt mig for, deels ved Planter og deels ved praktiske Anvisninger at gjøre den mere bekjendt; ved det Bifald den har vundet som en tidlig Substitut for vore saa almindelig yndede Stikkelsbær, nærer jeg det Haab at den i Tiden vil blive ligesaa almindelig brugt i Husholdningen som denne nu er, og Asparges. Den vil blive det fremfor nogen anden, saa meget lettere, da enhver som har nok saa lidt en Have*) kan dyrke den uden mindste Belostning eftersom den kan voxer i enhver almindelig Havejord, selv i Skygge og under Træer, men heraf folger ogsaa, at den kommer sildigere i Baet om Føraaret — paa et solrigt Sted kan man allerede benytte Bladstilkene først i April Maaned. — Det vil erindres, at det ere de 10 à 12 Tommer lange og 1 Tomme tykke Bladstilke, der skællede, skærer i Stykker liig Kaalstokke og tillaves alveles som Stikkelsbærgrod eller Compot. Planter funne er-

*) Thi et Dosin Planter er tilstrækkelig for en almindelig Husholdning.

til 8 St. pr. St. og Frøs à 1 Mt. Portionen, saavel med Planterne som med Froet folger en trykt Anvæsning hvorledes Planten skal dyrkes og dens Anvendelse og Tilberedning som Spise. Jeg vilde nu ønske at Navnet ikke vil afstrække dem fra at gøre Forsøg, der endnu ikke hjende den, men være overbevist om, at den tillavet efter opgivne Forstrift, vil behage den meest Kæsne. Foruden at den i Føraastiden netop afhjelper Savnet af Frugter, hvis pikante Syrlighed tillige er et særdeles sundt Hordeløsesmiddel.

Overordnede Sellerie

fortjener fremfor den almindelige Sellerie at dyrkes; den bliver meget større end den almindelige og har en bedre Smag (see forresten Havetidende 3die Aarg. pag. 457).

Ny engelsk Spinat.

Den giver de største Blade, næsten saa store som Melonblade, de ere tillige af en federe og finere Smag, taaler bedre Varmen end den almindelige. Den bør saaes tyndt og i velsjodet Jord. Til Sommerbrug den fortrinligste.

Søkaal, Strandkaal.

I meget sandet Jord lykkes den fortrinlig (see forevrigt Havetidenden forste Aarg. pag. 139).

Ny peruviansk Spinat (*Genopodium Quinoa*).

Denne nye Spinatart, hvis Blade benyttes som Spinat og Froet som Ris behandles ligesom Tobaksplanten først saaes paa halvvarm Bænk og siden udplantes (see Havetidende 3die Aarg. pag. 35).

Korvel Roen (*Scandix bulbosa*).

Det er en Skjermplante, der ligesom Sellerien ansætter Knolle, men disse ere mindre og ligner meget i Smagen øgte Kastanier. Den bør helst saaes om Efteraaret, da Froet ligger længe i Jorden.

NB. Alle disse nævnte Sorter kunne erholdes til 1 Mt. Portionen.



