

Digitaliseret af | Digitised by



**DET KGL.
BIBLIOTEK**

Royal Danish Library

Forfatter(e) | Author(s):

Drejer, Salomon Thomas Nicolai.; scripsit S. T. N. Drejer.

Titel | Title:

Flora excursoria Hafniensis

Udgivet år og sted | Publication time and place: Hafniæ : sumtibus librariæ Schubothianæ, typis excudebat J. D. Qvist, 1838

Fysiske størrelse | Physical extent:

LXV, 339 s.


DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always remember to credit the author.





22. - 59. 16



DET KONGELIGE BIBLIOTEK



130021271528

FLORA EXCURSIONIA

ILLUSTRATIONES

DE

HERBARIIS

HERBARIIS

HERBARIIS


HERBARIIS

FLORA EXCURSORIA

HAFNIENSIS.

SCRIPSIT

S. T. N. DREJER.



HAFNIÆ.

SUMTIBUS LIBRARIÆ SCHUBOTHIANÆ.

TYPIS EXCUDERAT J. D. QVIST.

1838.

FLORA EXCURSORIA

HAFNIENSIS

J. W. ROSENTHAL
Tall. Dr. Bot. Hort. Bot. Hort.
Hort. & Genui. Hort. & Genui.
Hort. & Genui. Hort. & Genui.

S. T. N. BUCHER

London: comp. the calendar, 1871
Lond. & Genui. Hort. & Genui.

HAFNIENSIS

LIBRARY OF THE ROYAL BOTANICAL GARDEN

1871



FLORA DANICA

Floræ Danicæ optimo illustratori

I. W. HORNEMANN,

Phil. Dr., Bot. Prof. Ord., Hort. Bot. Direct.,
Regi a Consil. Stat., Ord. Dannebr. Eqv.
etc. etc. etc.

Fautori semper pie colendo, qui
studia mea paterna manu ducebat,

D. D. D.

Autor.

J. W. HORTSMAN

Phil. Dr. Hort. Phil. Dr. Hort. Phil. Dr. Hort.

Hort. Phil. Dr. Hort. Phil. Dr. Hort. Phil. Dr. Hort.

etc. etc. etc.

PRÆMONENDA.

Territorium, cujus plantas enumerare mihi proposui, insulas Sjælland et Møen amplectitur. Hafniensem floram vocavi quia metropolis, universitatis et horti botanici sedes, fere semper locus est a quo fit exitus excursionum botanicarum. — Enumerationem dare quam integerrimam plantarum phanerogamarum nec non paucarum cryptogamarum (Filicum, Lycopodiorum, Equisetorum) hujus territorii; diagnoses adijcere quam accuratissimas, quarum ope tirones excurrentes nomina plantarum tute inquirant; nomenclaturam magis ei qua utuntur exteri botanici congruam facere, ut tandem iis hac ratione adpropinquemus; notione speciei uti qua sola ad cognitionem specierum verarum olim perveniamus: — ecce scopum quem in elaborando hocce opusculo semper adspexi, quemque ut adsequerem pro virili semper contendebam. Huic scopo quantum adpropinquarem, judicent critici ingenui et qui rationes botanices Danicæ rite noverunt. Labori me non pepercisse spero fore ut neminem fallat, qui librum meum cum fontibus comparaverit.

Rationem operis quod adtinet, pauca modo præmonenda sunt. SYSTEMA sexuale adhibitum esse nemini sine dubio displicebit; magis forsân, dispositionem plantarum secundum systema quoddam, ex iis quæ naturalia vulgo dicuntur, non simul esse datam. Hoc sane optabam, nec in eligendo Reichenbachiano, quod solum hucusque *ideam* systematis *vere naturalis* dedit (quod ut perficiatur tamen multi adhuc restant gradus percurrendi), ne momento quidem, hæsitavi, eoqve minus, quo magis botanicis nostris incognitum est; — obstabant vero angustiae temporis lociqve, cui accedebat quod liber excursorius practico usui destinatus vix idoneus est systemati nobis plane *novo* locus.

GENERA plura admisi quam quæ in libris nostris videre solemus, pauciora tamen quam optavi quæqve pro naturalibus habeo; prius enim quam genera latiora vere naturalia formari vel potius *cognosci* possunt multo angustiora rite esse limitanda, persvasum mihi habeo. Sed hoc loco nimis multis novis nominibus uti nolui, ne justo subita iis videatur mutatio, qui jam antiquis consueverunt. Multa mihi vera genera intra terminos antiquorum ut subgenera notavi (cfr. Veronica, Festuca, Viola, Lychnis, Trifolium cet.), nonnulla nomine notavi synonymorum loco (Allium cet.). Qua in re quantum *potui*, minus forsân quam debui, mihi constitui.

In SPECIEBUS constituendis me notione nimis laxa usum esse, et plures enumerasse quam vere natura posuit, quidam forsân mihi obicient, quamquam non

dubito æque multos laudatores hujus rei me habiturum ac vituperatores. Interrogantibus me subducere hoc loco potuissem respondendo, id in libro excursionibus adcommodato minoris esse momenti, quum hic modo indicari debeant quæ sunt observanda, nec positive certa modo adferenda; infitias autem non ibo, plerasque a me enumeratas species vere naturales mihi videri, nec lectorem doctum latebit, notionem meam speciei fere esse Reichenbachianam, cui ulterius defendendæ hic non est locus. De paucis tantum pro novis habitis speciebus, quarum aliquot e sicco descripsi, monere necesse, eas de industria quamquam dubias esse propositas, adprobato aureo illo dicto Wulfenii: *in dubiis præstat distinguere quam confundere*. Propositis his dubiis speciebus spero fore, ut veritas citius illucescat et practicæ scientiæ parti consulatur. — Dolendum aliquot genera critica a me non satis esse observata: si floram integram scribere vellem, certe mihi expectandum esset donec omnia a me ipso satis fuissent explorata; floram excursoriam autem, quâ solâ integra flora Danica, temporibus et progressibus scientiæ adcommodata, præparari potest, non ante tempus in lucem prodire posse, vix dubitandum. Quæ mihi ipsi minus nota fuerunt, ea compilando supplevi, indicatis simul quæ mihi quæ aliis debentur. Talia genera sunt Verbascum, Hieracium, Salix, gramina nonnulla.

VARIETATES semper non distinxi, nisi in speciebus minus quoad historiam et vitam cognitis, et ingenue

VIII

fateor me nescire, quæ sit res cui denominatio tam dubia, tam confusa, tam arbitraria inditur. In speciebus quarum evolutio clara est, FORMAS distinxi, et quidem primarias, secundarias et derivatas (cfr. *Lythrum*), verum ne id quidem nisi hæ formæ habitu satis diverso distinguuntur.

In SYNONYMIS adlegandis parcus fui et modo ea citavi quæ speciei facilius inveniendæ inserviunt: fontem omnis botanicæ descriptivæ Daniæ, *Floram cl. Hornemanni (Dansk oeconomisk Plantelære)*, et *Floram Danicam*, litterarum patriæ decus; porro *Iconographiam* pulcherrimam *Reichenbachii*, rarius *Svensk Botanik*, *English Botany*, et ubi res postulabat, *varia alia*. — Ex operibus descriptivis botanicorum exterorum præcipue usus sum scriptis ell. *Virr. Friesii*, *Hartmanni*, *Kochii*, *Reichenbachii*, aliis haud neglectis. Valde doleo, *Floram Scanicam* *Friesii* me accepisse typis excussa jam plus dimidia parte, et *Herbarium normale plantarum rariorum et criticarum Sveciæ* Ejusdem tum primum mihi adlatum esse, quum prima vice plagulam ultimam corripgebam. Nonnulla ex eo melius forsitan exposuissem si prius vidissem, quæ tamen accuratius indicare nunc neqveo. Notandum h. l. *Rubum thyrsiflorum* hb. norm. esse fere meum *R. vulgarem* β ; post *Euphrasiam gracilem* nomen *Friesii* iterum esse ponendum (pace critici cujusdam in *Linnaea* XI. p. 154.) *Triticum strictum* hb. norm. (vix *Dethardingii*) idem esse ac *Agropyrum* adfinc m.; specimine *Statices*

Limonii Bahusiensis ulterius confirmari meam generis dispositionem, e. s. p. — Qvæ de *Hieraciis*, *Salicibus*, *cet.* ex eo emendari possunt, ea jam in aliud tempus locumque differo.

TERMINOS nonnullos in notis explicare coactus fui, qvi in manualibus nostris non reperiuntur.

Restat ut debitâ gratiâ fautores et amicos nominem, qvi me opusculum elaborantem præsentés adjuverunt. Et primus nominandus est Illustr. Hornemann, qvi solita humanitate herbaria et manuscripta mihi disponenda reliquit; tum I. Vahl, Grönlandicæ floræ optimus indagator, qvi herbarium ditissimum et speciminibus multis authenticis cl. virorum E. Meyer, Nolte, Hampe, Zuccarini, Fries, Hartman, Brebison etc. ornatum perlustrandum mihi humanissime obtulit; Liebman amicissimus et Kämpfö vener, quorum collectionibus et manuscriptis tamquam meis ipsius usus sum; porro Aabye, nunc apud Nibenses, Steenberg apud Helsingoranos pharmacopolæ, Steenbuch comitatus Holsteinborg medicus, Poulsen, pharmacie candidatus, Petit medicinæ, Lange theologiæ studiosi, Ehrenreich hortulanus Borrebyensis. Omnibus his gratiam quam habeo humanissime refero.

Et sic, lector benevole! libro meo utere et — latinitati meæ indulge.

Autor.

EXPLICATIO ABBREVIATIONUM ET SIGNORUM.

*N*umerus post nomen specificum [v. c. p. 2. F. excelsior L. (969)] tabulam Floræ Danicæ indicat; si puncta numerorum loco adsunt, planta in hoc opere desideratur.

(Ubi "plurima nitent" irritum opus est merita singula designare; vitia nonnulla necessarium duxi notare; quod feci litteris:

p. pessima.

m. mala.

m. b. minus bona.)

H. 1. = Hornemann dansk oekonomisk Plantelære, 3 Udg., 1 Deel 1821.

H. 2. = 2 Deel 1837.

H. Hornemann (ubi loca specialia ex operibus Ejus excerpta sunt).

Hornem. Hornemann, si Ipse plantam in loco indicato legit.

Rechb. ic. = Reichenbach iconographia botanica sive plantæ criticæ. Centuriæ I—XII. (Quum typis

excudebantur plagulae quibus gramina continentur,
paucæ modo decades centuriæ XI huc pervenerunt.)

Engl. B. = English Botany.

Sv. B. = Svensk Botanik.

Koch. Syn. = Koch synopsis floræ Germanicæ et
Helveticæ. 1837.

Fr. Fries; *Fr. nov.* = Fries novitiæ floræ Svecicæ.

Ed. 2. *Fr. fl. Scan.* = Ej. flora Scanica, Ups. 1835.

Weihe et N. ab E., v. Wh. = Weihe et Nees ab
Esenbeck Rubi Germanici (cujus operis modo 4
fasciculos (tab. I—XIV) vidi; in herbario Horne-
manni autem specimina multa Germanica, a cl.
Bernhardio missa, comparavi).

M. K. = Mertens et Koch (Deutschlands Flora.
I—IV.)

W. Kit. = Waldstein et Kitaibel (plantæ rariores
Hungariæ; cujus modo partes 1—2 ad manum
fuere).

Vaill. bot. par. = Vaillant botanicon parisiense.

Wimm. Grab. Wimmer et Grabowski (Flora Sile-
siæ 1—2.)

RBr. Robert Brown.

R. Sch. Römer et Schultes (Systema Vegetabilium).

P. B. v. Palis. B. v. Pal. de Beauv. Palisot de
Beauvois.

DC. De Candolle.

Sw. Swartz.

Sch. Schum. Schumacher. *En.* Ejusdem Enumeratio plantarum Sjællandiae septentrionalis et orientalis. I.

Sut. Suter (Sedum); Sutton (Orobanche).
(Nomina reliqua partim abbreviata magis cognita partim facilius conjecturâ intelligenda.)

Aut. Autorum, Autores.

! post locum specialem vernacula lingua expressum indicat, plantam hoc loco a me ipso esse inventam; (!) specimen hoc loco collectum mihi esse visum. ! post nomen [v. c. Kamphövener!] plantam hoc loco lectam mecum ab illo esse communicatam.

† ante nomen specificum plantam mihi aut in universum dubiam v. incognitam, aut dubiam floræ meæ civem significat.

Tempus florendi numeris expressi, ito ut 1 Januarium, 2 Februarium, 3 Martium etc. significet.

⊙ planta annua.

⊙ — biennis.

⌘ — perennis.

(Fruticibus et arboribus nullum durationis signum adpositum.)

♂ masculus.

♀ femineus.

♂ hermaphroditus.

a. albus.

achen. achenium.

acum. acuminatus.

XIV

- ar.* arista.
- bract.* bractæ.
- cal.* calyx.
- capit.* capitulum.
- caps.* capsula.
- car.* caryopsis.
- coer.* coeruleus.
- cor.* corolla.
- dent.* dentes.
- ext.* exterior.
- fl.* flos.
- 1fl.* uniflorus.
- 2fl.* biflorus etc.
- paucifl.* pauciflorus etc.
- fl. fl.* flores flavi.
- fol.* folium.
- fol. caul.* folia caulina.
- fol. per. v. fol. perig.* folia perigonia.
- fol. rad.* folia radicalia.
- fr.* fructus.
- im.* imellem.
- inf.* inferiores.
- int.* interior.
- lab.* labium; (in Orchideis:) labellum.
- lac.* lacinia.
- lanc.* lanceolatum.
- lat. v. later.* laterale.
- loc.* locis.
- loc. v. c. 1-loc., 2loc.* etc. 1loculus, 2loculus.

- lut.* luteus.
pall. pallide
pall.-purp., *pall.-coer.*; -purpureus, -coeruleus.
pan. panícula.
pasc. pascuis.
per. perigonium.
pet. petalum.
purp. purpureus.
rac. racemus.
rad. radicale.
ros. roseus.
rub. ruber.
sem. semen, -inibus.
sep. sepalum.
stam. stamina.
sup. superior.
v. (lat.) vel; (dan.) ved.
var. variat.
-

Classes systematis Linnæani.

I. Stamina vera adsunt.

A. Flores hermaphroditi (stamina et pistilla in eodem flore).

AA. Stamina a stylis discreta

a. antheræ liberæ (non invicem coalitæ).

aa. stamina libera.

1. Monandria stamen 1.
2. Diandria stamina 2.
3. Triandria — 3.
4. Tetrandria — 4, non didynama.
5. Pentandria — 5.
6. Hexandria — 6, non tetradynama.
7. Heptandria — 7.
8. Octandria — 8.
9. Enneandria — 9.
10. Decandria — 10.
11. Dodecandria — 11—18.
12. Icosandria — 20 et plura, calyci inserta.
13. Polyandria — 20 et plura, receptaculo inserta.
14. Didynamia stamina 4 quorum 2 longiora, 2 breviora.
15. Tetradynamia stamina 6 quor. 4 longiora, 2 breviora.

- bb. stamina (basi v. tota longitudine) connata.
16. *Monadelphia* *stam.* in unum fasciculum connata.
 17. *Diadelphia* *stam.* in 2 fasciculos connata.
 18. *Polyadelphia* *stam.* in 3 v. plures fascic. connata.
b. antheræ inter se coalitæ.
 19. *Syngenesia* (antheræ 5 in tubum (stylum cingentem) coalitæ.)
BB. Stamina pistillo adnata.
 20. *Gynandria*.
B. Flores *diclini* (stamina et pistilla in floribus distinctis).
 21. *Monoecia* flores masculi et feminei in eadem planta.
 22. *Dioecia* fl. masc. et fem. in distinctis plantis.
 - (23. *Polygamia* flores *diclini* hermaphroditis mixti. — Hujus classis plantæ ex florib. hermaphrod. inter priores classes dispersitæ sunt.)
 - II. Stamina nulla.
 - 23 (24 L.) *Cryptogamia*.

Ordines.

Ordines in classibus 1—13 construuntur ex numero stylorum v. (ubi styli deficiunt) stigmatum.

1. *Monogynia* stylus 1.
2. *Digynia* styli 2.
3. *Trigynia* — 3.
4. *Tetragynia* — 4.
5. *Pentagynia* — 5.
6. *Hexagynia* — 6.
7. *Polygynia* — numerosi.

In classi 14:

- Ordo 1. *Gymnospermia* ovaria 4; stylus centralis I. (Fruct. caryopsides 4, semina nuda referentes.)
- 2. *Angiospermia* ovarium I stylo terminali (fr. capsula).

In classi 15:

- Ordo 1. Siliculosæ siliqua lata et brevis.
— 2. Siliquosæ siliqua angusta et longa.

In classibus 16—18 numerus staminum ordines construit:

- Pentandria, stam. 5.
Hexandria, — 6.
Decandria, — 7.
Polyandria — numerosa.

In classe 19:

- Ordo 1. Polygamia æqualis flores omnes hermaphroditi.
— 2. Polygamia superflua fl. marginales feminei, discales hermaphroditi.
— 3. Polygamia frustranea fl. marginales steriles, discales hermaphroditi fertiles.
— 4. Polygamia segregata fl. omnes hermaphroditi, singuli calyce instructi.
(— 5. Monogamia flores separati nec in calathium congregati. — Genera huc pertinentia classi 5 inserta sunt.)

In classibus 20—22 ordines ex numero staminum construuntur.

In classe cryptogamica ordines familiæ naturales sunt; ex his quæ in hoc libro receptæ sunt, suo loco explicantur: Filices, Lycopodiaceæ, Equisetaceæ.

SYNOPSIS GENERUM.

Classis I. MONANDRIA.

Ordo I. MONOGYNIA.

A. Corolla nulla.

a. flores nudi.

1. Hippuris foliis verticillatis linearibus.
2. Salicornia planta articulata foliis nullis.

b. spatha.

Zostera (planta marina fol. linearibus). XXI.

B. Corolla.

Alchemilla Aphanes herba foliis inciso-digitatis. IV. 1.

Limnochloa alpina cyperacea. III. 1.

Ordo II. DIGYNIA.

Vulpia gramen. III. 2.

Blitum herba calyce baccante, caryopsis. V. 2.

Callitriche herba aqvatica v. limosa, capsula XXI. 1.

Ordo 3. TETRA-OCTOGYNIA.

Zannichellia herba aqvatica; spatha. XXI. 1.

Classis II. DIANDRIA.

Ordo I. MONOGYNIA.

A. Flores incompleti.

a. perigonium nullum.

1. Fraxinus arbor polygama floribus præcocibus.

b. perigonium.

- Salicornia* herba articulata aphylla salina. I. 1.
 2. *Lemna* herba aquæ dulcis natans acaulis.
Cladium Cyperacea magna fol. margine carinaque serratis. III. 1.
Rhynchospora Cyperacea fol. margine scabridis, spiculis glomeratis antheliceis. III. 1.
Scirpus setaceus cyperacea parva fol. lævibus spicis geminis spurie lateralibus. III. 1.
 B. Flores completi (corolla calyceque instructi).
 a. cor. supera.
 3. *Circaea* (cal. disepalo cor. dipetala, caps. 2locula).
 b. cor. infera.
 a. gymnospermæ (a: fructus caryopsis).
 4. *Lycopus* (cal. tubulosus 5dens cor. 4fida).
 b. angiospermæ (a: fructus capsula).
 †. cor. 2labia calcarata, caps.ilocula.
 5. *Pinguicula* cal. 5fido (fol. integra).
 6. *Utricularia* cal. 2sepalo (natans, fol. demersa multipartita utriculis obsita).
 ††. cor. 4partita, lac. inf. minor, caps. 2locula.
 7. *Veronica*.
 † *Lepidium ruderales crucifera* (cor. 4petala) olida. XV.

Ordo II. DIGYNIA.

- Blitum* herbæ. V. 2.
Anthoxanthum gramen, panicula contracta spiculis 1floris. III. 2.
Hierochloa (ex flore superiore) gramen panicula effusa spiculis 3floris. III. 2.

Ordo III. TETRAGYNIA.

- Ruppia* IV. 3.

Classis III. TRIANDRIA.

Ordo I. MONOGYNIA.

- I. Flores completi.
 1. Valeriana flore supero acheniis pappo instructis.
 - 2 Fedia flore supero acheniis nudis.
Montia flore infero capsulæ trivalvi. III. 3.
- II. Flores incompleti.
 - A. Liliacea perigonio corollino.
 3. Iris.
 - B. Cyperaceæ flore glumaceo (bracteolæ genitalia tegentes in spicis imbricatæ).
 - AA. Bracteolæ inferiores minores (plerumque vacuæ).
 - a. spiculæ in capitulum congestæ involucri membranaceo.
 4. Schoenus.
 - b. spiculæ in anthelam dispositæ involucri foliaceo.
 - a. bracteolæ pulcherrime distiche imbricatæ.
 5. Cyperus.
 - b. bracteolæ fere undique imbricatæ.
 6. Rhynchospora stylo persistente caryopsis (basi setis cinctam) coronante (culmo trigono).
 7. Cladium stylo deciduo, caryopside drupacea basi nuda (culmo tereti).
 - BB. Bracteolæ inferiores majores.
 - a. spiculæ bracteata in spicam compositam disticham dispositæ.
 8. Blysmus.
 - b. spiculæ simplices.
 - a. solitariae terminales.
 9. Heleocharis vaginis culmi aphyllis, bracteis membranaceis.
 10. Dichostylis vaginis foliiferis, foliis ad genicula fasciculatis, bracteis membranaceis conformibus.
 11. Limnochloa vaginis folio brevi instructis, bracteis apice herbaceo.

(*Eriophorum vaginatum* setis multis demum longissimis vide in seqv. divisione).

b. spiculæ adgregatæ v. anthelicæ.

12. *Eriophorum* setis numerosis lævibus post anthesin elongatis caryopsin multoties superantibus.

13. *Scirpus* setis 0 v. 6 scabris caryopside brevioribus.

Nardus gramen. III. 2.

Juncus (sp. 1—3.) perigonio 6phylo. VI. 1.

Ordo II. DIGYNIA.

Gramina.

Synopsis: I. *Gr. spurie spicata* (Rami inflorescentiæ breves v. brevissimi contigui, sive inordinati sive semiverticillati. Quum spica flectitur rami antea invisibiles apparent).

II. *Gr. paniculata* (Rami inflorescentiæ elongati semiverticillati plus minusve patentes).

III. *Gr. spicata* (Spiculæ in excavationibus axeos sessiles, (solis Brachypodiis brevissime pedunculatæ); inde spica composita efficitur).

I. GRAMINA SPURIE SPICATA.

A. *Spiculæ unifloræ v. seqvifloræ.*

a. spiculæ a dorso compressæ, stigmata aspergilliformia.

14. *Setaria* (bractea trivalvi, spiculis involuacro setoso involucretis).

b. spiculæ a latere compressæ, stigmata filiformia.

a. flos basi squamis duabus membranaceis instructus.

(16—17). *Phalaris* squamis aristatis florem superantibus, bracteis non alatis.

b. flos squamis basi non instructus.

15. *Alopecurus* bracteolis 1-valvibus.

16. *Phleum bracteolis* 2-valvibus flore basi nudo.
 21. *Ammophila bracteolis* 2-valvibus, fl. basi pilis cincto.
 B. *Spiculæ bi-multifloræ*.
 32. *Koeleria spica cylindræa terete* spiculis basi nudis, bracteolis compressis.
 45. *Cynosurus spica unilateralis* spiculis involucre pectinato instructis, bracteolis dorso convexis.

II. GRAMINA PANICULATA.

- A. *Spiculæ unifloræ v. seqvifloræ*.
 a. Flos basi squamis duabus membranaceis instructus.
 17. *Digraphis squamis minutis muticis*, bracteis æqualibus.
 24. *Anthoxanthum squamis flore longioribus aristatis*, bractea inf. duplo brevior.
 a. Flos basi squamis nullis.
 a. bracteæ ventricosæ, bracteolæ cartilagineæ.
 22. *Milium*.
 b. bracteæ carinatæ, bracteolæ membranaceæ.
 18. *Agrostis bracteolis basi glabris v. pilis brevissimis cinctis*, bractea inf. majore, arista nulla v. brevi bracteolam vix superante.
 19. *Apera bracteolis basi glabris*, bractea inf. minore arista subflexuosa bracteolam 3-4plo superante.
 20. *Calamagrostis bracteolis basi pilis rectis cinctis*, bractea inf. majore (bracteolis tenuioribus).
 21. *Ammophila bracteolis basi pilis rectis cinctis*, bractea inf. minore (bracteolis subcoriaceis).
 B. *Spiculæ bi-multifloræ*.
 AA. *Arista geniculata basi torta*.
 a. Flores omnes spiculæ hermaphroditi.
 28. *Avena spiculis 2-multifloris*, bracteola inf. bifida.
 29. *Avenella spic. bifloris*, bracteola truncata denticulata.
 b. Flos inferior ♂ superior ♀.
 27. *Arrhenatherum*.

BB. Arista nulla vel recta.

a. bractæ spiculam superantes v. æquantes.

aa. flores omnes spiculæ ♀.

30. *Aira* paniculæ ramis semiverticillatis inferior. subquinis, bracteola inf. truncata dorso aristata arista recta filiformi.

31. *Corynephorus* paniculæ ramis inf. geminis, bracteola inf. acuta integra ad basin aristata, ar. recta medio articulata barbata apicem versus incrassata.

33. *Triodia* paniculæ ramis solitariis (spiculis paucis ventricosis bracteis subcoriaceis) bracteola inf. apice tridenti dente medio in aristam rectam porrecto.

bb. Flos infimus vel duo inferiores vel flos superior ♀, reliqui ♂ vel neutri.

34. *Melica* bracteolis muticis, flor. sup. neutris imperfectis, stigmatibus in stylo brevissimo basin floris versus emergentibus.

26. *Holcus* flore inf. ♀ mutico, superiore ♂ aristato, stigm. in stylo brevissimo ad basin floris emergentibus.

25. *Hierochloa* floribus 2 inf. ♂ triandris, superiore ♀ diandro, omnibus muticis, stigm., in stylo elongato ex apice spiculæ emergentibus.

b. Bractæ bracteolis infimis breviores easve subæquantes.

aa. flores basi pilis longis cincti (infimus sterilis nudus).

23. *Phragmites*.

bb. flores (omnes fertiles) basi nudi vel lana parca crispula instructi.

a. Axis paniculæ teres ad exitum ramorum semiverticillatorum basi articularum nodosa.

aa. bracteolæ compressæ carinatæ.

36. *Poa*.

bb. bracteolæ dorso teretes.

†. bracteola sup. margine tenuissime ciliata v. scabriuscula.

35. *Briza* spiculis cordatis, bracteolis distiche imbricatis obtusis infima basi auriculato-cordata.

39. *Heleocholea* spiculis ovatis v. oblongis 4-9-floris bracteolis inf. subventricosis oblongis obtusis integris.
38. *Catabrosa* spiculis ovatis bifloris, bracteolis inf. subventricosis oblongis truncatis apice crosso denticulatis.
 ††. bracteola sup. margine setulis rigidis distantibus pectinato-ciliata.
37. *Bromus*.
 b. Axis paniculae angulata ramis geminis superne solitariis ad basin non articulatis.
 aa. bracteolae dorso teretes.
40. *Glyceria* spiculis lineari-oblongis 4-12-floris, bracteola inf. subventricosa oblonga obtusa margine scariosa, bractea inf. minore superiorem non amplexente.
41. *Molinia* spiculis ovato-oblongis subtrifloris, bracteolis inf. e basi ventricosa conicis obtusiusculis, bractea inf. minore basin superioris amplexente.
42. *Festuca* spiculis ovatis v. oblongis multifl., bracteola inf. lanceolata v. lanc.-subulata mutica v. sub apice aristata, bracteis subaequalibus v. inaequalibus (panic. laxa).
44. *Vulpia* bracteola inf. lanceolato-subulata longissime aristata, bracteis valde inaequalibus inf. brevissima (panic. unilaterali racemiformi, stamine 1).
 bb. bracteolae compresso-carinatae.
43. *Dactylis* (spiculis curvatis aristulatis in glomerulos congestis).
- III. GRAMINA SPICATA.
- A. Spiculæ in singula excisura axeos ternæ.
50. *Hordeum* spiculis 1-fl., (intermedia ♀ lateralibus ♂).
49. *Elymus* spiculis 2-3fl. (omnibus ♀).
- B. Spiculæ in excisura solitariae.
- a. bractea spiculam excavationi axeos immersam amplexente.
51. *Lepturus* (bractea sup. 0).

- b. spiculæ exsertæ.
 aa. bractea 0., spica unilateralis, stigma 1.
 52. *Nardus*.
 bb. bractea; spica disticha, stigm. 2.
 48. *Lolium* bractea 1valvi, spiculis dorso axi oppositis.
 47. *Agropyrum* bractea 2valvi, spiculis sessilibus latere axi oppositis, bracteola sup. margine tenuissime ciliata.
 46. *Brachypodium* bractea 2valvi, spiculis brevissime pedicellatis latere axi oppositis, bracteola sup. margine setulis rigidis distantibus pectinato-ciliata.

Ordo III. TRIGYNIA.

53. *Montia* cal. 2sepalo cor. synpetala.
 54. *Holosteum* cal. 5partito cor. 5petala.

Classis IV. TETRANDRIA.

Ordo I. MONOGYNIA.

- I. Flores incompleti (perigonio instructi).
 A. — hermaphroditi.
 1. *Majanthemum* fl. racemosis, perigonio 4partito, bacca.
 2. *Alchemilla* fl. cymosis v. axillaribus, perig. 8partito, cariopsis.
 B. Flores polygami.
 3. *Parietaria* (fl. ♂ et ♀, perig. 4partitum).
 II. Flores completi (corolla calyceque instructi).
 A. Cor. synpetala.
 a. — infera.
 a. flores spicati.
 4. *Plantago* cor. limbo reflexo, caps. circumscissa 2-locula.

- Verbena* cor. infundibulari, caps. 4locula. XIV. 1.
 b. flores axillares v. terminales.
5. *Centunculus* fl. axillar., cor. limbo expanso, caps. circumscissa.
- Gentiana* fl. terminal., cor. infundibulari, caps. 2valvi. V. 1.
 b. corolla supera.
 a. flores in capitulum (calathium) aggregati, cor. irregularis, fol. opposita. Dipsacæ.
6. *Dipsacus* anthoclinio paleato paleis pungentibus periclinii foliolis externis longioribus.
7. *Scabiosa* anthoclinio paleato paleis aut setiformibus aut membranaceis, periclinii foliolis subæqualibus.
 b. flores in corymbum vel paniculam dispositi regulares, fol. verticillata.
 aa. cor. infundibularis.
8. *Sherardia* achenio calycis limbo 6denti coronato (fl. rubellis).
9. *Asperula* achenio apice nudo cal. limbo obsoleto (fl. albis).
 bb. cor. rotata.
10. *Galium* acheniis siccis (fl. albis v. luteis).
 (10—11). *Rubia* acheniis succosis (fl. luteo-viridibus).
- B. Cor. tetrapetala.
 a. — infera.
11. *Cornus* (drupa).
 b. Cor. supera.
12. *Euonymus* frutex, caps. 4locula.
Rhamnus, frutex, bacca. V. 1.
Cardamine herba, siliqua. XV. 2.

Ordo II. DIGYNIA.

13. *Cuscuta* planta parasitica, cor. globoso-campulata, caps. circumscissa.
Gentiana herba cor. infundibulari. V. 1.
Herniaria herba perigonio 4-5partito. V. 3.
Alchemilla herba perigonio 8partito. IV. 1.
Ulmus arbor, fructus samara. V. 2.

Ordo III. TETRAGYNIA.

A. Flores incompleti.

14. *Ruppia* fl. spathatis perigonio nullo fruct.
(caryops.) stipitatis.
15. *Potamogeton* fl. spicatis perigonio 4partito,
fruct. sessilibus.

B. Flores completi.

a. calyx gamosepalus 4partitus.

16. *Radiola* caps. 8locula, 8valvi.
17. *Bulliarda* capsulis 4, 1valvibus longitudina-
liter dehiscentibus, 10-12spermis.

b. calyx 4sepalus.

Sagina. X. 5.

Classis V. PENTANDRIA.

Ordo 1. MONOGYNIA.

I. Flores incompleti (perigonium).

16. *Glaux* perig. infero petaloideo, caps. 5valvi,
5locula, 5sperma.

Polygonum perig. infero petaloideo, caryop-
sis, fl. spicatis. VI. 3.

34. *Herniaria* perig. infero viridi, caryopsis, fl.
axillaribus glomeratis.

35. *Thesium* perig. supero, drupa 1sperma peri-
gonio coronata.

II. Flores completi (calyce corollaque in-
structi).

A. Cor synpetala infera.

AA. Stylus ovariis 4 interpositus (BORAGINÆ).

2. cor. faux pervia (fornicibus non clausa).

1. *Echium* cor. irregulari, stam. adscendentibus.
2. *Lithospermum* cor. regulari, fauce gibbosa
aut impressa.

3. *Pulmonaria* cor. regulari, fauce penicillata.
 $\mathfrak{B}$. cor. faux fornicibus clausa.
 a. caryopsides styligenæ.
4. *Asperugo* caryops. ovatis compressis verrucosis cal. irregulari demum aucto basi sinuato-dentato arcte inclusis, latere stylo adfixis.
5. *Echinospermum* car. trigonis dorso stylo adfixis.
6. *Cynoglossum* car. depressis dorso stylo adfixis.
 b. caryopsides basigenæ.
 a. — basi excavatæ.
- † *Borago* cor. rotata fornicibus brevibus.
7. *Anchusa* cor. infundibulari, forn. 5 contignis.
8. *Symphytum* cor. cylindrico-ventricosa, forn. elongatis apice conniventibus.
 b. caryopsides basi non excavatæ.
9. *Myosotis* cor. hypocrateroide v. infundibulari forn. glabris.
 $\mathfrak{B}\mathfrak{B}$. stylus ex apice ovarii.
 $\mathfrak{A}$. Bacca.
21. *Solanum* cor. rotata, anth. subcoalitis, bacca 2locula.
 $\mathfrak{B}$. capsula.
 a. semina spermatophoro centrali adfixa.
 a. caps. 1locula. PRIMULACEÆ.
10. *Primula* cor. hypocrateroide v. subinfundibulari, cal. 5dente, caps. dentibus 5—10 dehiscente (fol. integris).
11. *Hottonia* cor. hypocrateroide cal. 5fido, caps. indehiscente (planta aquatica fol. pinnatis).
12. *Anagallis* cor. rotata caps. circumscissa.
13. *Lysimachia* cor. rotata limbo 5lobo, caps. apice dentibus dehiscente.
14. *Naumburgia* cor. rotata limbo 5fido laciniis 5 minoribus interpositis (caps. præcedentis).
 b. caps. 2-3locula.
 aa. — 2-4valvis apice dehiscens.
17. *Convolvulus* cor. infundibulari-campanulata plicata, cal. persistente, caps. lævi.

19. *Datura* cor. infundibulari plicato, cal. deciduo, caps. muricata.
18. *Verbascum* cor. rotata limbo 5lobo, stam. inæqualibus.
bb. caps. operculata.
20. *Hyoscyamus* cor. infundibulari limbo irregulariter 5lobo.
b. semina spermatophoris parietalibus adfixa.
22. *Menyanthes* cor. infundibulari intus fibrillosa, caps. 1locula 2valvi, spermatoph. medio valvularum adfixis.
23. *Gentiana* cor. hypocrateroide, caps. intorsione valvularum 2locula, spermatoph. marginalibus, antheris rectis, fl. coeruleis.
24. *Erythraea* (cor. et caps. præcedentis) anth. post anthesin tortilibus, fl. rubris.
B. Cor. synpetala supera.
AA. Herbae, capsula
a. caps. apice dehiscens.
a. antheræ liberæ.
15. *Samolus* cor. campanulata, stam. 10, (quorum 5 antherifera 5 sterilia), caps. semiinfera 1locula 5valvi.
b. antheræ coalitæ.
25. *Lobelia* cor. irregulari, caps. 2-3locula apice valvis dehiscente.
26. *Jasione* cor. regulari, caps. 2locula apice poris dehiscente.
b. caps. latere dehiscens.
27. *Campanula* cor. campanulata 5fida.
† *Phyteuma* cor. stellata 5partita lac. initio connatis demum a basi solubilibus.
BB. Frutex, bacca.
28. *Lonicera* cor. irregulari, bacca 2-3locula.
C. Cor. 4-5petala.
AA. Cor. infera.
a. frutices.
- Euonymus cal. plano, capsula. IV. 1.
29. *Rhamnus* cal. campanulato, bacca 2-4locula.

b. herbæ.

30. *Viola* cal. 5sepalo, cor. 5petala, caps. 3valvi.31. *Impatiens* cal. 2sepalo, cor. 4petala, caps. 5valvi.

BB. Cor. supera.

32. *Ribes* frutex, fl. paniculatis, stylo 2fido.33. *Hedera* frutex scandens, fl. umbellatis, stylo simplici.

Ordo II. DIGYNIA.

I. Flores incompleti (perigonium).

A. Arbor.

36. *Ulmus* (fructus samara; fol. scaberrima).

B. Herbæ.

AA. Folia plana.

a. flores hermaphroditi.

Herniaria stam. 10 (5 antherifera 5 sterilia) caryopside globosa. Herba prostrata. V. 1.42. *Beta* stam. 5; perig. carnosio persistente, caryops. lenticulari (embryone horizontali).40. *Chenopodium* stam. 5. perig. 5partito demum aucto caryopsidem albuminosam horizontalem cingente (embr. peripherico).41. *Blitum* stam 1—5, perig. demum caryops. albuminosam erectam cingente (embr. peripher).

b. flores monoeci (v. polygami).

43. *Atriplex* ♀ et ♂: perig. 5partito; ♀: perig. bipartito, caryops. testa crustaceo (embr. peripherico).44. *Halimus* ♀ et ♂: per. 5partito; ♀: per. bipartito lacin. connatis, car. testa membranacea (embr. per).

BB. Fol. teretia carnosa.

38. *Schoberia* perig. non appendiculata (albumen 0, embr. spirali).37. *Salsola* per demum appendiculato, herba spinosa (albumen 0, embryone spirali).

39. *Kochia* per. demum appendiculato, herba inermis (embr. conduplicato).

II. Flores completi.

A. inferi, cor. synpetala.

45. *Cynanchum* cor. rotata, folliculis 2.

Gentiana cor. hypocrateroide, caps. 2valvi. V. 1.

Cuscuta cor. companulato-globosa, caps. circumscissa. Herba scandens. IV. 2.

- B. superi — in umbellam dispositi — cor. 4petala.

UMBELLIFERÆ.

α. *U. imperfectæ*, fl. nempe in umbella sessilibus.

73. *Hydrocotyle* petalis integris acutis, fl. capitatis in verticillis demum remotis, (fructu a latere compresso.)

75. *Eryngium* pet. erectis conniventibus emarginatis lacinula intermedia inflexa; fl. in capitulum involucretum congestis, (fructu subtereti squamulato).

74. *Sanicula* pet. erectis emarginatis lacinula inflexa, umb. composita fl. in umbellula sessilibus (polygamis) fructu subtereti aculeis uncinatis obsiti.

β. *U. perfectæ* fl. in umbellula pedicellatis.

1. *Solenosperma* albumine commissurâ (superficie interiori) sulco longitudinali (ob margines involutos) notato.

a. *carpidia* aculeata.

46. *Caucalis* costis secundariis serie simplici aculeorum obsitis.

47. *Torilis* costis secundariis seriebus multis aculeolorum obsitis.

b. *carpidia* non aculeata.

48. *Scandix* *carpidiis* 5costis, costis obtusis, rostro longissimo.

49. *Anthriscus* *carpidiis* non costatis costro 5jugo.

50. *Cherophyllum* costis 5 obtusis, rostro nullo.
51. *Myrrhis* fructu elongato costis 5 acutis cavis.
52. *Conium* fructu ovato, carpidorum costis 5 prominulis undulato-crenatis solidis.
2. *Platyspermæ* albumine commissurâ plano.
a. costæ primaria 5, secundaria 4.
53. *Daucus* cost. sec. muricatis, foliolis involucri pinnatifidis.
54. *Laserpitium* cost. sec. inermibus alatis, fol. invol. integris.
b. costæ primaria 5, secundaria nullæ.
aa. fructus alati (costis carpidorum lateralibus marginantibus).
a. fructus tetrapteri (alis nempe invicem distantibus).
58. *Angelica* petalis lanceolatis acuminatis.
- † *Levisticum* pet. subrotundis incurvatis integris.
59. *Selinum* pet. obcordatis emarginatis.
b. fructus dipteri (alis invicem in se incumben-
tibus).
55. *Pencedanum* costis omnibus æquidistantibus, pet. obcordatis in lacinulam inflexis.
56. *Pastinaca* costis lateral. remotis, pet. involutis, vittis filiformibus.
57. *Heracleum* cost. lat. remotis, pet. obcordatis, vittis apicem versus incrassatis.
bb. fructus non alati.
a. fructus a latere compressi.
aa. petala integra.
60. *Bupleurum* pet. apice truncatis involutis, fol. integris.
61. *Helosciadium* pet. expansis acutis, fol. pinnatis.
62. *Apium* pet. subrotundis expansis cum apiculo involuto fol. pinnatis.
bb. pet. obcordata cum lacinula inflexa.
63. *Ægopodium* cal. margine obsoleto, interstitiis non vittatis.
64. *Carum* cal. margine obsoleto, stylis reflexis, fructu oblongo, interstitiis 1-3-vittis.

65. *Pimpinella* cal. marg. obsoleto stylis patentibus, fructu gibboso-didymo, interstitiis trivittis.
66. *Cicuta* cal. marg. dentato, carpophoro libero, commissura bivitta interstitiis univittis.
67. *Sium* cal. marg. dentato, carpophoro adnato, commissura multivitta, interstitiis trivittis, vittis superficialibus, cost. lateral. marginantibus.
68. *Berula* (cal., carpoph., commiss., interstit. præcedentis) vittis pericarpio tectis, cost. lat. ante marginem positis.
 b. fructus a dorso compressi v. subteretes.
 aa. cal. margo obsoletus.
69. *Cnidium* fr. subgloboso, cost. alatis membranac. æqualibus.
70. *Æthusa* fr. ovato-globoso, cost. crassis carinatis lateral. paullo majoribus.
 bb. cal. margo dentatus.
71. *Oenanthe* styl. erectis, fr. cylindraceo, carpophoro adnato.
72. *Libanotis* styl. reflexis, fr. oblongo, carpophoro libero.

Ordo III. TRIGYNIA.

76. *Viburnum* frutex bacca 1sperma (fol. trilobis).
77. *Sambucus* frutex bacca 3-5sperma (fol. pinnatis).
- Stellaria* media herba capsula 6fida polysperma. X. 3.

Ordo IV. TETRAGYNIA.

78. *Parnassia*.

Ordo V. PENTAGYNIA.

- a. cal. scariousus.
79. *Armeria*, fl. capitatis, capitulo involucrato fol. linearibus.
80. *Statice* fl. spicatis, fol. oblongo-spatulatis.

b. cal. herbaceus.

81. *Linum* cal. 5sepalo, caps. 10-locula, 10sperma.
 82. *Drosera* cal. gamosepalo 5fido, caps. 1-locula polysperma.

Ordo VI. POLYGYNIA.

83. *Myosurus*.

Classis VI. HEXANDRIA.

Ordo I. MONOGYNIA.

I. Flores incompleti.

A. — glumacei.

a. — in spadice collecti.

1. *Acorus* perig. infero 6phylo, caps. 3-loc. indehiscente.
 b. flores umbellati, anthelici v. paniculati.
2. *Luzula* caps. 1loc. 3valvi 3sperma, sem. basi valvularum adfixis (fol. planis).
3. *Juncus* caps. 3loc. 3valvi polysperma, sem. margini interno dissepimentorum adfixis (fol. nullis v. teretibus).

B. Flores colorati.

a. perigon. gamophyllum.

a. 5partitum.

Polygonum VI, 3.

b. 6partitum.

4. *Convallaria* per. campanulato, stam. basi perigonii insertis, (fl. terminalib. racemosis).
5. *Polygonatum* per. tubuloso, stam. tubo perig. insertis, (fl. axillarib.).
 b. perigon. 6phyllum.
 a. flos terminalis solitarius.
 aa. spatha nulla.

Fritillaria fol. perigon. basi fovea nectarifera instructis stylo simplici stigm. 3.

6. *Tulipa* nectario nullo, stylo nullo, stigm. trifido.

bb. spatha.

Galanthus perig. campanulato 6partito, lacin. inter. brevioribus emarginatis.

Narcissus per. hypocrateroide, corona campanulata faucis inserta.

b. flores umbellati v. racemosi.

aa. stam. basi perigonii inserta.

9. *Allium* fl. umbellatis spathatis.

Muscari flor. racemosis bracteatis.

bb. stam. receptaculo inserta.

7. *Gagea* fl. luteis, bracteis herbaceis.

8. *Ornithogalum* fl. albis, bract. membranaceis, sem. globosis.

10. *Anthericum* fl. albis, bract. membranac., sem. angulatis.

II. Flores completi.

A. Frutex.

11. *Berberis* fl. flavis racemosis, bacca.

B. Herbæ.

12. *Peplis* fl. axillaribus, (planta uliginosa repens).

Trientalis fl. terminalibus (planta sylvat. erecta). VII.

Ordo II. DIGYNIA.

Polygonum. VI. 3.

Ordo III. TRIGYNIA.

A. Ovarium 1 stylis 3 (v. stylo 1 tripartito).

15. *Triglochin* perig. 6phyllo, schizocarpio tripartibili 3spermo.

13. *Polygonum* per. 5partito colorato, achenium.

14. *Rumex* cal. 3-partito, cor. 6petala marcescente, caryopside triqvetro.

B. Ovaria 3.

46. *Scheuchzeria* per. 6partito, caps. loculis liberis dispermis.

Ordo IV. HEXAGYNIA.

Triglochin cfr. Ord. præc. Nr. 14.

Ordo V. POLYGYNIA.

17. *Alisma* cal. 3sepalo, cor. 3petala.
-

Classis VII. HEPTANDRIA.

Ordo I. MONOGYNIA.

1. *Trientalis*.
-

Classis VII. OCTANDRIA.

Ordo I. MONOGYNIA.

I. Cor. synpetala.

A. Flos inferus, capsula.

1. *Calluna* cal. colorato corollam campanulatam superante (caps. dissepimentis spermatophoro adnatis suturæ oppositis).
2. *Erica* cal. herbaceo corollā oblongo-ventricosā multo breviorē (caps. dissep. medio valvarum adfixis).

B. Flos superus, bacca.

3. *Myrtillus* cor. ovata v. globosa limbo 4-5fido patente, antheris cristatis, fol. deciduis.
4. *Vaccinium* cor. campanulata limbo 4-5fido patente, antheris muticis, fol. sempervirentibus.
5. *Oxycoccus* cor. rotata 3partita lacin. reflexis, antheris muticis.

II. Cor. pleiopetala.

A. tetrapetala.

a. herba foliata petalis patentissimis.

6. *Chamaenerium* cor. irregulari, stam. liseri-
alibus, stylo reclinato, semin. papposis.7. *Epilobium* cor. regulari, stam. 2serialibus,
stylo recto, seminib. papposis.*Oenothera* cor. regulari, seminib. nudis, (flor.
flavis).

b. herba aphylla pet. adrectis basi gibbis.

Monotropa. X. 1.

B. pentapetala.

8. *Acer* arbor polygama, fr. samara.

Ordo II. DIGYNIA.

Ulmus effusa, arbor. V. 2.*Scleranthus* caryops. perigonio persistente
tecta, fol. setaceis. X. 2.*Chrysosplenium* (ex fl. centrico) caps. Illoc.
polysperma, fol. reniformibus. X. 2.

Ordo III. TRIGYNIA.

9. *Centinodium* fol. in basin adtenuatis, fl.
axillar. fasciculatis, stylis 3 brevissimis stigm.
minutis (embryone laterali).10. *Tiniaria* fol. cordato-sagittatis, fl. axillarib.
fasciculatis, stylo 1 brevissimo stigmate 3lobo
(embr. laterali in albumine corneo).*Fagopyrum* fol. cordato-sagittatis, fl. race-
moso-paniculatis, stylis 3 stigm. capitatis (embr.
in albumine farinoso centrali).

Ordo IV. TETRAGYNIA.

A. *Planta* limosa v. aquatica, capsula.11. *Elatine* cal. 4sep. cor. 4petala.B. *Plantæ* sylvaticæ, bacca.

12. *Adoxa* fol. pluries divisis, cal. 2-3fido, cor. 4-5fida.
13. *Paris* fol. qvaternis ovatis integris, cal. 4sep. cor. 4pet.

Classis IX. ENNEANDRIA.

Ordo I. HEXAGYNIA.

1. *Butomus*.

Classis X. DECANDRIA.

Ordo I. MONOGYNIA.

A. Cor. synpetala.

1. *Andromeda* caps. 5locula 5valvi polysperma.
2. *Arctostaphylos* drupa supera 5pyrena.

B. Cor. polypetala.

3. *Monotropa* herbæ aphyllæ petalis basi gibbis.
4. *Pyrola* herbæ foliatæ petalis regularibus.

Ordo II. DIGYNIA.

A. Flores incompleti.

6. *Chrysosplenium* fol. orbicularibus, capsula.
5. *Scleranthus* fol. setaceis, caryops. perigonio corticata.

Herniaria fol. ovatis. caryopsis, stam. 5. sterilibus. V. 2.

B. Flores completi.

- a. caps. 2locula 2rostra inter rostra dehiscens.
7. *Saxifraga*.

- b. caps.ilocula apice valvis dehiscens.
 a. cal. basi decussatim squamatus.
8. *Dianthus*.
 b. cal. basi nudus.
9. *Gypsophila* cal. campanulato (cor. fauce nuda) pet. in ungve cuneatum adtenuatis.
Saponaria cal. tubato (cor. fauce coronata) pet. ungve lineari.

Ordo III. TRIGYNIA.

- A. Cal. gamosepalus quinquev. dens.
10. *Silene*.
 B. Cal. 5sepalus.
 a. pet. bifida.
11. *Stellaria* caps. 6valviilocula.
 b. pet. integra v. leviter emarginata.
 a. stipulæ scariosæ fol. linearia.
12. *Alsine* caps. 3valvi.
 b. stipulæ nullæ, fol. ovata.
13. *Halianthus* caps. 3valvi.
14. *Arenaria* caps. 6valvi.

Ordo IV. PENTAGYNIA.

- A. Germina 5 stylifera, caps. 5 in gyrum posita.
15. *Sedum* (herbæ succulentæ).
 B. Germ. 1 styli 5, caps. 1.
 a. cal. gamosepalus.
16. *Agrostemma* cal. coriaceo 5fido lacin. corollam superantibus (fauce coronata).
17. *Lychnis* cal. herbaceo 5denti, lac. corollæ brevioribus (fauce nuda).
 b. cal. 5dens.
 a. stam. basi coalita.
- Oxalis* XVI. 2.
 b. stam. libera.
 aa. pet. bifida v. emarginata.
18. *Malachium* pet. 2partitis, caps. 5valvi valvis 2partitis (fol. cordatis).

19. *Cerastium* pet 2fidis v. emarginatis, caps. 10valvi (fol. ovatis).
bb. pet. integra.
 20. *Spergula* cal. 5sep., cor. 5pet., caps. 5valvi, fol. verticillatis.
 21. *Spergella* (cal. cor. caps. præcedentis) fol. oppositis.
 22. *Sagina* cal. 4sep., cor. 4pet., caps. 4valvi, fol. oppositis.
-

Classis XI. DODECANDRIA.

Ordo I. MONOGYNIA.

1. *Lythrum* cor. 6petala, cal. 12fido infero.
- (1—2) *Asarum* cor 0., cal. 3fido supero.

Ordo II. DIGYNIA.

2. *Agrimonia*.

Ordo III. TRIGYNIA.

3. *Reseda* caps. 3locula apice aperta.
- Euphorbia* caps. 3cocca 3locula. XXI. 1.

Ordo VI. DODECAGYNIA.

4. *Sempervivum*.
-

Classis XII. ICOSANDRIA.

Ordo I. MONOGYNIA.

1. *Prunus* drupa pruina casia obducta, putamine compresso (fl. subbinis).

2. *Cerasus drupa* pruina destituta, putamine turgido (fl. racemosis v. umbellatis).
Cratægus monogyna drupa 1-2pyrena, fol. incisis, cfr. Ord. seqv.

Ordo II. DI-PENTAGYNIA.

- A. Fructus superus.
3. *Spiræa* (caps. 2-6sperma).
- B. Fructus inferus.
4. *Cratægus drupa* 1-5pyrena (fol. laciniatis v. pinnatifidis).
5. *Malus pomo* 2-5locula ad basin umbilicato, stylis basi connatis (fol. integris).
6. *Pyrus pomo* 2-5loc., basi non umbilicato, stylis liberis (fol. integris).
7. *Sorbus bacca* 1-5sperma (fol. pinnatis v. lobatis.)

Ordo III. POLYGYNIA.

- A. Cal. lacinia 1seriales.
8. *Rosa* cal. tubo urceolato (superne coarctato) demum carnosio caryopsides setosas includente.
9. *Rubus* cal. plano, drupis receptaculo adfixis baccam compositam referentibus.
- B. Cal. lacinia 2seriales.
- a. stylus deciduus.
10. *Fragaria* receptaculo demum carnosio succulento baccaformi deciduo.
11. *Comarum* rec. subgloboso spongioso sicco persistente, pet. rubris.
12. *Potentilla* rec. plano v. subconvexo sicco persistente, pet. flavis v. albis.
- b. stylus persistens caryopsin coronans.
13. *Geum*.

Classis XIII. POLYANDRIA.

Ordo I. MONOGYNIA.

A. Corolla synpetala.

a. Calyx 2sepalus.

1. *Chelidonium* caps. siliqvæformi, fl. flavis.
2. *Papaver* caps. incomplete multilocula sub
stigmatè radiato poris dehiscente, fl. rubris.
b. Calyx 4sepalus.
3. *Actæa* bacca.

B. Cor. 5petala.

a. flos regularis.

4. *Helianthemum* suffrutex fl. flavis fol. ovali-
oblongis.
 5. *Tilia* arbor fl. albis fol. cordatis.
b. flos irregularis.
- Delphinium* (Ord. seqv.).
- C. Corolla polypetala.
6. *Nymphæa* petalis albis dorso nudis.
 7. *Nuphar* pet. luteis dorso fovcâ nectarifera
instructis.

Ordo II. DI-TRI-PENTAGYNIA.

A. Stamina libera, calyx corollinus.

a. flores irregulares.

8. *Delphinium* sepalo superiore calcarato.
9. *Aconitum* sepalo superiore cucullato.
b. flores regulares.

Aquilegia.

B. Stam. triadelpa, cal. herbaceus.

Hypericum. XVIII. 1.

Ordo III. POLYGYNIA.

A. *Carpidia* monosperma indehiscen-
tia.

a. petala (nectaria) nulla, cal. corollinus.

a. *carpidia* caudâ lanatâ instructa.

15. *Pulsatilla*.

- b. *carpidia non caudata.*
 aa. involucrem.
14. *Hepatica* invol. calyciformi calyci (corollino) azureo adproximato.
13. *Anemone* invol. a calyce (corollino) albo v. luteo distante.
 bb. involucrem nullum.
12. *Thalictrum.*
 b. petala nectarifera.
11. *Ranunculus* cal. 5sepalo cor. 5petala.
10. *Ficaria* cal. 3sepalo, cor. 8—10petala.
 B. *Carpidia polysperma dehiscentia.*
 a. petala (nectaria) nulla, cal. corollinus.
18. *Caltha.*
 b. petala (nectaria) adsunt, cal. corollinus.
 a. *carpidia stipitata.*
17. *Eranthis.*
 b. *carpidia sessilia.*
- (17—18) *Helleborus* cal. 5sepalo, pet. lamina tubulosa bilabia.
16. *Trollius* cal. polysepalo, nect. lamina plana, lineari.

Classis XIV. DIDYNAMIA.

Ordo I. GYMNOSPERMIA.

- I. Flores spurie verticillati.
2. Cal. 10dens, dentibus alternis minoribus.
11. *Marrubium.*
 28. Cal. 5dens v. bilabius.
 A. Stamina divergentia.
 a. calycis dentes subaequales.
1. *Mentha* cor. subregulari, antherarum loculis parallelis.
- (1—2) *Elsholtzia* cor. subregulari, antherar. loc. divergentibus.

2. *Origanum* cor. labiata.
b. calyx bilabius.
15. *Clinopodium* verticillis involucretis, stam. superne arcuato-conniventibus.
14. *Calamintha* involucre 0, stam. præcedentis.
13. *Thymus* invol. 0, stam. rectis apice patulis.
B. stamina parallela.
a. cor. labium superius 0 v. planum.
18. *Teucrium* labio superiore 0.
17. *Ajuga* lab. sup. plano, cor. intus barbata.
6. *Nepeta* lab. sup. plano, cor. intus nuda, lobo medio labii inferioris concavo crenato.
7. *Glechoma* lab. sup. plano, cor. intus nuda, lobo medio lab. inf. plano emarginato.
b. cor. labium sup. concavum v. fornicatum.
a. cal. bilabius.
19. *Scutellaria* cal. labiis indivisis.
16. *Prunella* cal. labiis divis. 71
b. cal. regulariter 5dens.
aa. cor. lobi labii inferioris acuti v. medius obtusus laterales nulli v. dentiformes.
9. *Galeobdolon* lobi omnes acuti, flor. lutei.
8. *Lamium* lobus med. obtusus, laterales nulli v. dentiformes fl. rubri v. albi.
bb. cor. lobi labii infer. omnes obtusi.
aa. cor. intus nuda.
3. *Galeopsis* lobo medio labii infer. subquadrato utrinque dentato, antheris valvatim dehiscentibus.
4. *Betonica* lobo medio lab. inf. obcordato, antheris per rimam longitudinalem dehiscentibus.
bb. cor. intus barbata.
5. *Stachys* caryops. apice rotundatis glabris, fol. integris, stam. post anthesin extrorsum tortis.
12. *Ballota* caryops. et fol. præcedentis, stam. post anthesin rectis.
10. *Leonurus* caryops. apice triangulari-truncatis villosis, fol. trifidis
- II. Flores sparsi spicati.
20. *Verbena* (Fructus juvenilis caps. 4locula, maturitatem versus in carpidia 4 secedens).

Ordo II. ANGIOSPERMIA.

I. Corolla subæqualis.

30. *Limosella* cor. limbo 5fido, ovario 1loculo, fl. solitariis.

Verbena cor. limbo 4fido, ovario 4loculo, fl. spicatis. XIV. 1.

II. Corolla inæqualis bilabia.

A. Anth. loculi basi spinula instructi, caps. dissepimentum æquale.

a. capsula 1locula.

31. *Lathræa* cor. deflorata tota decidua, lab. sup. integro.

32. *Orobanche* cor. deflorata tota decidua basi persistente, lab. sup. emarginato.

b. capsula 2locula.

aa. semina 1—4 (lævia aptera).

21. *Melampyrum*.

bb. semina numerosa.

a. cal. 5dens.

25. *Pedicularis*.

b. cal. 4dens.

22. *Alectorolophus* cal. ventricosus, sem. compressis lævibus.

23. *Euphrasia* cal. tubuloso, sem. turgidis v. cylindricis striatis, cor. lab. inf. 3lobo, caps. compressa.

24. *Odontites* cal. et sem. præcedentis, cor. lab. inf. integro, caps. turgida.

B. Antheræ muticæ, caps. dissep. medio incrassatum.

29. *Scrophularia* cor. subglobosa.

28. *Digitalis* cor. campanulata.

26. *Linaria* cor. personata calcarata, caps. valvis dehiscente.

27. *Antirrhinum* cor. personata basi gibba, caps. foraminibus dehiscente.

Classis XV. TETRADYNAMIA.

Ordo I. SILICULOSA.

I. Silicula indehiscens.

A. Flores flavi.

13. *Neslia* silic. globosa reticulata subilocula
Isperma. (Embr. notorhizeus 0().)

Bunias silic. ovata verrucosa 2locul., loculis
superpositis Ispermis.

B. Flores albi (in *Kakile* rubri).

a. fl. racemosis.

2. *Crambe* silic. 2artic., articulo exteriori glo-
boso Ispermo, inter. parvo sterili (Embr. pty-
chorhizeus. 0>>.).

1. *Cakile* silic. oblonga quadrata biartic., arti-
culo exteriori pugioniformi. (Embr. lomato-
rhizeus. 0<.)

b. fl. glomerulosi axillares.

5. *Senebiera* silic. a latere compressa 2loc. 0().

II. Silicula dehiscens.

A. dissepimentum angustum.

a. silicula obcordata.

3. *Teesdalia* sil. alata loculis 2spermis, filam-
basi appendiculatis. 0<.

7. *Capsella* sil. aptera loculis polyspermis, filam-
edentulis. 0().

b. silic. subrotunda v. oblonga.

4. *Thlaspi* sil. subrotunda alata, loc. pleiosper-
mis. 0<.

6. *Lepidium* sil. oblonga ad apicem alata, loc-
Ispermis. 0().

B. Dissepimentum latum.

a. valvæ nervo dorsali instructæ.

14. *Camelina* sil. pyriformi inflata, stylo valvas
coronante bipartibili. 0().

10. *Cochlearia* sil. subglobosa v. elliptica tur-
gida, stylo dissepimentum coronante. 0<.

- b. valvæ enerviæ.
 aa. stamina appendiculata.
9. *Alyssum* sil. rotundata marginata valv. convexis, loc. 2spermis. 0⊖.
- bb. stamina edentula.
 a. fl. albi (v. rubri).
8. *Draba* sil. plano-compressa elliptica, loc. polysperm. spermatopodiis liberis. 0⊖.
- Lunaria* sil. plana subrotunda loc. polyspermis, spermatopodiis dissepimento adnatis. 0⊖.
11. *Armoracia* silic. subglobosa turgida. 0⊖.
- b. fl. lutei.
12. *Brachyolobus* silic. oblonga v. elliptica. 0⊖.

Ordo II. SILIQVOSA.

- I. Siliqua indehiscens.
15. *Raphanistrum* sil. moniliformi. 0>>.
- II. Siliqua dehiscens.
- A. Valvæ enerviæ.
21. *Nasturtium* sil. cylindrica, seminib. in loculo 2serialibus, fl. albis. 0⊖.
- Brachyolobus* fl. luteis. Cfr. Ord. præced. (12)
18. *Cardamine* sil. valvis planis spiraliter dissiliantibus, dissep. membranaceo. 0⊖, cotyl. planæ.
19. *Dentaria* sil. præcedentis, dissep. spongioso. 0⊖, cotyl. convolutivæ.
- a. Valvæ nervosæ.
 aa. nervus dorsalis l.
 a. fl. lutei.
23. *Erysimum* fol. lanceol. integris, sem. ovato-oblongis. 0⊖.
20. *Barbarea* fol. lyrato-pinnatifidis, sem. compressis. 0⊖.
27. *Brassica* fol. inf. lyratis sup. amplex., sem. subglobosis. 0>>.
- b. fl. albi v. rubri.
 aa. semina lserialia.
22. *Hesperis* stigmatē bilamello, lamellis erectis

- linearibus conniventibus, sil. subquadrangulo.
0().
16. *Arabis* stigm. emarginato, sil. compressa. 0<.
bb. semina biseriata.
17. *Turritis*. 0<.
bb. nervi dorsales 3—5.
a. valvæ dissepimento æquales.
24. *Sisymbrium* sil. lineari tereti. 0<.
25. *Chamæplium* sil. apicem versus adtenuata
subuliformi. 0().
b. valvæ dissepimento rostrum formante breviores.
26. *Sinapis*. 0>>.

Classis I. MONADELPHIA.

Ordo I. PENTANDRIA.

Lysimachia vulgaris L. V. 1. } capsula,
Naumburgia. V. 1. } stam. 5.

1. *Erodium* (fl. umbellatis) stam. 10, alternis
sterilibus, utriculis 5 caudatis intus pilosis.

Ordo II. DECANDRIA.

A. Cor. papilionacea.

Ononis
Sarothamnus } XVII. 3.
Anthyllis
Ulex

B. Cor. regularis.

2. *Geranium* (fl. solitar. geminatis) utriculis
5 monospermis caudatis intus glabris.
3. *Oxalis* caps. 5locula polysperma.

Ordo III. POLYANDRIA.

4. *Malva* cal. duplice, exteriori 3sepalis.
5. *Althæa* cal. duplice, exteriori 6-9fido.

Classis XVII. DIADELPHIA.

Ordo I. HEXANDRIA.

1. *Fumaria* caps. indehiscence (siliculæformi) monosperma.
2. *Corydalis* caps. dehiscente (siliquæformi) polysperma.

Ordo II. OCTANDRIA.

3. *Polygala*.

Ordo III. DECANDRIA.

I. Stamina monadelphæ.

A. Fol. simplicia v. ternata.

4. *Ulex* fol. linearibus pungentibus, fl. luteis, legum. calycem parum superante.
5. *Sarothamnus* fol. ovatis (simpl. v. ternatis); fl. luteis, legum. calycem multoties superante.
6. *Ononis* fl. ternatis, fl. purpureis (v. albis), legum. calycem æquante v. subsuperante.

B. Fol. pinnata.

7. *Anthyllis* fl. luteis, cal. fructifero legumen includente.

II. Stamina diadelphæ.

A. Fol. ternata.

8. *Trifolium* fl. capitatis, legumine intra calycem incluso.
12. *Medicago* fl. capitato-spicatis, legum. exserto cochleato v. falcato.
9. *Melilotus* fl. racemoso-spicatis, leg. exserto 1-3spermo turgido subindehiscence.
10. *Lotus* fl. subumbellatis leg. elongato tereti.
11. *Tetragonolobus* fl. solitariis, leg. elongato quadrangulo-alato.

B. Fol. pinnata.

a. cum impari.

13. *Astragalus* fl. subcapitatis, leg. spurie biloculo.
- (13—14) *Onobrychis* fl. racemosis, leg. septis transversis articulato articulis singulis deciduis.
14. *Ornithopus* fl. subumbellatis, leg. toruloso-moniliformi.
b. fol. abrupte pinnata.
15. *Vicia* stylo undique pubescente v. infra apicem in latere exteriori barbato.
16. *Lathyrus* stylo plano latere interiori piloso, fol. cirrhat.
17. *Orobus* cirrhis nullis (cetera *Lathyri*).
- (p. 17) *Pisum* stylo carinato-triqvetro.

Classis XVIII. POLYADELPHIA.

Ordo 1. POLYANDRIA.

1. *Hypericum*.

Classis XIX. SYNGENESIA.

Ordo 1. (POLYGAMIA) ÆQUALIS.

- I. Semiflosculosæ, flor. omn. lingulatis.
 - A. Achenia nuda (pappo destituta).
 1. *Lapsana* anthoclinio nudo, fl. luteis.
 2. *Cichorium* anthoclinio paleato, fl. coeruleis.
 - B. Achenia pappifera.
 - AA. Pappus plumosus.
 - a. achenia rostrata.
14. *Tragopogon* anthoclinio nudo, periclinio simplici foliolis conformibus.

8. *Hippochæris anthocl. paleato, pericl. imbricato.*
 b. achenia non rostrata.
13. *Scorzonera pericl. imbricato (foliolis latis membranaceo-marginatis) non calyculato, plumulis pappi intricatis.*
3. *Apargia pericl. imbricato (foliolis angustis) non calyculato, pappo sordido fragili plumulis liberis.*
4. *Picris pericl. calyculato, pappo niveo molli deciduo plumulis liberis.*
 BB. *Pappus pilosus.*
 a. achenia rostrata.
11. *Mycelis calathiis 5floris, fl. uniserialibus.*
10. *Lactuca calathiis multifloris, fl. pluriserialibus, rostro basi nudo.*
9. *Taraxacum calath. multifi., fl. pluriser., rostro basi squamoso.*
 b. achenia non rostrata.
 a. pappus niveus mollis.
12. *Sonchus acheniis plano-compressis, periclinio basi ventricos.*
5. *Crepis achen. subteretibus apice constrictis, periclinio subcylindrico.*
 b. pappus sordide albus fragilis.
6. *Aracium achen. apicem versus adtenuatis sub pappo constrictis.*
7. *Hieracium achen. exacte cylindricis.*
- II. *Capitatae fl. omnes tubulosi, periclinii foliola hamata v. pungentia, stylus apice articulatus.*
 A. *Pericl. foliola hamata.*
17. *Lappa.*
 B. *Pericl. fol. mucronata v. spinifera.*
 a. *anthoclinium favosum.*
18. *Onopordon.*
 b. *anthoclinium paleatum v. setosum.*
 a. *pappus pilosus.*
16. *Serratula pappo persistente radio intimo longiore.*

20. *Carduus pappo deciduo* in annulum connato.
 b. pappus plumosus.
 15. *Carlina paleis apice fissis*.
 19. *Cirsium paleis setiformibus filamentis liberis*.
 (17—18). *Silybum paleis setiformibus filamentis monadelphis*.
 III. *Discoideæ*; fol. omnes tubulosi, periclinii foliola herbacea, stylus non articulatus.
 22. *Bidens anthocl. paleato*, achen. 2-4aristis.
 21. *Eupatorium anthocl. nudo*, achen. 5angulis, pappo piloso, calathiis corymbosis.
 23. *Petasites dioeca anthocl. nudo*, achen. subcylindricis sulcatis, pappo piloso, calath. thyrsoideis. (XIX. 2.)

Ordo II. (POLYGAMIA) SUPERFLUA.

- I. *Discoideæ fl. omnes tubulosi*.
 A. *Periclinium simplex subcalyculatum*.
 23. *Petasites dioeca calathiis thyrsoideis*, fl. rubris.
Senecio vulg. monoeca calath. subcorymbosis, fl. luteis. (31.)
 B. *Periclinium imbricatum fol. pluriserialibus*.
 a. achenia nuda v. pappo brevissimo coroniformi.
 25. *Tanacetum calath. corymbosis, fl. ♂ 5dentibus, ♀ 3dentibus*.
 26. *Artemisia calath. glomeratis racemosis, fl. ♂ 5dentibus, ♀ subdenticulatis intermixtis*.
 b. achenia pappifera pappus pilosus.
 a. calathia glomerata, pericl. fol. herbacea marg. scariosa.
 27. *Filago*.
 b. calathia subcorymbosa v. racemosa (non glomerata), pericl. fol. scariosa.
 28. *Gnaphalium calathiis heterogamis periclinifusco*, (fl. ♀ radialibus pluriserialibus).
 29. *Antennaria calath. homogamis, periclin. argenteo, fl. ♀ pluriserial., ♂ sterilibus*.

30. *Helichrysum* calath. heterogamis, periclin. argenteo, fl. ♀ uniserialibus.
- II. Radiatæ fl. discales tubulosi, radiales lingulati.
- A. achenia pappo piloso instructa.
- AA. pericl. foliola æqualia, (nonnullis basi calyculata).
- a. fl. ♀ pluriseriales.
21. *Tussilago*.
- b. fl. ♀ uniseriales.
- a. fl. lingulati revoluti (spec. 1 nulli).
31. *Senecio*.
- b. fl. lingulati patentes.
33. *Cineraria* calyculo nullo, calath. corymbosis.
32. *Jacobæa* pericl. calyculato, foliolis lserialibus, calath. corymbosis.
34. *Arnica* pericl. calyculato, foliol. 2serialibus, calath. binis-ternis.
- BB. pericl. foliola imbricata pluriserialia.
- a. antheræ caudatæ.
35. *Pulicaria* pappi serie exteriori brevi coronuliformi, interiori piloso.
36. *Inula* pappo piloso seriebus conformibus.
- b. antheræ non caudatæ.
- a. radius concolor.
37. *Solidago* anthocl. alveolato-lacinulato fl. ♀ uniseriales.
- b. radius discolor.
38. *Aster* anthocl. alveolato-lacinulato, fl. ♀ uniserial.
39. *Erigeron* anthocl. foveolato nudo, fl. ♀ pluriserial.
- B. achenia nuda v. coronulâ instructa.
- a. anthoclinium nudum.
- a. pericl. foliola biserialia æqualia.
40. *Bellis*.
- b. pericl. foliola multiserialia imbricata.
41. *Chrysanthemum* anthoclinio convexo.
42. *Matricaria* anthocl. convexo-cylindrico.

- b. anthoclinium paleatum.
 43. *Achillæa limbo florum marginalium subrotundo-ovato* (fl. marg. 4-8).
 44. *Anthemis limbo fl. marg. oblongo*.

Ordo III. (POLYGAMIA) FRUSTRANEA.

45. *Centaurea anthoclinio setoso*, pappo setiformi.
 22. *Bidens cernua* var. *anthocl. paleato*, achen. 2-4aristis. (XIX. 1.)

Ordo IV. (POLYGAMIA) SEGREGATA.

Echinops (post 45).

(Ordo V. MONOGAMIA.

Lobelia, *Jasione*, *Solanum*, *Viola*, in V. 1. quærenda.)

Classis XX. GYNANDRIA.

Ordo I. MONANDRIA.

- I. *Radix tuberosa*.
 A. *Labellum calcaratum*.
 a. *integrum*.
 1. *Platanthera*.
 b. *2-3fidum*.
 2. *Orchis calcare longissimo*, *antheræ loculis basi bursicula communi conjunctis*.
 3. *Gymnadenia calc. longiss.*, *antheræ loculis bursicula destitutis discretis*.
 4. *Himantoglossum calcare brevi bursiculæformi*.
 B. *Labellum non calcaratum v. basi gibbum*.

- a. ovarium contortum, lab. basi gibbum.
- 5. *Herminium*.
 - b. ovarium non contortum, calcar nullum.
- 6. *Ophrys* lab. plano 3fido lobo medio fisso, anthera tota adnata.
- 7. *Spiranthes* lab. concavo integro limbo crenulato, anthera libera.
- II. *Radix fasciculata* v. *ramosa*.
 - A. *Ovarium contortum*.
- 8. *Habenaria* labello calcarato plano 3fido, anth. adnato.
- 10. *Cephalanthera* lab. non calc. medio utrinque inciso genitalia includente, anth. libera.
 - B. *Ovarium non contortum*.
 - a. *labellum calcaratum*.
- 14. *Epigogium* (caule aphylo articulado).
 - b. *labellum non calcaratum*.
 - aa. *biarticulum*.
- 13. *Epipactis*.
 - bb. *non articulatum*.
 - a. *integrum*.
- 9. *Corallorhiza*.
 - b. *incisum bifidum*.
- 11. *Neottia aphylla*, anthera terminali sessili.
- 12. *Listera foliata*, anthera antica (gynostemio pone antheram producto).
- III. *Radix tuberosa tunicata*.
- 15. *Malaxis foliata* labello non calcarato.
- 16. *Epigogium aphyllum* labello calcarato.

Ordo II. POLYANDRIA.

- 16. *Calla*.

Classis XXI. MONOECIA.

Ordo I. MONANDRIA.

A. Folia linearia.

1. *Zostera* fl. ♂ et ♀ nudis alternatim intra spatham foliaceam sitis.
2. *Zannichellia* fl. ♂ nudis ♀ perigonio campanulato instructis, caryops plurimis stipitatis.
- B. Fol. ovata, obovata (in unica specie linearia sed basi latiora).
3. *Callitriche* carpid. 4.
4. *Euphorbia* caps. 3cocca.

Ordo II. DIGYNIA.

Lemna herba aphylla aquatica. II. 1.

Fraxinus arbor polygama. II. 1.

Ordo III. TRIANDRIA.

5. *Sparganium* spicis globosis, perigonio paleaceo, drupa sicca.
6. *Typha* spicis cylindricis culmum obvestientibus perigonio e setis composito, utriculo 1spermo.
7. *Carex* spicis cylindr. v. ovatis, bracteis (squamis) loco perigonii, caryops. involucri lagenæformi inclusis.

Ordo IV. TETRANDRIA.

A. Arbor.

8. *Alnus*.

B. Herbæ.

- a. flores completi.
9. *Littorella*.
- b. flores incompleti.
10. *Urtica* ♂: perig. 4-partito; ♀ per. 2partito.
- Parietaria* ♀ per. 4part. demum elongato stam. elasticis; ♀ per. 2part. IV. 1.

Ordo V. PENTANDRIA. (—81)

A. Herbæ.

Atriplex } V. 2. staminibus liberis, flor.
 Halimus } incompletis.

Xanthium. stam. connatis, fl. ♂ compecto, ♀
 asepalo (v. Ord. 7).

Quercus v. Ord. seqv.

Ordo VI. HEX-POLYANDRIA.

A. Flores completi.

12. Myriophyllum cor. 4petala, cal. 4sepalo;
 fol. multipartitis.

11. Sagittaria cor. 3petala, cal. 3partito, fol.
 integris.

B. Fl. incompleti.

X. herbæ.

13. Ceratophyllum fruct. caryopsis (♂ per.
 12phyllo; ♀ perigonio nullo).

14. Arum fr. bacca (inflorescentia spadix).

B. arbores.

a. amentifera.

a. stigmata 2, stam. squamis amenti inserta.

15. Betula fl. ♂ et ♀ amentaceis, nuce alata cum
 squama amenti decidua.

16. Carpinus fl. ♂ et ♀ amentaceis, nuce squa-
 mis demum auctis cincta, perigonio coronata.

17. Corylus fl. ♂ amentac., ♀ adgregatis, nuce
 aptera calyce 2partito persistente inclusa.

b. stigmata 3, stam. perigonio inserta.

18. Fagus ♀ involucre 4fido 2floro muricato.

19. Quercus ♀ invol. indiviso 1floro demum cu-
 puliformi fructum inferne amplectente.

b. conifera.

(18—) Pinus squamis strobili apicem versus in-
 crassatis umbratis.

(18—) Abies squamis æqualibus, lævigatis deciduis,
 fol. solitariis.

(18—) *Larix* squamis æqualibus lævigatis persistentibus, fol. fasciculatis.

Ordo VII. MONADELPHIA.

20. *Xanthium*.

Ordo I. POLYADELPHIA.

21. *Bryonia*.

Classis XXII. DIOECIA.

Ex flore masculo:

Ordo I. MONANDRIA.

Salix (Ord. seqv.).

Ordo II. DIANDRIA.

1. *Salix*.

Ordo III. TRIANDRIA.

a. frutices.

Salix fl. amentaceis (Ord. præced).

2. *Empetrum* fl. axillar. completis.

b. herbæ.

Carex (dioeca) cyperacea fl. incompl. XXI 3.

Valeriana (dioeca) fl. compl. corymbosis.
III. 1.

Ordo IV. TETRANDRIA.

a. herbæ.

Urtica (dioeca). XXI. 4.

b. herba.

a. fl. completi.

Rhamnus (cathart.) pet. calyci, stam. receptaculo insertis. V. 1.

3. *Viscum parasiticum*, cal. 0, antheræ petalis insertæ.

b. fl. incompleti.

4. *Hippophaë* perig. 2partito.

5. *Myrica* fl. amentaceis.

Ordo V. PENTANDRIA.

a. herbæ (perig. 5partito).

6. *Humulus* fol. lobatis, antheris erectis apice apiculatis.

(6—7) *Cannabis* fol. digitatis, antheris pendulis muticis.

b. frutices.

a. fl. completi.

Ribes (alp.) racemus. V. 1.

b. fl. incompleti amentacei.

1. *Salix* (pentandra) fol. lanc. deciduis, filament. elongatis.

7. *Juniperus* fol. linear. pungentibus sempervirentibus, anth. sessilibus.

Ordo VI. HEXANDRIA.

Rumex (acetosa et acetosella). VI. 3.

Ordo VII. OCTANDRIA.

8. *Populus*.

Ordo VIII. ENNEANDRIA.

9. *Mercurialis* perigon. 3partito.

10. *Hydrocharis* cal. 3part., cor. 3petala.

Ordo IX. DECANDRIA.

Lychnis (dioeca L.). X. 5.

Ordo X. DODECANDRIA.

11. *Stratiotes*.

Ordo XI. ICOSANDRIA.

[*Rubus* (Chamæm). XII.

Ordo XII. POLYANDRIA.

8. *Populus arbor*.

11. *Stratiotes herba*. XXII. 10.

Ordo XIII. SYNGENESIA.

Antennaria calath. corymbosis. } XIX. 2.
Petasites calath. racemos. }

Ex flore femineo.

I. *Herbæ*.

A. *Monogynia*.

a. fl. completi.

Valeriana (dioeca) fl. corymb. III. 1.

Antennaria calath. corymb. } XIX. 2.

Petasites calath. racemos. }

d. incompleti.

a. *cyperacea parva fol. setaceis.*

Carex (dioeca). XXI. 3.

b. *herbæ fol. integris.*

9. *Mercurialis perig. 3partito.*

Urtica (dioeca) perig. bipartito. XXI. 4.

c. *herbæ fol. lobatis v. digitatis.*

6. *Humulus scandens fol. lobatis.*

(6—) *Cannabis fol. digitatis.*

B. Trigynia.

Rumex (Acetosa et Acetosella). VI. 3.

C. Pentagynia.

Lychnis (dioeca L.). X. 5.

D. Hexagynia.

11. Stratiotes fol. ensiformibus serrato-aculeatis.

10. Hydrocharis fol. orbiculato reniformibus integerrimis.

E. Polygynia.

Rubus (Chamæmorus). XII.

II. Frutices v. arbores.

A. Fl. completi.

a. cor. 3petala, fol. sempervirentia.

2. Empetrum.

b. cor. 4-5petala, fol. decidua.

a. fl. racemosi.

Ribes (alpinum). V. I.

b. fl. aggregati.

3. Viscum stylo 0 stigm. obtuso, bacca 1sperma.

Rhamnus (cathart.) stigm. 4partito, bacca 4sperma. V. I.

B. Fl. incompleti.

a. fol. sempervirentia pungentia.

7. Juniperus.

b. fol. decidua.

a. fructus capsula.

1. Salix squamis amenti integris integerrimisqve.

8. Populus squamis amenti incisus.

b. fructus caryopsis v. bacca spuria.

5. Myrica fl. spicatis, perig. e squamis 4 formato.

4. Hippophae fl. subspicatis spica apice foliata, perig. tubuloso-bifido demum carnosio aucto baccam spuriam formante.

Classis XXIII. CRYPTOGRAMIA.

I. FILICES.

Planta foliaceæ, fructificatio dorsalis v. in stipitibus distinctis.

A. Sori dorsales.

℥. Indusium nullum.

1. Polypodium.

℞. Indusium spurium, i. e. sori margine frondis revoluti obtecti.

a. frondes fertiles et steriles conformes.

7. Pteris.

b. frondes fertiles dissimiles.

8. Lomaria soris marginalibus linearibus continuis (frond. sterilibus simpliciter pinnatifidis).

9. Struthiopteris soris in dorso venarum demum confluentibus et totum superficiem occupantibus (frond. ster. pinnatis, pinnis pinnatifidis).

©. Indusium verum.

a. sori lineares v. oblongi.

a. indusium lineare rectum.

2. Asplenium indusio simplici (1valvi) altero latere dehiscente.

3. Scolopendrium indusio 2valvi.

b. indusium oblongum subcurvatum.

4. Athyrium.

b. sori globosi.

5. Cystopteris indusio lateraliter adfixo, ad latus insertioni oppositum libero.

6. Aspidium indusio puncto centrati v. subcentrali adfixo, tota peripheria libero.

B. Sori spicati.

a. spica ramosa.

10. Osmunda sporangiis stipitatis rima longitudinali dehiscentibus.

11. Botrychium sporangiis sessilibus rima transversali dehiscentibus.

b. spica simplex disticha.

12. *Ophioglossum* (fol. integrum ovatum).

II. LYCOPODIACEÆ.

Plantæ foliatæ flores in axillis foliorum v. squamarum spicæ gerentes.

13. *Lycopodium*.

III. EQUISETACEÆ.

Plantæ aphyllæ simplices v. verticillatim ramosæ, flores spicati.

14. *Equisetum*.

12. *Ophiodon* (et integrum ovulum).
P. simplex (dilatata).

II. LYCOPODIACEAE.

13. *Lycopodium*.
L. complanatum (et integrum ovulum).
L. obscurum (et integrum ovulum).

III. Equisetaceae.

14. *Equisetum*.
E. arvense (et integrum ovulum).
E. hyemale (et integrum ovulum).

Classis I. MONANDRIA.

Ordo I. MONOGYNIA.

1. Hippuris Linn. Vandspier.

1. *H. vulgaris* L. (Fl. D. t. 87). — Hornem. Ed. 3. 1. p. 5. — Variat foliis latioribus et angustioribus. Demersa occurrit foliis numerosis longissimis internodia brevissima multoties superantibus. — 6-8. 24. — In rivulis et stagnantibus frequens.

2. Salicornia L. Salturt.

2. *S. herbacea* L. (303, 1621) — H. 1. 4. — Caulis succulenti articuli compressi emarginati. Variat prostrata et erecta, ramis patentibus et adrectis. — 8-10. ☉. — Ad littora marina locis argillosis, limosis, aqua salsa inundatis.

Classis II. DIANDRÍA.

Ordo I. MONOGYNÍA.

1. Fráxinus L. Ask.

3. Fr. excelsior L. (969). — H. 1. 13.
— Folia impari-pinnata foliolis lanceolatis serratis.
4—5. — In sylvis.

2. Lemna L. Andemad.

Obs. Plantulæ vere aphyllæ, corpus quod vulgo folium vocatur, frondis nomine salutamus; est neque caulis neque folium sed utraque simul conjuncta.

a. Frondes petiolatæ.

4. L. 1. trisulca L. (1586). — H. 1. 912. — Frondes lanceolatæ cruciatæ, radix lateralis.
6. ☉. — In fossis turfosis.

b. Frondes non petiolatæ.

α. radices confertæ.

5. L. 2. polyrrhiza L. (1589). — H. 1. 913. — Frons subrotunda subtus colorata. 6—8. ☉.
In aquis minus frequens.

β. radices solitariae.

6. L. 3. minor L. (1587) frondibus obovatis subtus planis. H. 1. 913. 6—7. ☉. 
Vulgatissima species in aquis stagnantibus.

7. *L. 4. gibba* L. (1588) frondibus obovatis subtus hemisphaericis spongiosis. H. I. 913. — ☉. — Cum præcedentibus rarior.

3. *Circæa* L. Steffensurt.

8. *C. 1. alpina* L. (1321) glaberrima fol. late cordatis breve acuminatis grosse dentatis ciliatulis, bracteis minimis, fructu oblongo-ovato. — H. I. 32. Petioli membranaceo-alati. Flores albi. Variat major et minor, magis et minus ramosa, racemo unico terminali vel simul pluribus lateralibus. 7—8. 24. — In sylvis humosis umbrosis ad truncos arborum. *Dyrhaven, Gielskov, Birkerød Schum. Herlufsholms Skov Aabye. I Skoven ved Kongens Möller. (!)*

9. *C. 2. intermedia* Ehrh. (256 m. b.) calyce glabro caule superne pubescente, foliis cordatis acuminatis grosse dentatis ciliatis glabris, bracteis minimis, fructu subrotundo-ovato. — Fere duplo major et robustior præcedente, cui similis. Sed folia longius acuminata, petioli latius marginati, fructus forma aliena et illi sequentis similior. Fl. albidi. — 7. 24. — In sylvis rarior. *I Skoven ved Steensholt Mølle (!). I Egebækvang ved Helsingør Steenberg. I Sparresholm Skov og Möens Klinteskov Poulsen.*

10. **C. 3. lutetiána** L. (210) pubescens foliis cordato-ovatis v. ovato-oblongis obsolete dentatis, bracteis nullis, fructu subrotundo-obovato. H. 1. 32. Fl. alb. 7—8. 24. In sylvis. Charlottenlund! Dyrehaven!

4. **Lycopus** L. Sværtelvæld.

11. **L. europæus** L. (1081). — H. 1. 31. — Fol. ovato-lanceolata inciso-serrata; fl. verticillati albi limbo rubro-punctato. 6—8. 24. — Locis humidis, umbrosis, ad fossas.

5. **Pingvícula** L. Vibefedt.

12. **P. vulgaris** L. (93). — H. 1. 27. — Fol. radic. ovata margine involuto, viscida. Pedunculus radicalis hirsutus v. glaber. Fl. violacei. 5—6. 24. — In uliginosis, turfosis. Lundehusmosen!

6. **Utriculária** L. Blærerod.

Obs. Folia multipartita utriculis obsita vulgo radicis nomine appellantur, vera autem radix filiformis est. Utriculi ante et post anthesin aquâ, sub anthesi aëre repleti sunt, quo fit ut planta ad superficiem aquæ tollatur.

13. **U. 1. vulgaris** L. (138) cor. labio superiore palatum æquante, calcare conico, foliis pinnatis multipartitis. H. 1. 29. Fl. flavi majusculi. 6. 24. — In fossis turfosis. Lundehus-

mosen! Lyngby Mose! Ved Gyrstinge Stberg. Holmegaardsmosen (!).

14. U. 2. *intermedia* Hayne (1262) cor. labio superiore palatum bis superante, calcare globoso, foliis ternato-dichotomis. — H. 1. 30. Fl. minores, pallidiores. 6. 24. — Cum præcedente rarior. *Lyngby Mose! Imellem Rudersdal og Birkerød Schum., i en Grøft ved den østlige Side af Holmegaardsmosen Poulsen.*

15. U. 3. *minor* L. (128) cor. labio superiore palatum æqvante, calcare carinato, foliis ternato-dichotomis. H. 1. 30. Tenella. 6. 24. — Cum prioribus. *I Lyngby Mose! Lundehusmosen H. Helsingör H. Ved Söborg og i Hulsö Mose ved Fjirhöi Lyngbye! I den østlige Side af Holmegaardsmosen Poulsen.*

7. *Veronica* L. *Ærenpriis.*

A. *COCHLIDIOSPERMA* Rchb. Floribus solitariis in axillis foliorum, seminibus excavatis pelviformibus.

a. pedunculi post anthesin reclinati, folia omnia conformia.

α. laciniae calycinæ acutæ.

16. V. 1. *hederæfolia* L. (428) fol. cordato-rotundatis 3—5lobis, cal. laciniiis cor-

datis ciliatis. H. 1. 23. Fl. rubelli v. coerulei. Pedunculi foliis breve petiolatis multo longiores. — Variat ex loco major et minor, pingvior et macrior, fol. 3 lobis et 5-lobis. 4—8. ☉. — In locis umbrosis, cultis frequens.

17. V. 2. *polita* Fries (449) fol. cordato-ovatis argute crenatis, cal. laciniis ovatis glabris. H. 1. 22. (V. *agrestis*. Omnia, præter descriptionem calycis, ad hanc nec ad sequentem spectant.) Rchb. ic. III. 304. 305. Gracilis, pedunculi filiformes plerumque folium superantes. Lac. calycinæ nervosæ. Fl. intense coeruleus (unicolor). 5—6. ☉. — In locis humosis, agris. *Paa Markerne, høre Haand af Landeveien før man kommer til Lundehuset! Ved Veien fra Charlottenlund til Sölyst! Ved Helsingör (!) Ved Baarse nær Præstø! I Kornet ved Maglebye paa Møen! (Jylland ved Aalborg!)*

β. *lacinia calycinæ obtusæ.*

18. V. 3. *versicolor* Fries (*agrestis* L.) (fig. ined.) fol. ovato-cordatis v. ovatis crenatis, capsula subrotunda emarginata glanduloso-pilosa, cal. laciniis ovatis. — Rchb. ic. III. 440. Robustior, lac. cal. hirsutæ, (in locis pingvioribus incisæ: V. *calycida* Fr.) folia magis ovata, pedunculos plerumque æquantia, loculi capsulæ approximati. “Stamina margini inferiori tubi inserta.

Cor. lilacina lacinia minore coerulea. 5-7. ☉ —
In locis cultis.

19. V. 4. opaca Fr. (...) fol. subrotundo-ovatis rugosis crenatis, capsula subobcordata crispulo-pilosa, cal. laciniiis spatulatis. Rehb. III. 441. Robustissima adfinium, opaca, pedunculi plerumque foliis breviores, capsulæ loculi distantes. "Stam. fauci inserta." Cor. coer. 5-9. ☉. — Ved Örholm Septbr. 1836!

b. pedunculi post anthesin adrecti, fol. floralia minora aliusque formæ.

20. V. 5. triphyllos L. (627) fol. inferioribus digitatis floralibus subintegris. H. I. 24. Caulis erectus, Cal. lacinia obtusissima, cor. coerulea. Flores adproximati racemum laxum referentes. 5-6. ☉. — In agris siccis. Roskilde H. Kiøge Kamphövener! Ved Helsingør paa en Ager syd for Byen Steenberg! Imellem Baarse og Lundbygaard! Imellem Nysø og Skibbinge H. Ved Borreby Ehrenreich.

B. VERONICA. Floribus in racemum dispositis bracteatis, seminibus planoconvexis.

a. racemi axillares.

aa. folia sessilia.

21. V. 6. scutellata L. (209, 1561) fol. lineari-lanceolatis integerrimis v. parce

retrosum dentatis, pedicellis fructiferis reflexis, capsula argute biloba. H. 1. 20. Caulis flaccidus, pedicelli tenuissimi bracteam longe superantes, stylus emarginaturâ capsulæ longior. α . glabra. β . undiqve pubescens (V. sc. villosa Vahl). — Cor. rubella v. alba. — 6—7. 24. — In humidis graminosis etc. α . almindelig. β . ved Brædderne af en Dam strax udenfor Bagsvær! I Bagsvær Skov! Ved Sisledam ved Helsingör Steenberg!

22. V. 7. Anagallis L. (903) fol. lanceolato-ovatis serratis, pedicellis fructiferis patentissimis, caps. orbiculari subemarginata. H. 1. 19. Cor. alba. v. rubella. — 6—9. ☉. — In locis uliginosis, ad scaturigines frequens.

bb. folia, saltem inferiora, petiolata.
 α . glabra.

23. V. 8. Beccabúnga L. (511). — H. 1. 19. — Caulis adscendens basi radicans, fol. ovata serrata breve petiolata, pedicelli bracteam paullum superantes, cor. coer., caps. subrotunda turgida subemarginata. 6—8. 24. — In locis limosis irrigatis, ad rivulos, fossas.

β . pubescentes v. pilosæ.

24. V. 9. Chamædrys L. (448) caule bifariam piloso, fol. cordato-ovatis breve petiolatis v. superioribus sessilibus, racemis la-

xis pedicellis patentibus. H. 1. 21. Cal. laciniae lanceolato-spatulatae capsulae triangulari-obcordata ciliata longiores, stylus longissimus, pedicelli plerumque bracteam superantes. Cor. magna, pulchre azurea. 5—7. 4. — In graminosis umbrosis, pratis elatioribus frequens.

25. V. 10. montana L. (1201) caule undique pubescente foliis longe petiolatis ovatis crenatis, racemis laxis pedicellis patentissimis. H. 1. 22. Cal. laciniae ovato-ellipticae obtusae capsula reniformi multo breviores, pedicelli bracteam superantes. Cor. pallide coerul. v. rubella. 5—7. 4. — In sylvis umbrosis inter folia dejecta. *Mangler i det nordlige Sjælland; omkring Kjöbenhavn i Frederiksdal Skov ovenfor Möllen og ved Gyngen! i Dyrehaven ned imod Ordrup Møse Poulsen. Ved Fuxveien Petit. I det sydlige og vestlige Sjælland og paa Møen meget almindelig!*

26. V. 11. officinalis L. (248) caule undique pubescente foliis breve petiolatis superioribus subsessilibus, foliis obovatis crenatis, racemis densifloris pedicellis brevissimis adrectis. H. 1. 21. Calyx capsula triangulari-obcordata paullo brevior, bractea pedicello longior floris fere longitudine. Cor. coer. 6—7. 4. — In locis siccis apricis.

b. racemus terminalis (vel simul plures in ramorum apicibus).

α. flores in racemo rarifloro alterni dispositi inferiores remoti.

27. V. 12. verna L. (252) fol. inferioribus digitato-incisis, floralibus linearibus. H. 1. 25. Caulis $\frac{1}{2}$ -2 pollices longus, simplex strictus v. ramosus ramis adrectis strictis. Cor. minima coer. 5-6. ☉. — In locis aridis, aggeribus. *Ved Ordrup (i Sandgraven og paa Gjærderne deromkring)! Brede Bakker Pouls. Møen ved Klintegaarden!*

28. V. 13. arvensis L. (515) fol. ex basi truncata latiore ovatis subcrenatis rugosis subhirtis. H. 1. 23. Caulis erectus magis minusve ramosus, robustior et tenuior. Rarius occurrit foliis integerrimis. (*Paa Tømmerpladsen!*) — Cor. coer, 4-6. ☉. — In locis aridis, aggeribus frequens.

29. V. 14. serpyllifolia L. (492) foliis ovatis v. ovato-oblongis crenulatis glabris. H. 1. 18. Caulis e basi adscendente erectus, cor. pallide coerulea. 6-7. 24. — In locis humosis, argillosis. *Paa Nørrefællad! Ved Valby!*

Obs. V. peregrina L. (407.) H. 1. 25. floræ nostræ civis non est. Figura fl. Dan., benè monente cl. Hornemann, ad cultum specimen

certe facta est; et quædam formæ V. serpyllifoliae facile pro hac desumi possunt.

β. flores in racemo spicæformi alterni oppositi verticillative dense stipati.

30. V. 15. spicata L. (52) fol. oblongis crenatis hirsutis. H. 1. 16. Fl. coerul. 7—9. 24. — In locis elevatis, calcareis. *Paa Holmene i Issefjorden, i Odsherred ved Kongsøre, Adlersborg H.; Ved Fredrikssund Sch.! Ved Kjøge og Stevns (!) Paa Bankerne ved Kalundborg Steenstrup!*

Classis III. TRIANDRIA.

Ordo I. MONOGYNIA.

1. Valeriana L. Baldrian.

31. V. 1. dioeca L. (687) fol. radical. ovato-cordatis caulinis profunde lyrato-pinnatifidis foliolis oblongo-linearibus subintegerrimis, floribus dioecis. H. 1. 42. Stolonifera, $\frac{1}{2}$ —1-pedalis. Planta ♂ gracilior corymbo effuso florib. majoribus, ♀ robustior corymbo congesto subcapituliformi. Cor. alba v. carnea. 5—6. 24. — In pratis subhumidis. *Paa Brædderne af Peblinge-*

söen! I Lundehusmosen! Ordrup Mose! Ved Helsingör Stberg. Holsteinborg Stbuch. Sorö Bredsd.

32. V. 2. officinalis L. (570) fol. omnibus pinnatis foliolis lanceolatis serratis, floribus hermaphroditis. H. 1. 43. Stolones nulli, 3—4pedalis. Fl. carnei v. albi. 6—8. 24. In pratis, dumetis humidis. Paa Grøfterne i Lundehusmosen! Paa Strandklinerne imellem Torbæk og Papirsmøllen!

2. Fédia Gärt. Krop.

33. F. 1. olitoria Gärt. (1681) caule lævissimo, achenio apice obsolete 2—3denti. H. 1. 44. Herba glauca, fl. coerulescentes. 4—6. ☉. — In locis siccis, aggeribus. Alm. om Kjöbenhavn, f. Ex. paa Christianshavns Vold, paa Grøfterne i Nærheden af Charlottenlund, og om Flaskekroen! Omkring Helsingör (!), Holsteinborg (!), Sæbygaard og Selchoudal (!). Borrebye Ehrenreich. Ved Tiissö (!). Møcn f. Ex. paa Aborrebjerget!

34. F. 2. dentata Vahl (738) caule scabro, achenio apice postice triangulo antice 3-denti. H. 1. 44. Plerumque major, folia ad basin dentata sublaciniata, (quod autem sæpe non aliter in præcedente est.) Fl. coerulescentes magis in carneum vergentes. 6—7. ☉. — Præcedente ra-

rior. *Ved Høfdingsgaard ved Veien til Kallehave!*
Ved Præstø! Møen Mørch.

3. *Iris* L. *Iris*.

35. *I. 1. pseudo-Acorus* L. (494) fol.
 caulem subæquantibus, floribus flavis. H. 1.
 45. — 6—7. 24. — In fossis, ad amnes frequens.

36. *I. 2. spuria* L. (734) fol. caule
 brevioribus, floribus coeruleis. H. 1. 46. — 6.
 24. — *Paa den nordøstlige Strandbræd af Saltholmen*
(Expl. samlede af Vahl, og Kamphøener!)

4. *Schoenus* L. *Skæne* *).

37. *S. ferrugineus* L. (1503). — H. 1.
 47. Capitulum e spiculis paucis compositum, bra-

*) Cyperacearum inflorescentia primaria
 est *spica*. In hac flores aut undique aut bifa-
 riam (distiche) dispositi sunt. *Bracteola* mem-
 branacea (glumæ, Skjæl H.) tegunt flores, qui
 aut basi *setis hypogynis* (Börster) obvallati sunt
 aut iis destituti. Funguntur hæ setæ vice ca-
 lycis. Infimas bracteolas geminas, si forma,
 magnitudine v. consistentia a ceteris differunt,
bracteos voco, quæ sunt siye membranaceæ (*Hele-*
ocharis, *Blysmus*) siye apice herbaceo mucro-
 nata (Limnochloa). — — Inflorescentia
 secundaria Cyperacearum vocatur *anthela*
 (Spirre) qui terminus etiam in Juncaceis adhi-
 betur. Est autem anthela species corymbi (Halv-
 skjærm, cfr. H.), ubi rami laterales maxime
 elongati spiculas medias longe superant et sape
 iterum anthelas minores gerunt. Ad minores

cteolæ atro-ferrugineæ, setæ hypogynæ 3—5. — 6—7.
 24. — In turfosis. *Ved Bidstrupgaard (Aabye!)
 Møen paa Enggrøfterne ved Grønsund Liebman!*

5. *Cypérus* L. Fladax.

38. *C. fuscus* L. (179). — H. 1. 50.
 Radix fibrosa, folia plana, bracteolæ fuscae, stigmata
 3, setæ hypog. 0. — 6—9. ☉. — Ad lacus exsicca-

ramificationes anthelæ bracteæ binæ adsunt; ad
 punctum emissionis totius anthelæ folia aut
 membranacea aut herbacea sita sunt, quæ invo-
 lucrum vocantur. Anthela est sive *terminalis*
 (endestillet) sive *spurie lateralis* (tilsyneladende
 sidestillet), et hic ultimus terminus adhibetur
 ubi involucri folium inferius erectum est et
 culmi continuationem refert. Sæpe hæc folium
 demum reflectitur. — Fructus Cyperacearum
 (caryopsis) vulgo *semen nudum* (nögent Frö)
 vocatur. Sed vera semina nuda non existunt,
 et fructus hoc nomine appellati duplicis generis
 sunt. Dico *caryopsin* (Sluttefrugt), quæ florem
 inferum sequitur; *achenium* (Skalfrugt) quod
 florem superum. In illa ergo pericarpium tam
 arcte semini adnatum est ut ægre discindi pos-
 sit, in hoc præter pericarpium etiam calyx.

Inflorescentiam primariam voco *florum ipso-
 rum* dispositionem; *secundariam* vero disposi-
 tionem spicularum, capitulorum, calathiorum
 cet., ubi. hæ *collectiones florum* vicibus florum
 ipsorum funguntur et ergo easdem dispositionis
 leges ac flores sequuntur. Infl. primaria fere
Anthodio sensu Linkiano synonyma; infl. secun-
 daria ab infl. composita caute distingvenda; in
 multis plantis enim infl. sec. etiam composita
 occurrit (ut in Scirpo sylvatico e. m. a.)

tos, fossas etc. Imellem Christiansholm og Bellevue ved Grøften som gaaer ned til Stranden Septb. 1837! I Frueskov ved Bagsvær Schum. Ved Lyngby, Fortunen, Fredriksborg H. I en Mose ved Skiæremøllen ved Fredensborg. (!)

6. **Rhynchospora** Vahl. Næbfrø.

39. *Rh. alba* Vahl (320). — H. 1. 49. (Schoenus albus) Culmus $\frac{1}{2}$ —1 pedem altus trigonus lævis, bracteolæ albæ demum subfuscae. 8—9. 24. In turfosis, paludosis. Lyngby Mose (!). Tepri Mose (!). Helsingör H. Holmegaardsmosen (!).

7. **Cladium** Browne. Avnknippe.

40. *C. Mariscus* R. Br. (1202). — H. 1. 33 (*Cl. germanicum*). Fol. margine carinaque serrato-aspera, culmus teres lævis 3-ped. Bracteolæ fuscae. 6—7. 24. — In fossis turfosis. I Lyngby Mose! Ved Nymølle, Roskilde, Slangerup H. I Holmegaardsmosen. (!)

8. **Blysmus** Panzer. Radax.

41. *B. l. compressus* Panz (1622) culmo obtusangulo foliis planis, setis hypogynis 6 retrorsum aculeolatis. H. 1. 48 Schoenus compressus L. Scirpus compr. Pers. — Involueri fol. infimum sæpius spicâ longius, raro brevius. Spiculæ 8—10 floræ, dilute rufo-fuscae, bracteolæ subdistiche imbricatæ. 6—7. 24. — In pratis, præ-

sertim maritimis. *Vesterfælle!* *Amager!* *Hel-singör* (i *Egebæksvang*).

42. *B. 2. rufus* Panz (1504) culmo tereti fol. teretibus, setis nullis. H. 1. 48 (*Schoenus*). — Involucris fol. majus sæpius spicâ brevius, interdum eam longe superans, spiculæ 4—6 floræ obscurius fuscae. 6—7. 24. — In pratis maritimis cum præcedente, sed rarior. *Vesterfælle!* *Salt-holmen* (!). *Paa Syltengene S. for Kjøge* (!)

9. *Heleócharis* R. Brown. Sumpstraa.

Obs. Quæ in hoc et sequentibus generibus vulgo folia nominantur, sunt culmi steriles folia referentes sed basi vaginis (interdum in folia terminatis) stipati. In hoc genere folia vera desunt.

A. Culmus basi vaginis duabus præditus, stylus cum caryopside articulatus.

43. *H. 1. palustris* R. Br. (546) culmo tereti v. subcompresso, caryopside obovato compressiusculo lævi. H. 1. 51 (*Scirpus palustris*). $\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ ped. In magnis speciminibus culmus sub spicâ coarctatus. Bracteolæ infimæ variant obtusæ et acutiusculæ, majore spicam nunc dimidiam, nunc fere totam amplectente. H. uniglumis Link, cui adscribitur bracteola infima spicam penitus amplectens, specie differre non videtur. Setæ

hypogynæ 3—4. — 6—8. 2. — In paludosis, aquis stagnantibus, fossis, ad ripas frequens.

44. H. 2. *acicularis* R. Br. (287) culmo sulcato-tetragono, caryopside oblonga longitudinaliter costata. H. 1. 53 (Scirpus). Tenella, gracilis, stolonifera; setæ hypogynæ deciduæ. 6—8. ☉.? — Ad ripas lacuum. *Ved Bræderne af Peblingesøen! Fuursøen henimod Frederiksdals Mølle!*

B. Culmus basi vaginis pluribus præditus, styli basis persistens (cum caryopside non articulatus).

45. H. 3. *Bæóthryon* Nees ab Esenb. (1862). — H. 1. 52 (Scirpus). Culmus teres lævis, spica ovata, bracteola infima spicæ fere longitudine, bracteolæ dorso castaneæ margine lato albido, car. 3gona lævis. 6—7. 2. — In pratis, turfosis. *Lyngby Mose(!). Holmegaardsmosen Aabye. Reersø(!).*

10. **Dichostylis** Pal. de Beauv. Kantfrö.

46. D. *fluitans* Pal. (1082). H. 1. 54 (Scirpus). Culmus fluitans ad genicula ramosus, ramo singulo basi vaginis laxis foliis longis instructis obsito, ramis superioribus spicâ ovata pallida terminatis. Memorabilis planta quippe quæ indolem radicis repentis, quam dicunt, cyperacearum explicat. — Stiginata 2, car. compressa, setæ hypog. nullæ.

7—8. 24. In lacubus minoribus, stagnis. *I en Fiske-dam ved (i?) Hareskoven Sch. (I Thyve ved Koustrup 1837)!*

11. *Limnochloa* Palis. B. Mosetot.

47. L. 1. *cæspitosa* Reichenb. (1861) culmo tereti lævi, setis hypogynis bracteola brevioribus. H. 1. 52 (*Scirpus cæspitosus*). Dense cæspitosa. Car. 3gona, bracteolæ deciduæ. 6—7. 24 — In turfosis hand frequens.

48. L. 2. *alpina* (620) culmo triqvetro scabro, setis post anthesin caryopsin multo superantibus crispatis. H. 1. 59. *Eriophorum alpinum* L. *Trichophorum* Pers. Rhizoma repens per brevia intervalla culmos emittens. Car. triquetra, bracteolæ fertiles persistentes. Sub anthesi L. cæspitosæ simillima. 4—5. 24. — In paludibus, turfosis. *Lyngby Mose! Mosen ved Viintappergaard-den! Teprimose (!). Ved Dronninggaard, Antvorskov H. I Holmegaardsmosen (!), i Mosen ved Kongsted, venstre Haand af Veien fra Rønnede Kro Kamphövener. Møen H.*

12. *Eriophorum* L. Kiæruld.

A. Spica solitaria, involucrium nullum.

49. E. 1. *vaginatatum* L. (236). — H. 1. 58. Cæspitosum. Culmus glaber superne trigonus, vaginæ superiores subaphyllæ inflatæ. Variat

bracteolis ovatis acutis et lanceolatis acuminatissimis.

B. Spicæ plures fasciculatæ, involucrem foliaceum v. membranaceum. (E. polystachyon Linn.)

50. E. 2. latifolium Hoppe (1381) culmo subtrigono fol. planis apice triquetris, pedunculis scabris. H. 1. 59 (E. polystachyon). 4—5. 24. — In pratis humidis.

51. E. 3. angustifolium Roth. (1442) culmo teretiusculo fol. canaliculatis apice triquetris, pedunculis lævibus. H. 1. 60. Variat pedunculis brevioribus et longioribus; inde spicis plus minus congestis. — 4—5. 24. — In turfosis frequens.

52. E. 4. gracile Koch. (1491) culmo obsolete trigono fol. triquetris, pedunculis tomentoso-scabris. H. 1. 61. Gracilius adfinium, lana brevior. 4—5. 24. — In turfosis. *Lyngby Mose! Mosen ved Viintappergaarden! Dronninggaard, Bagsvær H. Holmegaardsmosen (!).*

13. *Scirpus* L. Kogleax

A. Anthela spurie lateralis. Culmus teres.

a. *ISOLÉPIS* bracteolæ apice integræ mucronatæ, setæ hypogynæ nullæ.

53. *S. 1. setaceus* L. (311) spicis binis ternisve, involucri folio majori denique subreflexo, caryopside costata. H. 1. 55. 2-4 poll. Stigmata 3. — 7-8. ☉. In locis uliginosis, paludosis. *Ved Langesø nær Birkerød, ved Lyngby Sø Sch. I en Sø nærved Bidstrup Aabye.*

b. *HELEOGÉTON*. Bracteolæ emarginatæ mucronatæ; setæ hypogynæ.

54. *S. 2. lacustris* L. (1142) bracteolis lævibus, stigmatibus 3, cariopside trigona. H. 1. 54. 2-6 pedalis. 6-7. 24. — In aquis stagnantibus frequens.

55. *S. 3. glaucus* Sm. (1922) bracteolis punctato-scabris, stigm. 2, car. subtrigona convexa. H. 2. 114. Præcedenti simillimus, sed humilior, color glaucus. 6-7. 24. — Ad littora maritima. *Paa Vesterfælled! Ved Kjøge (!).*

B. *Anthela terminalis composita*. Culmus triqveter.

56. *S. 4. maritimus* L. (937) anthela composita, bracteolis mucronatis bifidis. — H. 1. 56. Spicæ pedunculatæ, rarius sessiles; interdum una modò adest. 7-8. 24. — In fossis, ad littora maris frequens.

57. S. 5. sylvaticus L. (307) anthela corymbosa supradecomposita spicis fasciculatis, bracteolis obtusis mucronulatis. H. 1. 57. — 6—7. 24. — In pratis sylvaticis.

Ordo II. DIGYNIA.

Gramina *).

14. **Setaria** Palis. de Beauv. Skiærmax.

58. S. viridis P. B. (852). H. 1. 65 (Panicum viride). Spica cylindracea, setæ involucri

*) Inflorescentia primaria graminum *spicula* (Smaaax) vocatur. In hac inferne *bractææ geminæ* (calyx bivalvis, toklappet Bæger H. gluma bivalvis *Alior*) quarum altera parum supra alteram adfixa est, includunt flores, quorum partes sunt: externe *bracteolæ geminæ* (corolla bivalvis, toklappet Krone H. glumella bipaleacea (-ata) *Alior*), tum *calyx disepalus* (Hønning-skjæl, Nectaria H. lodicula *Pal.*), interne *genitalia* (stamina plerisque 3, paucis 1 v. 2, styli 2, paucis 1). Bracteolarum superior s. interior minor, scariosa, nervis duobus laterali-bus qui inflexione marginis marginales evadunt. (Quum ergo bracteola superior dicitur *marginē tenuissime pilosa v. pectinato-ciliata*, revera sunt nervi qui eā indole præditi sunt.) Bractææ includunt aut florem unicum (*spicula uni-flora*, cemblønstret Smaaax), aut florem 1 cum rudimento alterius floris (*spicula sesquiflora*,

sursum scabræ. 7—9. ☉. — In campis aridis.
Imellem Skovshoved og Charlottenlund Schum. Paa
en Bakke ved Fiskebækbro ved Fuursøen Poulsen.
Ved Örholm paa Gruus, formodentlig udkastet fra

Smaaax eenblomstret med Ansats til en anden Blomst), aut deniqve duos pluresve (*spicula bi-multiflora*).

Inflorescentia secundaria est aut panicula (Top) aut spica spuria (falsk Ax, Topax), panicula ramis adabbreviatis v. brevissimis spiculis maxime contiguis, aut spica composita (sammensat Ax). Paniculæ ramī ex axi (Axe) aut tereti aut semitereti aut excisa egrediuntur, plus minus in ramulos dividuntur (sive inde a basi sive modo ad apicem) quorum ultimæ ramificationes *pedicelli* (Smaastilke) vocantur. Pedicellus nunc gerit *spiculam*.

Ovarium (germen, Frugtknude H.) duos stylos (paucis 1) gerit, qvi aut ex apice ovarii (*stylus apicalis*, endestillet Griffel) aut ex latere anteriore (*stylus lateralis*, sidestillet Griffel) egrediuntur. Stigmata triplicis generis sunt: 1. *St. filiformia* (traaddannede Ar) ex ipso apice floris *) emergunt et formantur stylo elongato a basi v. superne pilis brevibus undique et laxè adperso. (in generibus 15—17. 24. 25. 52.) 2. *St. aspergilliformia* (penseldannede Ar) sub apice vel e medio floris utrinque emergunt, styli elongati superne pilis longioribus densius congestis undique obsiti (in genn. 14. 23). 3. *St. plumosa* (fjedrede Ar) ad basin floris egrediuntur, stylus brevis compositus ex pilis distichis v. unifariam ad latus superius directis (in ceteris

*) In hac familia caute distingvendum inter *florem* et *spiculam*!

en Havel! Paa Marker og i Haven ved Borreby
Ehrenreich.

15. *Alopecurus* L. Rævehale.

A. Culmus e basi repente adscendens.

59. A. 1. *fulvus* Sm. (1801) arista inclusa e media bracteola egrediente, antheris fulvis. H. 2. 117. Spica læte viridis, culmus folia vaginæque glauco-cæsia. 6-9. ☉. — In locis paludosis. Imellem Christiansholm og Bellevue i den udtørrede Dam ved Grøften som gaaer ned til Stranden. Septb. 1837! (Jylland ved Evedrup. Jun. 1837!)

60. A. 2. *geniculatus* L. (861) arista exserta ad basin bracteolæ egrediente, antheris fuscis. H. 1. 71. Præcedente cui simillimus, robustior, obscure viridis, arista sæpius colorata. 5-7. ☉. — In pratis humidis frequens.

B. Culmus erectus.

61. A. 3. *agrestis* L. (697) culmo superne scabriusculo, spica elongata utrinque

generibus). — Fructus *caryopsis* (Sluttefrugt). In nonnullis generibus bracteolæ caryopsidi maturitatem versus adnatæ sunt (*car. corticata*).

Gramina sub *anthesi* (under Blomstringen) examinanda sunt; paniculæ forma ante et post hoc tempus plerumque diversa est, nec alio tempore stigmatum indoles observari potest.

acuminata. H. 1. 70. Bracteolæ ad medium usque connatæ acuminatæ carinâ anguste alatæ brevissime ciliatæ. 6—7. ☉. — *Paa Amager Kamphövener!*

62. A. 4. pratensis L. (1985) culmo glabro spica cylindrica utrinque obtusa. H. 1. 69. Bracteæ acutæ infra medium connatæ villoso-ciliatæ. 5—6. 24. — In pratis, pascuis frequens. *Udenfor Kastellet! I Lundehusmosen!*

16. Phléum L. Rottehale.

A. Bracteæ truncatæ. PHLEUM.

63. P. 1. pratense L. (1984). H. 1. 67. Rchb. XI. 1483—84. Spica cylindrica arista bracteâ brevior. *Phleum nodosum* L. (fl. D. 380) est forma in locis aridis crescens, spica multo brevior culmo inferne ad genicula tumente differens. 6—7. 24. In pratis siccis, pascuis, agris frequens.

B. Bracteæ in apicem adtenuatæ. CHILO-
CHLÓA.

64. P. 2. Boehméri Wib (531) spica lobata adtenuata, bracteis acuminato-mucronatis. H. 1. 68. Rchb. XI. 1488 (cfr. 89—90) Priori ex habitu similis statim dignoscitur spica adtenuata et si curvatur lobata. 6—7. 24. — In collinis aridis. *Paa en Skrænt i Skoven ovenfor Ny-mølle (!). Ved Fuglevad (!). Kjøge Aas, Græse Mølle ved Frederiksværk (!), i Skoven ved Kongens*

Möller (!), paa Bakkerne ved Tiissø i Selsk. med Scab. svaveolens (!). Möen i Klinteskov.

65. P. 3. arenarium L. (915) spica oblonga obtusa bracteis lanceolatis breve mucronatis. H. 1. 60. Bi-tri-pollicaris. 5-6. ☉. in arenosis. Ved Ulfshale paa Möen (!).

Phalaris L. Glandsfrø.

1. Ph. canariensis L. (...). H. 1. 63. Rehb. XI. 1492. Spica ovalis. 7-8. ☉. — Circa pagos interdum ex hortis profuga occurrit.

17. Digraphis Trinius. Rörgræs.

66. D. arundinacea Tr. (259). H. 1. 64 (Phalaris arundinacea). Rehb. XI. 1494 (Baldingéra). Paniculae rami sub anthesi patentes spiculas fasciculato-congestas ferentes. 6-7. 24. — Ad ripas frequens. Sorte Sö!

18. Agròstis L. Hvene.

A. Folia radicalia setacea, bracteolae aristatae.

67. A. I. canina L. (1443). H. 1. 75. Panicula colorata ovata, bracteola inferior sub medio dorso aristata, superior minima vel nulla. — (Fig. fl. D. fol. radic. setacea non representat.) — 6-8. 24. In pratis, turfosis cet. I Gjelskov (!). Ved Brede (!). Ved Rudergaard (!).

B. Fol. omnia plana, bracteolæ muticæ.

68. A. 2. vulgaris With. (163) ligula brevissima truncata, panicula fructifera patentissima. H. 1. 76. Panicula fusca, rarius viridis. Forma aristata quantum scio apud nos non lecta est. 6—8. 24. — In pratis siccis, agris frequens.

69. A. 3. stolonifera L. (1623) ligula oblonga, panicula fructifera contracta. H. 1. 77. A. alba Mert. Koch. A. coarctata Sch. ex parte. — Magnopere variat: longitudine et directione ramorum, colore, magnitudine cet. Figg. fl. D. 564, 751, 701, 1623 formas hujus speciei referunt. A. tenella Schum. est forma gracillima viridis ramis paniculæ flexuosis. 6—7. 24. — In arenosis, agris, turfosis, pratis, locis limosis exsiccatis frequens.

19. *Apéra* Palis. Vindax.

70. A. spica venti P. B. (853). — H. 1. 73. Agrostis sp. v. L. Panicula ampla diffusissima, 6—7. ☉. — Inter segetes in agris siccis.

20. *Calamagrostis* Roth. Rörhvene.

A. Bracteolæ muticæ.

71. C. 1. gracilis (...). H. 1. 85. (Arundo gracilis Schum.) Habitu C. lanceolatae similis, culmus inferne ramosus, panic. patens, bracteola exterior lanceolata obtusa crenulata, binervis,

bracteis multo brevior, pili bracteolarum longitudine.
 An sequentis varietas mutica? 6—7. 24. — *Paa Strandklinerne imellem Torbæk og Springforbi Schum. Senere ikke gjenfunden.*

B. Bracteolæ aristatæ.

a. arista terminalis.

72. C. 2. lanceolata Roth. (280). —
 H. 1. 82. (*Arundo Calamagrostis* L.) Richb. XI.
 1448. Panícula diffusa fusca, bracteolæ pilis breviores apice emarginatæ, arista ex emarginaturâ brevissima eamque vix superans. Culmus ramosus.
 6—7. 24. — In fruticetis, pratis sylvaticis. I *Lundehusmosen imellem Phragmites! Ved Lyngby Sø (!). Ved Røiens Bom ved Gjelsbakke! Ved Nøddebo (!).*

b. arista dorsalis.

α. recta, inclusa.

73. C. 3. epigejos Roth. (584) panícula patente thyrsoides lobata, pilis bracteolas superantibus, arista e medio dorso egrediente.
 H. 1. 81 (*Arundo Epigeios*). Variat: in apricis panícula coarctata subcolorata, in umbrosis subdiffusa glauco-viridi. 6—7. 24. In collinis arenosis, sylvis.
Paa Bakkerne ved Charlottenlund! I Skoven ved Örholm! Ved Bagsvær etc.

74. C. 4. stricta Hartm. (1803) panícula stricta angusta ante et post anthesin

coarctata spicæformi, pilis bracteola brevioribus, arista sub medio dorso egrediente. — H. 1. 83 (Arundo stricta Timm. Agrostis coarctata Schum. ex parte). Rchb. XI. 1429. Rami paniculæ brevissimæ, ante anthesin color sæpius coerulescens. 6—7. 24. — In pratis humidis, turfosis. *I Engen ved Ellekrattet ved Hesttangsmølle med Aconitum Kamphövener! Ved lille Veirløse Schlichtkrull! (I Jylland ved Aalborg, ved Aagaard i V. Hanherred og i Thy!)*

β. arista geniculata exserta.

75. C. 5. sylvatica De Cand. (1683). H. 1. 84 (Arundo sylvatica Schrad.) Rchb. XI. 1410. Panicula patens violaceo tincta. Pili bracteolis quadruplo breviores. 7—8. 24. — In collinis sylvaticis, glareosis, ericetis. (*Et sjæliandsk Væxsted er mig ikke med Vished bekjendt.*)

21. **Ammóphila** Host. Hjælme.

76. A. arenaria Host (917). H. 1. 85 (Arundo arenaria L.). 7—8. 24. — In arenosis maritimis. *Ved Helsingør omkring Lappesteens Batteri (!). Ved Tidsvilde (!). (Ikke ved Fuursøen Aabye.)*

22. **Milium** L. Miliegræs.

77. M. effusum L. (1143). H. 1. 72. Panicula diffusa, gramen magnum late viride. 6—7. 24. — In sylvis umbrosis. *Charlottenlund!*

23. **Phragmites** Trin. Tagrör.78. *Ph. communis* Tr. (...). H. 1.80. (*Arundo Phragmites* L.) Panicula colorata demum pilis albidis canescenti-variegata. Gramen maximum robustum. 8. 24. — In stagnis, ad ripas.24. **Anthoxanthum** L. Guulax.79. *A. odoratum* L. (666). H. 1. 35.

Panicula oblonga laxiuscula. Fl. diandri. (Squamæ membranaceæ ad basin floris sunt flores abortivi; hi in sequenti genere evolvuntur.) 5—6. 24. — In pratis, sylvis ubique.

25. **Hierochloa** Gmel. Festgræs.80. *H. borealis* Roem. et Schult. (963).H. 1. 98 (*Holcus odoratus* L.) Panicula divaricata, spiculæ majusculæ fuscae. Gramen elegans odorem suavem, præcipue exsiccatum, exhalat ut præcedens. 5—6. 24. — In pratis, turfosis. I *Lundehusmosen!*

Ordrup Mose!

Obs. *Planta lapponica aliquot partibus a nostra recedit.*26. **Holcus** L. Hestegræs.81. *H. 1. lanatus* L. (1181) arista inclusa, culmo villosa, radice fibrosa. H. 1. 95. 6—7. 24. — In pratis, pascuis, agris.82. *H. 2. mollis* L. (...) arista exserta,

culmo glabro, radice repente. H. 1. 96. Lætius virens, panicula magis patens, in umbrosis laxa, albens. 7—8. 24. — In sylvis, pratis, inter segetes frequens.

27. *Arrhenatherum* Pal. B.

Draphavre.

83. *A. elatius* Mert. et Koch (165). H. 1. 94 (*Holcus avenaceus* Scop. *Avena elatior* L.) Panicula æqualis, laxa. Flos inferior ♂ basi aristâ geniculata instructus, superior hermaphr. sub apice recte-aristatus. Rarius fl. superior ♀ vel ♂. Culmei nodi glabri vel villosi. 7—8. 24. — In pratis, dumetis. *Volden! Lundhusmosen paa Grøfterne! Imellem Torbæk og Strandmøllen!*

28. *Avēna* L. Havre.

A. AVENA spiculis pendulis bracteis 7—9-nerviis.

84. *A. 1. strigosa* L. (...) panicula secunda bracteolis glabris (apice bifidis laciniis setaceo-cuspidatis). H. 1. 129. 7—8. ☉. Inter segetes quasi spontanea.

(*A. sativa* L. differt panicula æquali bracteolis glabris apice bifidis denticulatisque.)

85. *A. 2. fatua* L. (1629) panicula æquali patente, bracteolis setoso-pilosis. H. 1. 129. — 7—8. ☉. — Inter segetes quasi spontanea.

B. Spiculæ suberectæ, bractæe 1—3nerviæ.

a. TRISÉTUM ovario apice piloso.

86. A. 3. pubescens L. (1203) panicula æquali ramis inferioribus subquinis, spiculis 2—3floris, fol. vaginisque pilosis. H. 1. 131. 6—7. 24. — In pratis, pascuis haud infreqvens. *Christianshavns Vold! Frederiksberg Have!*

87. A. 4. pratensis L. (1083) panic. contracta ramis inferioribus geminis, spiculis 4—5floris, fol. supra vaginisque scaberrimis. H. 1. 131. 6—7. 24. — In pratis siccis, collibus apricis. *Lundehusmosen!*

b. Ovarium glabrum.

α. TRISÉTUM foliis planis.

88. A. 5. flavescens L. (1507). H. 1. 132. Panicula effusa æqualis spiculæ trifloræ. 6—7. 24. — In pascuis. *Ved Veien imellem Lunde-
huset og Lyngby Hornem. Ved Veien fra Char-
lottenlund til Ordrup Lange!*

β. AVENAIRA fol. convoluto-setaceis.

89. A. 6. caryophyllæa Wigg. (382) panicula æquali patente. H. 1. 93 (Aira caryo-
phyllæa L.) Spiculæ bifloræ. 5—6. ☉. — In agris
aridissimis. *Amager!*

90. A. 7. præcox P. B. (383) panicula

contracta spicæformi. H. 1. 93 (Aira). Spiculæ bifloræ. 4—5. ☉. — Cum præcedente frequentior.

29. Avenella Bluff. Bunkehavre.

91. *A. flexuosa* (157). H. 1. 89 (Aira flexuosa L. *Avena flexuosa* Mert. et Koch). Panic. patens subnutans ramis flexuosis. Spiculæ bifloræ. 6—7. ☉. — In collinis, locis sterilibus.

30. Aira L. Bunke.

92. *A. cæspitosa* L. (240 p.) H. 1. 89. Folia plana 5nervia supra scaberrima, panic. effusa spiculis bifloris nitidis. 6—7. 24. In pratis.

31. Corynèphorus Palis. B. Sandskjæg.

93. *C. canescens* P. B. (1023). H. 1. 92 (Aira canescens). Glaucus, fol. setacea, panicula æqualis violaceo tincta. 7—8. 24. — In arenosis. *Ved Vedbæk!*

32. Koeléria Persoon. Kölerie.

94. *K. cristata* Pers (...). H. 1. 87 (Aira cristata L.) Panic. spicæformis basi interrupta. Fol. plana pilosa v. ciliata, culmus strictus. 6—7. 24. — In collinis apricis. *Paa en lyngklædt Bakke ved Jægerspriis Kamphövener!*

33. Triódia R. Brown. Tandbælg.

95. *T. decumbens* R. Br. (162). H.

I. 112 (*Poa decumbens* Scop. *Festuca dec.* L.) Folia vaginæque pilosa. 6—8. 24. In pascuis sterilibus, ericetis. *I en Mose imellem Aggershvide og Klampenborg (!). Ved Kjøge. Ved Tiissø (!).*

34. *Melica* L. Flitterax.

96. M. 1. uniflora Retz (1144) panicula laxa subsecunda ramis patulis spiculis erectis. H. 1. 99. Rami paniculæ spiculas 2-3 ferentes, spiculæ tantum unico flore completo instructæ, ligula oppositifolia acuminata subherbacea. Folia læte viridia. 5—6. 24. In sylvis umbrosis frequens. *Charlottenlund! Dyrehaven!*

97. M. 2. nutans L. (962) panicula in racemum simplicem secundum contracta spiculis nutantibus. H. 1. 98. Rami plerumque unicum spiculam (florib. completis 2 instructam) ferentes, ligula brevissima truncata. 5—6. 24. In dumetis, nemorosis rarior. *Imellem Ordrup Mose og Dyrehaven i Krattet! I Charlottenlund sparsommere! Korsør Skov Ehrenreich. Gyrstinge Skov ved Kilden Aabye.*

35. *Briza* L. Bævregræs.

98. B. media L. (258). H. 1. 112. Panicula æqualis patens ramis capillaribus spiculis nutantibus, bracteolæ fuscae margine scarioso albido;

ligula brevissima truncata. 6—7. 24. — In pratis, pascuis frequens.

36. *Poa* L. *Rapgræs*.

A. Radix fibrosa stolonibus nullis.

a. rami paniculæ post anthesin reflexi solitarii vel gemini.

99. P. 1. annua L. (1685). H. 1. 111. Bracteolæ glabræ nervis eminentibus. Floret fere per totum annum. ☉. In locis cultis, incultis, viis, plateis ubique.

b. rami paniculæ post anthesin patentes vel adrecti inferiores gemini vel quini.

α. bracteolarum nervi obsoleti.

100. P. 2. nemoralis L. (...) vaginis internodio brevioribus suprema folio suo brevior, ligula truncata brevi v. brevissima subnulla. H. 1. 109. Panicula deflorata coarctata ramis adrectis. Maximopere variat. Forma vulgaris tenella ligula subnulla ramis paniculæ subnutantis subsimplicibus, spiculis subbifloris; sæpius viridis vel glaucescens. Rarior forma panicula ramosissima ligula magis elongata, culmo rigidior, P. fertili simillima. (*I Gjelskov för man kommer til Bakken, venstre Haand af Veien Liebm.*) Forma robustissima panicula subæquali suberecta, spiculis majoribus 4—5floris ligula brevi rotundata, in locis

apricis argillosis. (*Ved Strandklinerne imellem Torbæk og Papirsmøllen, Septb.!* Huc *P. serótina* Hornem. 1. 108 excl. syn. *P. fertilis*.) — Præter hoc variat spiculis magis minusve compressis, floribus liberis v. lana parca connexis cet. Fl. D. t. 750, licet pessima, tamen certe ad hanc speciem pertinet. 7—9. 24. In sylvis.

101. *P. 3. fértilis* Host. (2166) vaginis internodia subæquantibus suprema folium suum æquante, ligula elongata. *P. palustris* Schum. Bracteolæ obtusæ ante apicem macula ochracea notatæ. 7—8. 24. *Lundhusmosen Schum.!*

β. bracteolarum nervi eminentes.

102. *P. 4. adspersa* n. sp. culmo lævi superne nudo vaginis lævibus internodio brevioribus suprema folio suo multo brevior, ligula elongata obtusa. — *Pois* fertili et nemorali adfinis; præter notas in diagnosi datas ab illa differt statura graciliori, ramis paniculæ minus ramosis post anthesin horizontaliter patentibus, bracteolis acutioribus; ab hac ligula elongata, panicula post anthesin patente. A sequente magis differt. Color graminis viridis v. cæsi-viridis, paniculæ ob antheras violascentes variegatus. 8—9. 24. In graminosis umbrosis. *I Grøfterne ved Veien til Charlottenlund, Septbr. 1836—37!*

103. *P. 5. trivialis* L. (1685) culmo

superne vaginisque scabris folio supremo vagina sua brevior, ligula oblongo acuta. H. 1. 106. Panicula viridis v. violaceo tincta. 6—7. 24. In pratis, pascuis ubique.

B. Radix stolonibus longe lateque repens.

104. P. 6. pratensis L. (1444) culmo lævi tereti v. subcompresso, panic. patente ramis elongatis, bracteolarum nervis elevatis, ligula brevi truncata. H. 1. 107. Præcedenti simillima facile distinguitur culmo lævi ligula brevi. Valde variat; insigniores formæ: 1) fol. brevibus latioribus panic. æquali spiculis robustis. 2) fol. radicalibus longissimis angustis, panicula magis contracta subnutante, colore glauco. (*Poa prat. angustifolia* Hornem. *P. angustifolia* Schum. ex parte.) 6—7. 24. In pratis, pascuis ubique.

105. P. 7. costata Schum. (...) culmo glabro subtereti superne nudo panicula patente ramis abbreviatis, spiculis subtrifloris bracteis acuminatis subcurvatis valide nervosis, inferioribus superiores subæquantibus. — Sequenti similis sed notis datis differt. *Paa Strandklinerne imellem Springforbi og Papirsmøllen Sch.*!

106. P. 8. compressa L. (742) culmo compresso ancipiti, panic. subsecunda ramis abbreviatis inferioribus subbinis, spic. 7—8floris

bracteolis acutis imbricatis obsolete nervosis.

H. 1. 110. 6—7—9. 24. — In pascuis, locis siccis, ad vias. *I Gröfterne imellem store Vibenshus og Lundhusmosen! Veiene paa Amager! Christianshavns Vold! Haraldsted paa Bankerne ved nordre Side af Søen Aabye!*

7. **Bromus** L. Heire.

A. Spiculæ superne latiores, bractea inferior uninervis superior trinervis.

107. B. 1. stérilis L. (1325). H. 1.

127. Panic. rami elongati apice nutantes. 5—8.

⊙. — In locis ruderalis, graminosis, ad vias. *Paa Byens Volde! Kongens Möller (!) Borreby Ehrenreich.*

B. Spiculæ superne angustatae, bractea inferior 3-5nervis superior 5-multinervis.

108. B. 2. secalinus L. (....) panic.

patente post anthesin nutante, spiculis glabris, bracteola inferiore superiorem æqvante aristâ suâ flexuosâ v. brevissimâ multo longiore, floribus sub maturitate margine contractis teretibus remotis, vaginis glabris. H. 1. 121.

Br. arvensis et pauciflorus Schum. Florens dignoscitur arista brevi flexuosa, bracteolis æqualibus, fructifer floribus remotis teretibus. — 6—7. ⊙. —

Inter segotes frequens.

109. *B. 3. commutatus* Schrad. (...) panic. patente post anthesin nutante, spiculis glabris, bracteola inferiore superiorem superante aristam suam rectam æqvante, floribus maturis margine imbricatis, vaginis inferioribus pilosis. H. 1. 123.? *Br. secalinus* Schum. ex parte. Examinaui specimina 2 sjællandica (nom. *B. secalini*): in herb. Schum. alterum, alterum in hb. am. Liebmanni; præter hæc specim. Svecicum Friesianum in hb. Hornem., quæ omnia optime cum diagnosi cl. Kochii conveniunt, quare opinor me verum recensere.

110. *B. 4. mollis* L. (1324) panicula patente erecta post anthesin contracta ramis solitariis simplicibus vel inde a basi ramosis, spiculis molliter pilosis bracteola inf. superiorem superante aristam suam subæqvante, florib. maturis margine imbricatis, vaginis foliisque pilosis. H. 1. 122. — Variat panicula plus minusve effusa et ramosa. — 6—7. ☉.

B. racemosus L. in ditione floræ nostræ sine dubio occurrit, quum autem hæc species mihi ignota est (plura specimina svecica examinaui quorum alia *B. molli* propiora fuere quam ut differentias ex siccis eruere potuerim, alia ad *B. commutatum* pertinuerent) nec differentia ejus mihi satis clara

sunt, eam hic omisi. — *B. brachystachys* Horning apud nos inquirendus: diff. panicula post anth. immutata (non contracta), aristis bracteola duplo brevioribus, bracteola inferiore superiorem subæquante.

111. *B. 5. arvensis* L. (...) panicula patente erecta fructifera subnutante, ramis 5-8nis basi longissimo spatio nudis spiculis lineari-lanceolatis bracteolis imbricatis. H. 1. 124. *B. secalinus* et *B. sec. integer* Schum. — Spiculæ coloratæ. — 6-7. ☉. — In agris, ad vias. *Poa Amager!*

38. **Catabrôsa** Palis. B. Tæppegræs.

112. *C. aquatica* P. B. (381 m.) — H. 1. 86 (*Aira aquatica* L. *Glyceria aquatica* Presl, Gl. *Catabrosa* Klett et Richt.) Culmus basi longe repens internodiis arcuatis, apice erectus, fol. brevialata, panic. pyramidalis fusca (antheris albidis) ramis patentibus. — 6-7. 24. — In locis limosis irrigatis et exsiccatis.

39. **Heleochlóa** Fries. Sumpgræs.

113. H. 1. *distans* Fr. (251 m.) panic. æquali ramis defloratis reflexis spiculis 4-6floris obsolete 5-nerviis. H. 1. 103 (*Poa distans* L. *Glyceria distans* Wahlenb.) $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ pedalis. 6-7. 24. Ad littora, in pratis maritimis.

114. *H. 2. aqvatica* Fr. (920) panic. æquali ampla ramosissima ramis adrectis spiculis 6-9floris bracteolis 1-nerviis nervis eminentibus. H. 1. 100 (*Poa aqvatica* L. *Glyceria aqvatica* Wahlenb. *G. spectabilis* Mert. Koch.) Gramen spectabile 4-6pedale. — 7-8. 24. — Ad ripas lacuum, in locis limosis.

40. **Glycéria** R. Brown. Södgræs.

115. *G. 1. fluitans* R. Br. (237) panic. secunda ramis sub anthesi horizontaliter patentibus, spiculis linearibus ramo adpressis 7-11floris, bracteolis valide-7-nerviis. H. 1. 101 (*Poa fluitans* Scop.) — 6-7. 24. — In aquis stagnantibus, locis uliginosis.

116. *G. 2. maritima* Mert. Koch (1626) panic. patente æquali post anthesin coarctata, spiculis 4-6floris bracteolis obsolete-5-nerviis. H. 1. 105. (*Poa* L. *Heleochoa* Fr.) — Stolones repentes. 6-7. 24. — In arenosis pratisque maritimis.

41. **Molinia** Schranck. Blaatoop.

117. *M. coerulea* Moench. (259). — H. 1. 99 (*Melica coerulea* L. *Enodium coerul.* Gaud.) Panicula elongata contracta ramis abbreviatis. Spiculæ coerulæ. Formæ primariæ: α. contiguæ:

vulgaris, coerulea, panic. contracta ramis contiguis.
 β. remota: coerul. pan. contracta ramis verticilli
 infimi abbreviatis sequentes non adtingentibus su-
 periorib. contiguis. γ. interrupta: ramis omnium
 verticillorum abbreviatis singulis sequentes non ad-
 tingentibus (unde panic. interrupta). δ. major:
 major sæpe gigantea, ramis elongatis laxiusculis,
 bracteolis viridibus bracteis solis fuscis. Hæc ultima
 forma nonnullis *M. sylvatica*. — 6—8. 4. — In
 pratis siccis, turfosis, sylvaticis. *Lundehusmosen!*
Bag Flaskekroen! o. s. v.

42. *Festuca* L. Svingel.

A. Fol. radicalia convoluto-setacea, ligula
 biaurita.

118. *F. 1. ovina* L. (...) fol. omnibus
 convoluto-setaceis, radice fibrosa. H. 1. 115
 (*F. tenuifolia* et *F. ovina*). Rami paniculæ fere
 semper solitariae inde a basi ramosi, unde panicula
 contracta videtur; in umbrosis gramen omni parte
 pallidior et laxius evadit, rami magis elongati
 basi brevi spatio nudi. Bracteolæ ex apice aristatæ
 v. (rarius) muticæ. Gramen valde variat et in
 multis formis sequenti simile. 6—7. 4. — In col-
 linis aridis apricis et umbrosis.

119. *F. 2. rubra* L. (...) fol. culmeis
 planis, radice stolonifera. H. 1. 128. Præcedente

panicula flaccida nutante, vaginibus inferioribus foliisque hirsutis. H. 1. 126 (*Bromus asper*). 6—7. 4. — In sylvis haud infrequens. *Ved Dronninggaard! Gyrstinge (!)*

124. F. 7. erecta Wallr. (1383) panicula æquali erecta, fol. radical. angustissimis ciliatis. H. 1. 125 (*Bromus erectus* excl. syn. Schum.) — In agris, pratis siccis. *Ved Bagsværd Hornemann. Danske Exempl. har jeg ikke seet.*

β. arista flexuosa subapicalis bracteolâ suâ duplo longior.

125. F. 8. gigantea Vill. (440. 1630). H. 1. 126. (*Bromus giganteus*.) Gramen altum, panicula patentissima flaccida. Spiculæ 5-8floræ, in speciminibus minoribus trifloræ. (*Br. triflorus* L.) 7—8. 4. — In sylvis umbrosis frequens.

43. *Dactylis* L. Hundegræs.

126. D. glomerata L. (743). H. 1. 113. Gramen foliis culmoque superne scaberrimum rigidum, valde variabile cujus formas primarias hic notabo. α. abbreviata panicula tota in capitulum contracta ramis brevissimis inde a basi spiculiferis, spiculis 5-7floris bracteis bracteolisque carina rigido-ciliatis. Robustior et humilior. (*D. abbreviata* Brnh. Rchb. ic. Cent. XI. 1522.) β. diffusa paniculæ ramis a basi longissimo spatio

nudis horizontaliter patentibus, spiculis 3-4floris
bracteis bracteolisque carina ciliatulo-scabris. Major,
laxior. (D. glom. Rehb. 1523.) γ . ? lobata ramis
panic. basi longo spatio nudis, (sub anthesi!) axi
adpressis contiguis spicam lobatam efficientibus, spi-
culis sub3floris carina subscabris. Laxa, pallide vi-
rens. Forma insignis forte propria species, quam
maxime observationi commendanda. 6—7. 4. —
 α . in pascuis, campis, collinis apricis. β . in grami-
nosis umbrosis. *I Grøfterne fra Nørrebro til Nørre-
fælle under Skygge af Buskene fra Havegjærderne!*
 γ . in sylvis humidis. *I Skovene ved Kongens Møl-
ler. Vahl! Liebman!*

44. **Vulpia** Gmel. Væselhale.

127. *V. sciuroides* Gm. (1445). H. 1.
116 (*Festuca bromoides*). Culmus superne longo
spatio nudus, bractea superior acuta (nec aristata)
inferiore duplo longior. 6—7. ☉. In campis are-
nosis. *Ved Jægersborg og Ordrup H. (?) Ved Am-
mendrup i Nærheden af Præstø H. Møen Kamp-
høvener!*

45. **Cynosurus** L. Kamgræs.

128. *C. cristatus* L. (238). H. 1. 114.
Rehb. XI. 1351-52. — 7. 4. — In pratis pascuis
frequens.

46. **Brachypodium** Palis. Stilkax.

129. B. 1. *gracile* Pal. (164) *spiculis distantibus* *) *arista bracteolam superante, radice fibrosa.* H. 1. 120 (*Festuca gracilis.*) Rchb. XI. 1373—75. *Obscure viride.* 7—8. 24. — In *sylvis umbrosis.* *Dyrehaven hinsides Klampenborg! I Skoven ved Kongens Möller (!) Klinteskoven paa Möen (!)*

130. B. 2. *pinnatum* Palis (...) *spiculis contiguis arista bracteolâ breviorē, radice repente.* H. 1. 121 (*Festuca pinnata.*) Rchb. XI. 1376. a. b. *Elymus caninus* Schum. *Dilute viride, fol. rigidiora.* 6—7. 24. — In *collinis apicis.* *Ved Bagsværd (!) Fuglevad Mølle (!) Imellem Papirmøllen og Læderfabriken Schum.! Kjøge Aas (!) Möen (!)*

*) In *spica composita spiculas contiguas* (naaende hinanden) voco, si *singula spicula duos axes articulos superat et ergo basin spiculæ eodem latere supra sequentis aut adtingit aut superat; distantes* (ikke naaende hinanden) si *unum modo axes articulum superat spicula, sequentemque spiculam non adtingit.* Adtendendum, *spiculas inferiores semper magis remotas esse, etiam in spica spiculis contiguis prædita.*

Rami paniculæ contigui sunt ii, quorum pars spiculifera partem spiculiferam ramorum superiorum adtingit.

47. **Agropyrum** Palis. Qvikgræs.

A. Radix fibrosa cæspitosa.

131. A. 1. *caninum* Roem. Schult. (1447). H. 1. 141 (*Triticum caninum* Schreb. *Elymus caninus* L.) Rehb. XI. 1381. Spica subcernua, spiculæ subcontiguæ, bracteola acuminata arista sua plus duplo brevior. Color gramineo-viridis. 7—8. 24. In sylvis. *I Sellinge Skov ved Kjøge (!)* *I Bregentved Skov (!)* *I Skoven ved Kongens Möller (!)*

B. Radix longe repens.

a. spicula contiguæ.

132. A. 2. *repens* P. B. (...) bracteis lanceolatis 5-nerviis acuminatis, foliis planis supra scabris. H. 1. 140. (*Triticum* L.) Rehb. XI. 1384-88. Magnopere variat magnitudine, spicæ longitudine (a pollicari ad semipedalem), colore (glauco vel viridi) superficie axeos (rarius glabro, sæpius aut marginibus scabris aut dorso villososcabro) aristæ longitudine (interdum fere nulla adest, interdum bracteam suam subsuperat) foliis aut modò scabris aut simul supra pilosis. Hæ formæ sensim in se invicem transeunt. Nervi foliorum supra simplici serie aculeorum minutissimorum obsiti eoqve scabri. 6—7. 24. In hortis, agris, ad vias, in dumetis omnium frequentissimum.

133. *A. 3. littóreum* Fl. Dan. (1863) bracteis 5-7nerviis bracteolisque acuminatis, foliis involutis pungentibus. H. 1. 141. Hæc species mihi solum ex icone citata cognita est quæ exhibet plantam valde juvenilem cujus spica vix e vagina egressa est. An hic status simul in hæc forma folia involvat nescio. Specimen Trit. littorei Schum. in herbario autoris habet folia omnino plana et *A. repentis* forma pervulgaris est; foliorum nervi simplici serie aculeorum obsiti sunt! Axis spicæ hirsuto-scabra. Ab. *A. acuto* D C. multum differt. Hæc planta, apud nos nondum inventa, differt foliorum nervis seriebus numerosis pilorum brevissimorum densissime obsitis, præterea bracteis bracteolisque obtusioribus, axiglabra. Contuli specimina plura holsat. et unum monspess., præter hæc iconem Reichenbachii Cent. XI. f. 1393, plantam a nostra diversissimam exhibentem.

b. spiculæ distantes.

134. *A. 4. adfine* Rehb. (1986) bracteis obtusiusculis valide 7nerviis spiculam dimidiam superantibus, foliis planis supra scabris. — Trit. junceum Schum. T. acutum Fl. Dan. T. affine Dethard. sec. Rehb. Cent. XI. f. 1391, figura optime cum nostra planta conveniens. Inter *A. repens* et junceum fere medium, diff. a priori nervorum aculeolis multiseriis, spiculis distantibus,

a sequente spiculis pluribus minoribus 4-5floris, bracteis bracteolisque parum acutioribus nervis bractearum magis eminentibus, axi minus fragili cet. — Variat: 1) axi glabro lævi. *Amager Schum!* *Ved Vedbæk* (T. littoreum) *Kamph!* *Ved Helsingör, paa Reersö* (T. acutum) *Vahl. Liebm!* 2) axi marginibus scaberrimo. (*Ved Frederikshavn!*) 3) axi dorso villosa margine lævi. (*I Holsteen Nolte!* (T. acutum et T. littoreum)). — 6—7. 24. — Ad littora maritima frequens.

135. A. 5. juncum P. B. (916) bracteis 9-11nerviis bracteolisque obtusis, foliis superioribus planiusculis supra molliter velutinis inferioribus involuto-pungentibus. H. 1. 139. (Triticum L.) *Rehb. XI. 1391.* Præcedente majus et robustius, spiculæ 5-8floræ, axis fragillimus glaberrimus, nervi bractearum subobsoleti. 6—7. 24. — Ad littora maris. *Ved Gilleleje, Korsör (!) Reersö (!)*

48. Lolium L. Raigræs.

136. L. 1. perenne L. (747 m.) bractea spiculâ brevior, bracteolis muticis. H. 1. 133. *Rehb. XI. 1346.* Occurrit interdum spica ramosa. 6—7. 24. — In pratis pascuisque siccis, ad vias.

137. L. 2. temulentum L. (160 m. b.) bractea spiculam aristatam æquante. H. 1. 134.

Rehb. XI. 1342-14. Præcedente plerumqve robustius. 7. ☉. Inter segetes vernaes, lina.

49. **Elymus** L. Marehalm

138. E. 1. europæus L. (1631) spiculis subbifloris aristatis scabris, fol. planis glabris. H. 1. 137. Rehb. XI. 1359. Color graminis viridis. 6-7. 4. — In sylvis umbrosis rarior. *Gyrstinge Skov (!) Skoven ved Kongens Möller (!)*

139. E. 2. arenarius L. (847 p.) spiculis subtrifloris pubescentibus, fol. deniqve convolutis rigidis. H. 1. 136. Rehb. XI. 1360-1361. Gramen maximum glaucum. — 7-8. 4. — In arenosis maritimis. *Ved Bellevue! Imellem Torbæk og Papirsmøllen! Ved Vedbæk! Helsingør! o. s. v.*

50. **Hordeum** L. Byg.

140. H. 1. murinum L. (629) bracteis spiculæ intermediæ lineari-lanceolatis ciliatis, lateralium setaceo-scabris. H. 1. 138. Rehb. XI. 1362. 7-8. ☉. Ad muros, vias. *Hyppig om Kjøbenhavn! Stege!*

141. H. 2. secalinum Schreb. (630 m. b.) bracteis omnium spicularum setaceis scabris. H. 1. 138. Rehb. 1363. 6-7. ☉. In pratis maritimis rarius. *Paa Amager og imellem Kjøbenhavn*

og Vedbæk H. I Omegnen af Helsingør usikkert, dog har jeg seet et Expl. formeentlig samlet der. Paa Stranden ved Korsør Rohde. Paa Møen Kamphövener!

51. **Leptúrus** R. Br. Spidshale.

142. *L. incurvatus* Trin. (938). H. I. 135 (*Rottböllia incurvata* L. fil.) Rchb. XI. 1333. *Spica teres incurva*. 6-7. ☉. In pratis maritimis. Paa Vesterfælled! Forhen ved Liimfabriken paa Amager.

52. **Nardus** L. Börsteax.

143. *N. stricta* L. (1022). — H. I. 61. — Dense cæspitosa, spica unilateralis, fol. rigida. 5-6. 24. In pratis, pascuis arenosis, ericetis.

Ordo III. **TRIGYNIA.**

53. **Móntia** L. Montie.

144. *M. fontana* L. (131. 1926). H. I. 142. Fol. obovato-spatulata carnosula. Flores albi, pedicelli fructiferi nutantes. Vere monogyna planta est, quum autem stylus brevissimus ægre conspicitur, inter trigynas collocavi ut facilius reperiatur. 5-6. 24. Locis uliginosis.

54. **Holósteum** L. Spidsgab.145. **H. umbellatum** L. (1204). H.

1. 143. Fol. ovata acuta glaucescentia, flores umbellati albi. 3—5. ☉. Locis siccis rarius. *Ved Dronninggaard og Frydenlund H. Ved Hirschholm paa Gjærdet för man ad Rungstedveien kommer til Folehaveskov, venstre Haand af Veien! Paa et gammelt Tanggjærde ved Sophienberg Steenberg! Paa Möen i Mængde ved Veiene imellem Kjelby og Magleby!*

Classis IV. **TETRANDRIA.**Ordo I. **MONOGYNIA.**1. **Maianthemum** Wiggers. Maiblomst.146. **M. bifolium** D. C. (291). H. 1.

378 (*Convallaria bifolia* L.) Caulis bifol., fol. cordata. Variat caule 1phyllo. 5—6. 24. In sylvis umbrosis.

2. **Alchemilla** L. Lövefod.

147. **A. l. vulgaris** L. (693) corymbis terminalibus, fol. radicalibus reniformibus 7-9-

lobis. H. 1. 173. Occurrit glabra et pubescens, quæ ultima forma est *A. montana* Willd. in H. 1. 174. 5—7. 24. In pratis, pascuis fertilioribus et sterilioribus.

148. *A. 2. Áphanes* Leers (973) florib. axillaribus glomeratis, fol. palmato-trifidis basi cuneatis. H. 1. 175. 6—8. ☉. In arvis et agris siccioribus.

3. *Parietária* L. Springknap.

149. *P. erecta* Mert. Koch (521). H. 1. 172. (*P. officinalis* L.) Fol. lanceolato-ovata, aspera, flores glomerati axillares. 7—9. 24. Ad muros. *Ved Kastellet paa venstre Haand strax ved Porten! Paa et Gjarde ved St. Hans Kirke i Roskilde. Ved Stege omkring Havegjærderne ved Strandbrædden (!)*

4. *Plantágo* L. Veibred.

A. Fol. integra, caps. 2locularis.

a. *tubus corollæ glaber.*

α. *caulis teres substriatus.*

150. *P. 1. major* L. (461) spica elongata, caps. 8sperma, fol. ovatis glabris. H. 1. 161. *Antheræ purpuræ.* 7—8. 24. Ad vias, in pratis, hortis.

151. *P. 2. media* L. (581) spica adbre-

viata densiflora caps. 2-4sperma, fol. ovatis villosis. H. 1. 161. Filamenta violacea, antheræ albæ. 6-7. 24. In pascuis siccis, ad vias, locis argillosis.

β. caulis angulatus.

152. P. 3. lanceolata L. (437). H. 1. 165. Fol. ovato-lanceolata. Variat fol. 3-5-7nerviis, spica elongata et abbreviata pane globosa, stylo longissimo et brevior; caule altiore et humiliore. 6-8. 24. In pratis fertilibus siccis et in campis aridissimis, frequens.

b. tubus corollæ villosus.

153. P. 4. maritima L. (243). H. 1. 166. Fol. linearia utrinque adtenuata. Variat fol. angustioribus et latioribus, integerrimis, denticulatis et dentatis dentibus subgeminatis; porro magnitudine cet. 6-8. 24. In pratis maritimis, locis aqua salsa hieme inundatis, æque ac locis arenosis longe a mare remotis.

B. Caps. 4locularis, fol. pinnatifida.

154. P. 5. Coronopus L. (272). H. 1. 167. Villosa, caulis teres. Variat magnitudine, fol. latioribus pinnatifidis et (in speciminibus maris) angustioribus subintegerrimis, spica elongatâ et abbreviata. 7-8. ☉. In pratis maritimis cum præcedente sed rarior. *Paa Amager til Høire ud ad Porten! Ved Strandbrædderne imellem Kastellet*

og Charlottenlund! Helsingör imod Stranden ved
Paullinelyst Steenberg! Ved Borreby Ehren-
reich.

5. *Centunculus* L. Centunkel.

155. *C. minimus* L. (177). H. 1. 168.
Fol. ovata flores sessiles, caulis ramosus rarius sim-
plex, cor. pallide rubra. 6—8. ☉. In locis uligi-
nosis, inundatis, etiam aridioribus. *Amager paa*
Overdrevet ved Skoven, i Selsk. med Erythræa o. s. v.
Reersö (!).

6. *Dipsacus* L. Kartebolle *).

156. *D. l. sylvestris* Mill. (965) gla-
ber fol. sessilibus crenato-serratis margine
sparsely aculeatis. H. 1. 149. Fol. periclinii ar-
cuato-adscendentia. Fl. pallide-lilacini. 8—9. 2.
Ad sepes. *Paa et Gærde ved Pesthuset! Stevns*
Klint. Nestved. I det vestlige Siælland i Omegnen

*) *Caláthium* (*Blomsterkurv*) = *Capitulum*, *Blom-*
sterhoved H.

periclinium (*Kurvdække*) = *Calyx communis*,
fælles Bæger H. v. *involucrum*.

anthoclinium (*Blomsterstol*) = *receptaculum*
commune, fælles Frugtbund H.

calyx (*Bæger*) = *calyx proprius*, det egne
Bæger H.

Sed cal. duplex est, c. exterior et interior.

Fructus dipsacearum est *achenium* (Skalfrugt),
flos superus. (Cfr. adnot. ad classem XIX.)

af Holsteinborg og Borreby Steenbuch, Ehrenreich. Ved Jyderup Götzsche. Ved Mehrn iml. Præstø og Kallehave (!) Hyppig paa Møen!

157. D. 2. pilosus L. (1448) pilosus fol. petiolatis ad apicem petioli auriculatis. H. 1. 150. Fol. periclinii deflexa. Fl. luteo-albi. 7—8. ☉. In dumetis. Herlufsholm, Vordingborg (!)

7. **Scabiōsa** L. Skabiose.

A. Anthoclinium setosum, achenium quadrangulum non costatum. SCABIOSA.

158. S. 1. arvensis L. (447) floribus radiatis 4partitis. H. 1. 152. Cal. exterior quadridentens. Variat fol. radicalibus pinnatifidis, incisīs v. (rarius) integerrimis, periclinii foliolis (sæpius corollis brevioribus) rarius longioribus obtusissimis. Fl. initio lilacini demum violacei v. coerulei. 6—7. 24. In agris, inter segetes.

B. Anthoclinium paleatum, achenium quadrangulum octocostum.

a. flores radiati (marginales majores) sub-5partiti. ASTEROCÉPHALUS.

159. S. 2. Columbária L. (314) fol. radical. lyratis crenatis. H. 1. 152. Asteroceph. Columbarius Wallroth. Setæ calycis interioris limbum exterioris bis terve superantes. Fl. violacei 5partiti. 7—9. 24. In collinis aridis. Ved Örholm!

Brede! 1 Alindelille Fredskov (!) Ved Jægerspris, Tiissö (!) Stevns (!) Möens Klint!

160. S. 3. *svaveolens* Desfont. (tab. ined.) fol. radic. lanceolatis integerrimis. — H. 2. 127. *Setæ calycis interioris exteriore sesquilingiores. Fl. coerul. 4–5partiti. Odor svavis. 7–8. 24. In collinis aridis. Paa Bakkerne ved Tiissö Vahl, Liebm, Steenberg 1837!*

b. flores æquales 4partiti. Succisa.

161. S. 4. *succisa* L. (279) capitulo semigloboso demum globoso, fol. radic. ovato-lanceolatis. H. 1. 151. *Succisa arvensis* Moench. Radix præmorsa, fl. coer. rarius albi et rubelli. 8–9. 24. In pascuis fertilibus, uliginosis. *Bag Flaskekroen!*

8. *Sherardia* L. Blaastjerne *).

162. S. *arvensis* L. (439). H. 1. 153. Fol. lanceolata inferiora elliptica, fl. terminales fa-

*) Fructus Rubiacearum est achenium dispersum bipartibile (tvefröet tvedeleig Skalfrugt) cujus partes binæ *carpidia* Rehb. (*Carpella* DC, *Smaafrugter*) vocantur et quibus stylus unus communis est. Ubi ergo "fructus" nominatur, totus fructus seu achenium intelligitur. Cfr. adnot. ad *Umbelliferas*, Cl. V. Ord. 2.

In generibus vere indigenis fructus siccus (tör) est, in *Rubia drupaceus* v. *succosus* (kjödet). Cf. *caryopsin drupaceam* cet.

sciculati lilacini. Caulis prostratus. 6—8. ☉. In agris, inter segetes, solo argilloso et cretaceo.

9. *Aspérula* L. Mysike.

163. *A. odorata* L. (562). H. 1. 154. Fol. lanceolata cymæ pedunculatæ terminales, caulis erectus. Achenia pilis hamatis obsita. Fl. albi. 5—6. 24. In nemoribus umbrosis.

10. *Gálium* L. Snerre.

A. Folia mutica.

164. *G. boreale* L. (1024) fol. subquaternis lanceolatis trinerviis. H. 1. 160. — Caulis erectus lævis superne paniculatus, pedunculi recti, fructus hispidi. Fl. albi. 7—8. 24. In pratis sterilibus, ad sepes. *Ved Brede! Lundehuset!*

*Obs. Inter plura specim. ab am. Liebm. ad Helsin-
gor. lecta, unum singulari habitu excellit, et a ce-
teris differt foliis (præcipue superioribus) ovato
cordatis latioribus subquinque-nerviis, paniculæ
ramis magis divaricatis. Est hæc planta G.
valantioidi Bib. simillima, neque eam a
specie hujus speciei distinguere possum, sed
prius quam plura viderim plantam tauricam
inter sjællandicas collocare non audeo.*

165. *G. 2. palustre* L. (423) fol. subquaternis lineari-oblongis obovatisve uninerviis. H. 1. 155. Caulis flaccidus diffusus retrorsum sca-

ber, panicula axillaris diffusa pedunculis patentibus, fructus læves. In locis umbrosis uliginosis giganteum evadit, foliis usque pollicem longis, pedicellis longissimis divaricatis. Variat foliis senis angustioribus. Fl. albi. 6—8. 24. In locis uliginosis, paludosis, fossis frequens.

B. Folia mucronata (uninervia).

a. caulis flaccidus retrorsum aculeolato-scaber.

166. G. 3. *Aparine* L. (495) fol. senis octonisve lineari-lanceolatis margine carinaque hispidis, fructu aculeis hamatis hispido. H. 1. 161. Fl. alb. 6—7. ☉. In sylvis, ad sepes vivas frequens, ubi fructu hispido vestibis adhæret.

167. G. 4. *uliginosum* L. (1509) fol. subsenis linearibus margine aculeolato-scabris carina lævibus, fructu tuberculato-scabro. — H. 1. 156. Fl. alb. G. palustri simile, sed facile distingvitur fol. mucronatis cet. 7—9. 24. In pratis humidis, turfosis frequens.

b. caulis ex basi decumbente adscendens plus minus strictus, lævis glaber v. asperulus, pubescens (nec hispidus).

168. G. 5. *saxatile* L. (1633) caulibus sterilibus prostratis florigeris adscendentibus omnibus quadrangularibus glabris, fol. subse-

nis margine scabris inferioribus obovatis superioribus oblanceolatis, pedicellis fructiferis adrecto-patentibus, fructibus dense granulatis. H. 1. 157. Fl. albi. 6—8. 24. In ericetis, pascuis sterilibus. *Fornemmelig hyppig i det nordlige Sjælland, f. Ex. omkring Helsingör (!)*

Obs. G. sylvestre Poll. (1866) intra terminos fl. sjæll. non inventum. Specimen in herb. Vahl. quod huc retulit cl. H., ad G. ulig. pertinet. A G. saxat. diff. fol. inf. suboctonis obovato-lanceolatis caulinis lineari-lanceolatis antice latioribus, fructibus obsolete granulatis, habitu graciliore, caulibus plerumque magis elongatis.

169. G. 6. verum L. (1146) caule e basi adscendente erecto teretiusculo pubescente fol. 8-12nis linearibus margine revolutis subtus puberulis, pedicellis fructiferis patentissimis, cor. laciniis obtusiusculis brevissime apiculatis, fructu lævi. H. 1. 158. Fl. flavi, rarius ochroleuci v. albi. 6—8. 24. — Ad vias, in locis arenosis, ad sepes cet. frequens.

170. G. 7. Mollúgo L. (455) caule adscendente quadrangulari glabro (rarius hirtio) foliis suboctonis lanceolatis subtus opacis, ramis paniculæ divaricatis, cor. laciniis cuspidatis.

tis, fructu læviusculo. H. 1. 159. Fl. albi rarius ochroleuci. 6—7. 2. In fruticetis, ad sepes, minus frequens. *Paa Gjærder imellem Vesterbro og Vesterfælled!*

171. G. 8. *sylvaticum* L. (609) caule erecto tereti obtuse quadricosto glabro, fol. octonis oblongo-lanceolatis margine scabris, pedicellis capillaribus ante anthesin nutantibus fructiferis adrecto-patentibus, cor. laciniis breviter apiculatis, fructu lævi. H. 1. 159. G. glaucum Fl. D.-A G. Mollugine differt pedicellis multo longioribus ante anthesin nutantibus, panicula multo diffusiore, cet. A G. vero fol. multo latioribus panicula diffusiore cet. A speciminibus lauenburgicis et germanicis nostra differt fol. longioribus, panicula multo ampliore. 6—7. 2. In sylvis. *I Hammermölleskoven ved Helsingör (G. Mollugo. Liebm.!) Imellem Springsforbi og Papirsmøllen Schum.!* "in sylva regia", formodenlig ved Hirschholm, Schum.!

RUBIA L. Krap.

1. R. *tinctorum* L. fol. 4-6nis ellipticis margine cauleqve retrorsum aculeolato-scabris. Fl. flavesc. 6—7. 2. Ved St. Jørgens Sø ved Kjöbenhavn, "ubi per viginti annos observavi." Schum.! Forvildet.

11. **Cornus** L. Korneel.

172. *C. 1. svecica* L. (5) herba floribus umbellatis involucratis. H. 1. 171. Fol. ovata sessilia, fol. involucralia ejusdem formæ albida, fl. atropurpurei, drupa rubra. 6—7. 24. In pratis sylvaticis, ericetis turfosis. *Omkring Helsingör ved Ladegaarden, Landlyst, Marienlyst (!). Möen ved Ulfshale (!)*

173. *C. 2. sanguinea* L. (481) frutex floribus cymosis nudis. H. 1. 172. Rami autumnno hyemeqve sanguinei, fol. ovato petiolata, fl. albi, drupa atro-rubra. 6. 24. In fruticetis. *Ved Lyngby Sø! Imellem Springforbi og Papirsmøllen (!).*

12. **Euonymus** L. Beenved.

174. *E. europæa* L. (1089) ramis tetragonis fol. oblongo-lanceolatis. H. 1. 271. Fl. viridescentes, arillus aurantiacus. Frutex. 6. In fruticetis. *Imellem Ordrup Mose og Dyrehaven!*

Ordo II. DIGYNIA.

13. **Cuscuta** L. Hörsilke.

175. *C. 1. epithýmum* Murr. (427) ramosa tenuissima glomerulis bracteatis, cor. tubo cylindrico limbum æquante squamis con-

niventibus clauso. H. 1. 177. Rchb. V. 692.
 Rubens. 8. ☉. Parasitica in Erica, Thymo. Ved
 Letraborg og Tidsvilde H.

176. C. 2. *epilinum* Weihe (1987)
 simplex, glomerulis nudis, cor. tubo sub-
 globoso limbum bis superante, squamis ere-
 ctis tubo adpressis. H. 2. 131. Rchb. V. 693.
 7—8. ☉. Inter lina. Ved Rungsted! Torværd (!)
 Möen imellem Magleby og Aborrebjerget (!)

177. C. 3. *europæa* L. (199) ramosa
 robusta glomerulis bracteatis, cor. tubo cylin-
 drico limbum æquante squamis erectis tubo
 adpressis. H. 1. 176. Rchb. V. 690. 7—8. ☉.
 Parasita in Urticis, Angelica, Humulo, Cannabi,
 (Salicibus?). Ved Papirsmøllen (!), Rudersdal,
 Kongens Møller (!) Kjøge (!) Mehrn (!) Græse
 ved Fredriksværk (!) Möen (!)

Obs. Siccum specimen in *Salice aurita* parasiti-
 cum possideo, quod habitum paullo diversum
 præ se fert; flores fere subspicati videntur.
 Sed specimen imperfectum nec satis evolutum
 examinationem exactiorem non admittit.

Ordo III. TETRAGYNIA.

14. **Ruppia** L. Ruppie.

178. R. 1. *rostellata* Koch (...) antherarum loculis subglobosis, fructibus transverse obliquis. *Rechb. ic. Cent. II. f. 306. 7—9.* 24. In littore marino haud infrequens. *I Stranden udenfor Klasens !ave! paa den østlige Kant af Amager! Ved Reersø Liebman! (Ved Kysten af Bornholm Steenstrup!)*

179. R. 2. *maritima* L. (364) antherarum loculis oblongis, fructibus erecto-obliquis. *H. 1. 186. Rechb. II. 307.* Priore major, pedicellis paucioribus multo longioribus, sæpe flexuosis. 8—9. 24. In aqua profundiore. *I Kallebodstrand ved Stakkaterne!*

15. **Potamogeton** L. Vandax.

Obs. Plantæ aquaticæ, maxime variabiles. Ex ratione aquæ (plus minus profundioris, lente v. rapide fluentis, tranquillæ v. ventis obnoxiaæ cet.) occurrunt caule modo longiore modo brevior, internodiis elongatis v. abbreviatis, fol. pedunculisque plus minus elongatis cet. Species heterophyllæ etiam occurrunt foliis demersis solis præsentibus (in aqua rapide fluente) et (in locis exsiccatis) fol. coriaceis solis præ-

sentibus. Notas certissimas præbent fructus maturi.

I. GRAMINIFOLII Fries. foliis linearibus gramineis.

A. Caulis teres, stipulæ foliis adnatæ (fol. linearia uninervia).

180. P. 1. filiformis Pers (2106)
fructibus obovatis rugosis dorso teretibus. —
H. 2. 136. P. setaceum Schum. Sequente ple-
rumque minor, caule brevior pedunculo longior.
7—8. 24. In stagnis et lacubus haud infreqvens.
I Fuursöen ved Fredriksdals Mölle!

181. P. 2. pectinatus L. (186. 1746)
fructibus lunatis lævibus carinatis. H. 1. 185.
P. pectinatum et marinum Schum. Caulis lon-
gissimus, spicæ verticilli remoti. 7—8. 24. In ri-
vulis et aquis stagnantibus, fossis etiam aqua salsa
repletis. *I Gravene paa Amager! I Aaen ved
Raadvadsdam!*

B. Caulis plus minus compressus, stipulæ
liberæ (a foliis 3-5nerviis discretæ).

a. caulis compressus obtusangulus subfili-
formis.

182. P. 3. pusillus L. (1451) fol. li-
nearibus v. filiformibus trinerviis, spicis longe-
pedunculatis, fructibus oblongo-ellipticis acute

carinatis. H. 1. 185. *P. compressum* et *P. pusillum* Schum. herb. Maximopere variat, et observandum nonne duæ species sub hoc nomine lateant. Insignes præcipue sunt duæ formæ, magnitudine valde diversæ, quas tamen notis certioribus distingvere haud dum nequivi. Inquirendum in fructus structuram, spicæ formam, foliorum latitudinem (sec. cl. Hornem. fol. uninervia, in quo cum *P. gracili* Fr. convenit, hoc autem sæpe difficile observatu, præcipue in sicco) cet. 7—9. 24. In lacubus, rivulis. *I Söen og Aæn ved Raadvadsdam! Ved Ermelundshuset og Fredriksdals Mølle Schum. I Esrum Sö (!)*

183. *P. 4. obtusifolius* M. K. (2107) fol. 3-5nerviis obtusis mucronulatis, spicis breve pedunculatis 6-8floris, fructib. ovalibus acute carinatis. H. 1. 184 (*P. compressum*) 2. 135. *P. compressum* Schum. enum. In sicco rufescit. — In fossis turfosis, stagnis. *I Ladegaardsaæn, Bagsvær Sö, i Egnen af Kjøge Kamphövener!*

b. caulis alato-compressus.

184. *P. 5. acutifolius* Link (1747. 2046) fol. 3-5nerviis acuminatis, spicis 4-6floris fructibus acute carinatis. H. 2. 135. In stagnis rarior. *Dammen ved Ladegaarden Kamphövener!*

185. P. 6. *zosteræfolius* Schum. (1865) fol. 3-5nerviis obtusis mucronulatis, spicis 10-12floris, fructibus obtuse carinatis. H. 1. 184. — (P. compressum L. sed nomen Schum. opt. et nulli confusioni obnoxium certe præponendum.) Hujus sectionis maxima species, viridis. Pedunculus spicâ duplo longior. 7-8. 4. — In amnibus, rivulis. *I Aæn fra Lyngby til Papirsmøllen Schum.! Esrum Sö (!) Ved Slangerup, Nestved H.*

II. PLANTAGINIFOLII Fr. foliis medio latioribus.

A. Caulis ramosus, pedunc. fructifer rectus.

a. pedunculi æquales (non incrassati) (folia omnia submersa membranacea).

α. fructus longe rostrati.

186. P. 7. *crispus* L. (927) fol. semiamplectentibus lineari-oblongis undulato-serratis. H. 1. 183. Rufescens. Planta juniore sterili fol. serrata non undulata. 7-8. 4. In stagnis fundo limoso, argilloso frequentissimus.

β. fructus breve apiculati.

187. P. 8. *perfoliatus* L. (196) fol. cordato-amplectentibus subovatis planis margine scabris, fructibus dorso obtusis. H. 1.

182. *Ramosissimus*, *sociabilis*, *rufescens*. In lacubus frequentissimus.

188. *P. 9. praelongus* Wulff. (1687) fol. semiamplectentibus oblongis apice navi-
cularibus margine lævibus, fructibus acutissime
carinatis. H. 2. 134. Specierum maxime elongata.
Pedunc. longiss. ($\frac{1}{4}$ – $\frac{3}{4}$ ped.) flores in spica verticillati
verticillis remotis, rarius adpropinqv. Rami steri-
les flexuosi. Siccatus viridescit. Præcedenti certe
adfinior est quam sequenti, si folior. insertionem,
ramos flexuosos respicias. 7–8. 24. In lacubus
profundis. *I Sorte Sö Aabye! Esrum Sö Vahl.*
Liebm.! Sorö Sö M. Vahl! allerede for over
40 Aar siden. (Jylland: Ove Sö i Thy! I Aæn
ved Ridemands Mölle ved Aalborg!)

b. pedunculi incrassati.

α . *homophylli*, fol. omnibus sub-
mersis membranaceis in petiolum ad-
tenuatis.

189. *P. 10. lucens* L. (195) fol. omni-
bus petiolatis ovalibus v. lanceolatis mucro-
natis planis margine scabris, fructibus dorso
convexiusculis. H. 1. 181. Specierum robustis-
sima fol. latissimis quæ interdum in cuspidem lon-
gum adtenuantur. Hæc forma, ceterum non memor-
abilis, est *P. acuminatum* Schum., ad quam fig.

Fl. D. 1384 pertinere, omnibus præter Wahlenbergium satis certum. Spica densiflora. — In lacubus et annibus frequens. *I Aaen ved Fuglevad Mølle! Peblinge Søen! Lyngby Sø, Farum Sø, Esrum Sø (!)*

β. heterophylli fol. superioribus coriaceis natantibus, submersis curvatis.

190. P. 11. gramineus L. (1263) fol. submersis in petiolum adtenuatis acutis, fructibus dorso obtusis. H. 1. 180 (P. heterophyllum Schreb. P. heteroph. et P. gramineum Schum. Occurrit fol. coriaceis (in exsiccatis); fol. coriac. et membranac.; membranaceis solis. In lacubus non profundis, limosis, fossis turfis. *Den tredie Dam i Bagsvær Skov Schum.! Tiissö (!) Ramlöse (!)*

191. † P. 12. curvifolius Hartm. (1807) fol. submersis subamplectentibus obtusis, fructibus subcarinatis. H. 2. 133. P. nitens Web. Caulis ramosissimus. Variat ut præcedens, cum quo fors formis intermediis conjungitur, quod observatu dignum. — In lacubus. *Et sikkert sjællandsk Vorested er mig ikke bekjendt. (Thye i Ove Sø! pl. flörens.)*

B. Caulis simplex, pedunculus fructifer incurvus.

192. P. 13. rufescens Schrad. (1450.

1635) fol. supremis petiolatis subcoriaceis, submersis sessilibus membranaceis, fructibus acutissime carinatis. H. 1. 182 (*P. lucens* var. *angustifolia*). 2. 133. (*P. rufescens*) *P. serratum* et *P. fluitans* Schum. Fol. natantia spatulato-oblonga internodiis modo breviora modo longiora, pedunculi folia mox superant, mox iis breviora. Siccatus rufescit. Fructibus acutissime carinatis et putamine fragili facile distinguitur. 6—8. 24. In rivulis, amnibus frequentissimus. *I Aaen ved Raadvadsdam! Ved Falkonergaarden (!) Udsærød Mølle (!) I Søborg Kanal Lyngbye! I Aaen ved Havemølle ved Ringsted Aabye. Tiissø (!)*

193. *P. 14. natans* L. (1025) fol. omnibus petiolatis supremis semper coriaceis fluitantibus, petiolis submersis aphyllis, fructibus dorso obtusis. H. 1. 179. Fol. natantia in aqua tranquilla lata, ex basi subcordata ovato-ellipt., in aqua fluitante magis elongata, ovato-oblonga, petioli submersi vere aphylli! (numquam folia submersa vidi); fructus dorso obtusiss. — *P. oblongus* Viv., in Sjæll. nondum lectus, optime differt; cum *P. fluitante* Rth. nihil illi commune. — 6—8. 24. In aquis stagnantibus inque rivulis frequens, sæpe totum superficiem aquæ foliis natantibus tegit.

16. **Radiola** Dillen. Tusindfrö.194. *R. millegrána* Sm. (178). H. 1.189. Caul. erectus dichotomus sæpe ramosissimus
 $\frac{1}{2}$ -1 pollicaris, fol. opposita sessilia ovata acuta integerrima, fl. in dichotomia caulis albi. 7—9. ☉.In locis arenosis inundatis. *Paa Amager paa Overdrevet ved Plantagen! Ved Flaskekroen, Birkerød (!)*
*Paa Feddet ved Lindersvold. Reersø (!) Overalt i Selskab med Centunculus, Erythræa o. s. v.*17. **Bulliarda** De Cand. Bulliarde.195. † *B. aqvatica* Deleuze (... cfr. 1510).H. 1. 188 (*Tillæa aqvatica*). Caul. erectus, pedunculi foliis longiores. 5—6. ☉. Ad ripas stagnorum. *Fundet i Sjælland af M. Vahl, efter H. l. c.*

Classis V. PENTANDRIA.

Ordo I. MONOGYNIA.

1. **Echium** L. Slangehoved*).196. *E. vulgare* L. (445). H. 1. 219.

Hispidum, caul. erectus, fol. lineari-lanceolata, fl.

*) *Borragineis ovaria 4, gynophoro s. disco hypogyno (Frugtbørstol, grundstillet Skive) inserta;*

spicati, coerulei. 6—7. ☉. In agris siccis, ad vias frequens.

2. *Lithospermum* L. Steenfrö.

197. L. 1. officinale L. (1684) cor. calycem æquante, caryops. lævibus. H. 1. 210. Fl. luteo-albi. 6—7. 4. Loc. siccis, ruderatis. *Ved Bjerget i Nærheden af Roskilde Hornem. Ved Hammermøllen v. Helsingör (!) I Alindelille Fredskov. Ved den nordre Bræd af Haraldsted Sö Aabye. Borreby Ehrenr. Imellem Vallö og Kjöge Kph. Nysö, Stevns H. Möcu paa Aborrebjerget! Ved Dronningstolen Pouls.*

his stylus 1 centralis, eidem gynophoro insertus, communis est. Singulum ovarium sequitur caryopsis ante maturitatem drupacea v. succosa (steenfrugtagtig, saftig Sluttefrugt) demum sicca, quæ caryopsides melius carpidia vocantur, quum ovaria ut partes ovarii quadripartibilis, caryopsides ergo ut partes schizocarpii quadripartibilis (en firedelelig Spaltefrugt) sint considerandæ. Differunt caryopsides drupacæ Boraginearum ab iis Potamogetonum in eo, quod harum singulæ suus stylus est.

Carpidia aut *styligena* Rehb., stylo columnari inserta, aut *basigena* Rehb., gynophoro inserta et a stylo discreta sunt. Gynophorum caute a stylopodio (cfr. Umbell.) distingvendum.

Corolla infundibularis, tragtdannet Krone (= infundibuliformis, tragtformig. H.)

.... *hypocrateroides* Peterm. *stadkravet* K. (= hypocrateriformis.)

198. *L. 2. arvense* L. (456) cor. calycem superante, caryops. rugosis. H. 1. 211. Fl. albi. 5—6. ☉. Inter segetes frequens.

3. *Pulmonaria* L. Lungeurt.

199. *P. 1. officinalis* L. (482. 483) strigosa fol. radical. petiolatis demum cordatis v. cordato-ovatis. H. 1. 214. Fol. interdum maculata, cor dilutius v. intensius violacea. Forma staminibus brevioribus tubo inclusis, fol. maculatis fl. D. 482; forma staminibus stylum tubo inclusum superantibus, fol. radicalibus aut deficientibus aut nondum explicatis, fl. D. 483 (n. *P. angustifolia*) 4—5. 24. In sylvis umbrosis frequens.

200. *P. 2. angustifolia* L. (....) hispida, fol. radicalibus elliptico-lanceolatis in petiolum decurrentibus. H. 1. 214. *I Jonstrup Vang ved Ballerup, Cand. pharm. Winderslew!*

Obs. *P. angustifolia* olim in luco Charlottenlund frequens crevisse dicitur, sed fig. fl. D. 483 (ad plantam ibi lectam facta) vulgo huc relata hujus loci minime est, et specimina ex hoc loco, olim (1816) a cl. J. Vahl lecta et cum hac fig. convenientia, ad formam *P. officinalis* supra memoratam pertinent. Specimen autem incompletum e Jonstrup Vang cum Lundensibus a cl. I. Agardh missis con-

venire videtur, qua de caussa speciem præterire nolui. Ceterum *P. officinalis*, nimis frequens, ideo nimis neglecta, attentione botanicorum satis digna est, forte plures species continet. Præcipue inquirendum in formam et indumentum foliorum calycisque. Figuras exhibet *Rehb. iconogr. Cent. XI, figg. 694—699.*

4. *Asperugo* L. River.

201. *A. procumbens* L. (552) fol. elliptico-oblongis obtusis denticulatis. H. 1. 218. Fl. coerulei v. violacei, parvi. 5—7. ☉. — Ad sepes frequens.

5. *Echinospérnum* Lehm. Pigfrö.

202. *E. Láppula* Lehm. (692) fol. lanceolatis, pedicellis fructiferis adrectis, caryops. aculeis biserialibus. H. 1. 209. *Myosotis Lappula* L. *Cynoglossum Wallr.* Cor. pallide coerulea. 7. ☉. Udenfor Amager og Öster-Port; formodentlig forvildet.

6. *Cynoglossum* L. Hundetunge

203. *C. officinale* L. (1147) fol. lato-lanceolatis tomentosis, florib. paniculatis. H. 1. 213. Fl. fusco-rubri. 6—7. ☉ Ad sepes, vias hand infrequens.

7. **Anchúsa** L. Oxetunge.

204. **A. 1. officinalis** L. (572) fol. lanceolatis hispidis, tubo corollæ recto. — H. 1. 212. Fl. violacei v. rubri, rarius albi. 6—7. 24. Ad vias, aggeres, in arvis.

Obs. Cl. Reichenbach has duas species distingvit:

A. officinalis Rchb. spicis dense imbricatis, bracteis ovatis, calycibus post anthesin globoso-conniventibus. Fl. D. 572. Rchb. ic. Cent. III. 469.

A. arvalis Rchb. spicis demum longissimis laxis, bracteis ovato-lanceolatis, cal. laciniis post anthesin erectis. Rchb. 470. Ad hanc ultimam pertinet forma apud nos maxime vulgata.

205. **A. 2. arvensis** Biberst. (435) fol. lanceolatis semiamplectentibus repando-dentatis hispidis, cor. tubo incurvo. H. 1. 218. (*Lycopsis arvensis* L.) Fl. coer. 5—8. ☉. Inter segetes, ad vias etc. frequens.

Borrágo L. Borago.

1. **B. officinalis** L. fol. inf. ellipticis obtusis basi adtenuatis, limbo corollæ plano. 6—7. ☉. Hic inde quasi spontanea occurrit. Ved Rungsted.

8. **Symphytum** L. Kulsukker.

206. *S. officinale* L. (664. 1569) fol. ovato-lanceolatis infimis petiolatis superioribus decurrentibus. H. I. 216. Fl. rubro-violacei, violacei, coerulei (intensius pallidiusve) rarius rosei (ved Næsbyholm H.) Fornices stamina nunc æquant, nunc iis longiores, calyx modo patens modo adpressus. Fol. latiora et angustiora, quæ modificationes omnes uno eodemque loco (*I Grøften ved Kjærlighedsstien!*) observari possunt. Styli directio ulterius observanda. 5—6. 24. Nestved, Nysø, *Kjöge o. s. v.*

9. **Myosotis** L. Forgjetmigei.*)

A. PERSISTENTES pedicellis fructiferis calyces superantibus. (Species robustiores).

a. calyces pilis rectis obsiti v. glabri.

207. *M. l. palustris* Roth. (1988) cal. 5denti adpresso, stylo calycem subæquante, racemo discreto, caule stolonifero.

*) *Racemus contiguus* (Klasen stødende til Bladene) ille est, qui aut basi foliatus est, aut usque ad folia continuatur, ita ut nullum spatium inter flores infimos et folia suprema vacuum relinquatur; *rac. discretus* (Klase fjernet fra Bladene) qui ita a foliis supremis remota est, ut spatium haud exiguum inter hæc et flores infimos sit.

H 1. 207. *Laciniaë limbi emarginatæ. Variat cor. (azurea fance flavo) duplo minore. 5—6. 24. In paludosis frequens.*

Obs. Sequentes formas, cl. Rchb. species, omnes apud nos legi:

M. palustris Rchb. caule patentim piloso,

M. laxiflora Rchb. caule adpresse, ramis patentim pilosis (pedicellis elongatis),

M. strigulosa Rchb. caule foliisque ramisque adpresse pilosis.

208. *M. 2. cæspitosa Schultz. (fasc. ined.) cal. 5fido laxo stylo brevissimo, racemo contiguo, stolon. nullis. H. 2. 139. Adpresse strigulosa. Lacin. limbi sæpius integerrimæ, rarissime obsolete emarginatæ, cor. minor eâ præcedentis rarius ejusdem magnitudinis, calyx magnus latus. Caulis robustior, sine stolonibus, sive inde a basi ramosus, sive usque ad apicem simplex; sæpe inferne rubro tinctus. 5—7. ☉.? — In uliginosis cum præcedente haud rara. Bagsvær! Helsingör (!) o. s. v.*

b. calyces uncinato-pilosi.

α. racemi discreti multiflori.

209. *M. 3. sylvatica Hoffm. (583 fig. sin.) stylo calycem dimidium æquante, limbo plano calycem multum superante. H. 1. 207. Cor. coelestina, rarius alba. 5—6. 24. In sylvis*

humidiusculis, umbrosis frequens. *Frederiksberg Have!*

210. *M. 4. intermedia* Link (....) stylo caryopsides æqvante, limbo subconcavo calycem paullo superante. H. I. 208 (*M. arvensis*), 2. 110. Præcedente plerumque robustior, florib. minoribus. 6—8. ☉. In arvis, pascuis elatioribus, inter segetes frequens. *Vesterfælle! Ved Lunde-huset! o. s. v.*

β. racemi contigui pauciflori, flores simul in dichotomia caulis.

211. *M. 5. sparsiflora* Mikan (1688) stylo caryopsidibus brevior. H. I. 206. Caul. ramosissimus, laxus, flaccidus, pedunc. longissimi, cor. minima, pallide coerulea. 5—6. ☉. *Ved Grøfterne udenfor Clasens Have og i samme!*

B. FUGACES pedicellis fructiferis calyce brevioribus.

a. calyces fructiferi aperti.

212. *M. 6. hispida* Schlechtend. (tab. ined.) pedicellis arcuatis patentibus calyces subæqvantibus, stylo caryopside æqvante, fol. caulin. obtusis. 4—6. ☉. In arvis siccis, aggeribus frequens. *Paa Christianshavns Vold! Gjærderne imellem Veien til Charlottenlund og Stranden! Gjærder ved Flaskekroen!*

b. calyces fructiferi clausi.

213. *M. 7. versicolor* Pers (583 fig. dextr.) stylo calycem æqvante, pedicell. patulis, racemis discretis subgeminatis, fol. oppositis acutis. H. 1. 209. Fl. primum flavi tubo calycem æqvante, demum coer. tubo calyce duplo longiore. Color totius plantulæ dilute viridis. 6—7. ☉. In arvis et agris frequens. *Paa Marken udenfor Slukefter ned imod Stranden!*

214. *M. 8. stricta* Link (tab. ined.) stylo caryops. æqvante iisve brevior, pedicellis adrectis adpressisve, racemo contiguo, fol. alternis obtusis. Caulis strictus, solitarius v. plures ex eadem radice, cor. coer. tubo incluso. 5—6. ☉. In agris siccissimis, cum præcedentibus. *Amager! Lundehuset! Slukefter! o. s. v.*

10. **Primula** L. Kodriver.

Obs. Omnium specierum duplex forma (ut in Pulmonariis), altera stylo exserto stamina superante, altera staminibus exsertis stylum superantibus.

A. Flores rubri.

215. *P. 1. farinosa* L. (125) fol. obovato-lanceolatis subtus farinosis. H. 1. 224. 5—6. 24. In pratis siccioribus. *Bag Flaskekroen! Ved Uterslev! Lundehusmosen! Ordrup Mose!*

B. Flores lutei.

a. pedunculi radicales uniflori.

216. P. 2. acaulis Jacqv. (194) fol. oblongo-obovatis cal. laciniis acutis. H. 1. 223. 5--6. 24. In sylvis. *Klinteskoven paa Møen!*

b. scapus umbellifer.

217. P. 3. elatior Jacqv. (434) fol. ovatis, cal. laciniis acuminatis, cor. limbo plano. H. 1. 223. Plerumque cæspites densos efficit. In sylvis umbrosis humidis frequens. *Charlottenlund! Ordrup Krat!*

Obs. Formam rubrifloram legi paa en Grøft udenfor Nørreport! Interdum occurrit scapos umbelliferos et pedunculos unifloros ex eadem radice emittens. I Charlottenlund paa Engen ved Slottet! I et Krat ved Magleby paa Møen Freuchen.

218. P. 4. officinalis Jacqv. (433) fol. ovatis, cal. laxo breve dentato, cor. limbo concavo. H. 1. 222. Præcedente minor, caules plerumque solitarii, fol. magis rugosa, scapus mollius tomentosus, cor. minor limbo flavo striis aurantiacis notata. 5--6. 24. In pratis fertilioribus. *Lundehusmosen! Ved den lille Høi paa Bankerne imellem Charlottenlund og Skovshoved! Ordrup Mose!*

11. **Hottónia** Boerh. Hottonie.*Obs. Duplex forma ut prioris.*219. **H. palustris** L. (487, 1867). —

H. 1. 228. Fl. verticillati pedunculati pedunculis demum reflexis, cor. alba v. rosea, fol. pectinato-pinnata. 6—7. 24. *In fossis aqua repletis, stagnis limosis frequens. Lundehusmosen! Imellem Charlottenlund og Ordrup! o. s. v.*

12. **Anagallis** L. Arve.

220. **A. 1. arvensis** L. (88) caule prostrato, fol. ovatis, cor. laciniis glanduloso-ciliatis, caps. calycem æquante. H. 1. 232. Fl. rubri. 6—7. ☉. *In agris et arvis.*

221. **A. 2. coerulea** Schreb. (1570) caul. prostrato fol. oblongo ovatis, cor. laciniis crenatis, caps. calyce brevior. H. 1. 232. (*A. arvensis coerulea.*) Fl. coerulei, cal. laciniæ acutiores. Nondum vidi. *Paa Markerne ved Lyngby Sø Hornem.*

13. **Lysimachia** L. Fredlös. *)

A. Flores paniculati terminales, caulis erectus. (Stam. basi coalita.)

222. **L. 1. vulgaris** L. (689) fol. la-

*) *Folium laterinervium* habet nervum longitudinalem unicum, ex quo lateraliter exeunt nervi

terinerviis ovato- v. oblongo-lanceolatis. —
H. 1. 229. Fl. lutei. Planta valde polymorpha,
plus minus hirsuta fol. sæpe glabris; folia opposita,
terna, qvaterna, ovato- v. oblongo-lanceolata v. lan-
ceolata. Pedunculi interdum abbreviati ut in capi-
tulum flores pæne adgregentur. 7—8. 4. In pra-
tis, dumetis humidis.

B. Pedunculi axillares solitarii uniflori, caul.
procumbens. (Stam. basi libera.)

223. L. 2. nummularia L. (493) fila-
mentis glandulosus, fol. laterinerviis orbiculato-
cordatis pedunculos superantibus, cal. laciniis
cordatis acutis. H. 1. 231. 6—7. 4. In pratis.
*Ved Peblingesöen! I Fredriksberg Have! Alm. i
det sydl. og vestl. Sjælland og paa Möen.*

224. L. 3. nemorum L. (174) filamen-
tis glabris fol. basinerviis ovatis acutis pedunculo
brevioribus eumve subæquantibus, cal. laciniis
linearibus acuminatis. H. 1. 231. 6—7. 4. In
humidis umbrosis rara. *Ved Fredriksborg H. Spar-
resholm (!) Klinteskovon paa Möen (!)*

cum n. longitudinali angulos obliquos facientes.
In folio basinervio ex petiolo exeunt nervi longi-
tudinales plures (3—5—7) quorum exteriores
margini plus minus parallele folium percurrunt.

14. **Naumburgia** Mneh. Gulddusk.

225. *N. thyrsiflora* Mneh. (517) racemis densifloris axillaribus. H. 1. 230 (*Lysim. L. Thyrsánthus palustris* Schrk.) Fl. flavi, stam. basi in annulum brevem coalita. Fol. laterinervia lanceolata punctata. 6—7. 24. In uliginosis, ad ripas lacuum. *Ordруп, Lyngby, Birkeröd, Helsingör (!) Kjöge, Holmegaard (!)*

15. **Samolus** L. Samel.

226. *S. Valerándi* L. (194) fol. obovatis obtusis, fl. racemosis, bracteis in medio pedicellorum. H. 1. 266. Fl. albi. 7—8. 24. — Locis humidis, in fossis. *Ved Flaskekroen 1837 (!) Kattinge Sö og Næsbyholm Sö ved Roskilde (!) Annebjerggaard i Odsherred H. Hyppig i det sydlige og vestlige Sjælland! Möen H.*

16. **Glaux** L. Sandkryb.

227. *G. maritima* L. (548) fol. ovato oblongis florib. axillaribus. H. 1. 279. Fl. pallide rubri. 6—7. 24. Ad littora marina frequens.

17. **Convólulus** L. Snerle.

228. *C. l. arvensis* L. (459) fol. sagittatis auriculis acutis, bract. a calyce remotis. H. 1. 235. Fl. albi striis roseis. 6—8. 24. Ad

vias, sepes, inter segetes frequens. *Ved Landeveien im. St. Vibenshus og Lundehuset!*

229. *C. 2. sépium* L. (458) fol. sagittatis auriculis truncatis, bract. calycem includentibus. H. 1. 235. Cor. alba maxima. 7. 24. Ad sepes rarior. *Ved Valby. Udenfor Kastellet (!) Ved Helsingör (!)*

18. *Verbascum* L. Kongelys.

A. Filamenta omnia dense lanata.

α. lana filamentorum violacea.

230. *V. 1. nigrum* L. (257) fol. supra glabriusculis subtus tomentosis, superioribus sessilibus inferiorib. petiolatis cordato-oblongis, pedicellis calycem duplum æquantibus. H. 1. 257. Racemus elongatus, laxus, flores minores flavi ad faucem maculis 5 violaceis. Variat? racemo ramoso. 7—8. ☉. Ad vias, muros haud infrequens.

231. *V. 2. collinum* Schrad (1811) fol. utrinque tomentosis superioribus subdecurrentibus inferioribus ovato-oblongis in petiolum alatum decurrentibus, pedicellis calycem subæquantibus eove brevioribus. H. 2. 146. Inter *V. nigrum* et *V. thapsiforme* medium et certe ab utraque hybridum. Racemus elongatus laxiflorus, folia caulis numerosa crenata superiora acuminata. Deffloratum legi. 7—8. ☉. *Imellem*

Torbæk og Papirsmøllen paa Klinten ud imod Stranden, imellem V. nigrum og thapsiforme!

β. lana filamentorum alba.

V. *Lychnitis* L. (586). H. 1. 256. Fol. supra glabriusc. subtus pulverulento-tomentosa, superiora sessil. ovata acuminata, fl. paniculati. Hinc inde ex hortis profuga. *Paa et Gjærde ved Frdals Mølle! Ved Kirken ved Hirschholm!*

B. Filamenta 3 breviora albo-barbata, longiora subglabra v. parce pilosa.

232. V. 3. *Phlomoïdes* L. (....) fol. tomentosus superioribus acuminatis oblongo-lanceolatis basi subcordatis breviter decurrentibus inferioribus ellipticis, cor. rotata subinæquali, antheris inæqualibus, iis filamentorum longiorum altero latere decurrentibus. H. 256? Robustum, sæpe giganteum (occurrunt tamen specimina pollicaria), racemus supra densus fl. infer. remotis, sæpe ramosus! cor. magna rotata laciniis patentibus apice parum incurvo, stylus adscendens stamina longiora superans, hæc brevioribus paullo longiora. Olim cum amicis pro V. cuspidato communicavi. 8—9. ☉. In locis aridis, glareosis. *Paa Gjærder og tørre Marker ved Frdals Mølle (paa Brinkerne ved Enden af Söen)! Ved Frsværk. Steenstrup! Jægerspriis Steenberg! Ved Kallundborg!*

233. V. 4. Thapsiforme Schrad.
 (....) fol. tomentosis penitus decurrentibus
 superioribus ovato-lanceolatis acutis, in-
 fimis obovatis obtusis basi adtenuatis, cor.
 subinfundibulari inæquali. antheris inæqualibus
 iis filamentorum longiorum utrinque decurren-
 tibus. Racemus densus obtusus semper simplex,
 cor. minor limbo concavo stylus filamentis longiori-
 bus brevior. 7—8. ☉. In locis aridis, lapidosis.
*Imellem Torbæk og Papirsmøllen! Ved Tikjøb
 Liebm.!*

234. V. 5. Thapsus L. (631) fol to-
 mentosis penitus decurrentibus, cor. laciniis
 antherisque subæqualibus. H. 1. 254. *Ved
 Vordingborg Kamph.!*

*Obs. Genus botanicis Danicis quam maxime
 commendandum. Ex tomentosis modo sp. 3 et
 4 vivas examinavi, præter V. collinum quod
 defloratum inveni. Inquirendum præcipue in
 antherarum formam, directionem et ceteras
 stylique relationes.*

19. Datúra L. Pigæble.

235. D. Stramónium L. (436). H. 1.
 258. Fol. ovata angulato-dentata. Cor. alba. 7—10.
 ☉. Ad littora maritima certe ab initio ex hortis
 aufuga. *Udenfor Amager Port forbi Gjøgens Bat-*

teri paa de sløifede Skandser! Ved Strandmøllen (!)
Imellem Snekkersteen og Humlebæk Lbm.!

20. Hyoscyamus L. Bulme.

237. H. niger L. (1452). H. 1. 259.

Viscido-hirsutus, fol. amplexentia, radie. pinnatifido-repanda. Cor. sordide lutea venis violaceis reticulatis picta. 6—7. ☉. Ad sepes, vias, circa pagos.

21. Solanum L. Natskygge.

A. Frutex scandens.

237. S. 1. Dulcamara L. (607) fol.

ovato-cordatis superioribus hastatis. H. 1. 262. Fl. violacei, bacca rubra. 6—7. In fruticetis humidis.

B. Herbæ annuæ.

238. S. 2. humile Bernh. (tab. ined.)

angulis ramorum subobsoletis subtuberculatis, fol. repando-dentatis cauleqve subglabro, bacis viridibus. Neqve admodum humilior neqve gracilior ac sequentia. Baccæ virides paullo dilutiores quam in statu immaturo. 8—9. In locis ruderatis cum sequentibus. *I Charlottenlund strax indenfor Indgangen, paa den lille Høi! Vild i den botaniske Have! Paa Amager!*

239. S. 3. nigrum L. (460) angulis

ramorum prominulis tuberculatis, fol. sinuato

dentatis cauleque pubescentibus, baccis nigris.
H. 1. 263 Vulgatissima specierum, in hortis, cultis,
rucleratis. ad vias.

240. S. 4. *miniaturu* Bernh (1927)
angulis ramorum prominulis tuberculatis, fol.
sinuato-dentatis cauleque hispido-villosis, bac-
cis rubris. H. 2 147 (S. villosu). Gracile,
rami infer. patentissimi, superiores adrecti. Cum
præcedentibus minus frequens. *Amager, höire Haand*
udenfor Porten forbi Gjögens Batteri, med Datura,
Chenopod. vulvaria o. s. v.!

Obs. Ulteriori inquisitioni commendandæ hæ
species. S. villosu Link "tomentoso-villo-
sum, baccis flavis" in horto bot. quasi sponte
crescit, extra hortum non vidi, vix autem de-
est. "Var. Solani nigri baccis flavis ad Hel-
singör crescere" cl. Rafn.

22. *Menyanthes* L. Bukkeblad.

241. *M. trifoliata* L. (1541). H. 1.
226. Fol. ternata, flores paniculati, cor. alba extus
roseola. 6—7. 24. In paludibus et turfosis frequens.

23. *Gentiana* L. Enzian.

A. Cor. intus glabra.

242. G. 1. *Pneumonánthe* L. (269).
H. 1. 297. Fol. lineari-lanceolata obtusa margine
revoluta, cor. clavato-campanulata 5fida coerulea

intus maculis flavis. 8—9. 24. In turfosis rarior.
Ved Jonstrup, Roskilde, Kjøge, Kronborg paa Over-
drevne! Ved Gilleleie (!) Odsherred, i Svenstrup
Skov ved Kalundborg.

B. Cor. faux barbata.

243. G. 2. *Amarélla* L. (328) cal. laci-
 niis subæqualibus, cor. 4-5fida. H. 1. 299. Fol.
 radic. spatulata, caulina ex basi subamplectente
 lanceolata, (in speciminibus minoribus utrinque at-
 tenuata ita ut fere petiolata videantur, G. uligi-
 nosa Autt. Fl. D. ined. (*I Nærheden af Søborg*
Mose Pouls.!)) cor. coeruleo-violacea. 8—10. ☉.
 In pratis siccis, locis sterilibus. *Vesterfælled! Ama-*
ger ved Skoven! Ved Borreby Ehrenr.

244. G. 3. *campestris* L. (367) cal.
 laciniis binis majoribus, cor. 4fida. H. 1. 300.
 Fol. ovato-oblonga. Cor. coerul. 8—10. ☉. In
 arvis, pratis, cum præcedente. *Vesterfælled! Ama-*
ger ved Skoven!

24. **Erythræa** Borkh. Tusindgylden.

245. E. 1. *Centaurium* Pers. (617 m.
 b.) caule quadrangulo, fol. ovali-oblongis sub-
 5-nerviis, florib. cymosis æqvialtis. H. 1. 264.
 Cor. dilutior lacin. obtusioribus. 8—9. ☉. In pra-
 tis. *Flaskekroen! Amager! Hestkjøbgaarden ved*
Birkerød! Reersø (!)

246. C. 2. linearifolia Pers (1814)
 caule quadrangulo lateribus binis latioribus
 subconvexis, fol. linearibus sub-3-nerviis, flor.
 inæqvialtis. H. 1. 265 (E. littoralis Fries). Rchb.
 I. 185—189. Cor. obscurius rubra, rarius alba,
 lacin. acutioribus. 8—9. ☉. *Amager ved Skoven!*
Flaskekroen! Reersö (!) Holsteinborg (!)

247. E. 3. pulchella Fries (1637) caule
 quadrangulo angulis subalatis, fol. ovatis sub-
 5-nerviis, florib. in dichotomia caulis. H. 1.
 265. Cor rubra lacin. lanceolatis. Formæ prima-
 riæ 1) aprica humilior, fol. obtusioribus crassi-
 oribus pæne coriaceis (simplex et ramosissima) 2)
 umbrosa elatior fol. apicem versus magis attenu-
 atis tenuioribus (simplex et ramosissima). 8—9.
 ☉. *Flaskekroen! Amager! Kjöge, Feddet ved*
Lindesvold H. Reersö (!) Holsteinborg (!) (I Sel-
skab med Radiola, Centunculus o. s. v.)

25. Lobelia L. Lobelie.

248. L. Dortmanna L. (39). H. 1.
247. Glaberrima fol. linearia bilocularia, fl. albo-
 cyanei in scapo subnudo racemosi. 7—8. 24. In
 lacubus. *Gurre Sö ved Helsingör (med Littorella)*
Liebman!

26. Jasiöne L. Munke.

249. J. montana L. (319). H. 1. 246.

Fol. linearia undulata hispida, radix simplex bien-
nis. Fl. coerul., rarius albi. 7—8. ☉. In campis
aridis frequens. Inquirendum in J. perennem
Lamk, quæ differt radice stolonifera perenni.

27. *Campánula* L. Klokke.

A. Flores sessiles adgregati.

250. C. 1. *glomerata* L. (1328) fol.
infer. petiolatis ovatis basi rotundatis v. cor-
datis superioribus sessilibus. H. 1. 243. Fl.
coer. v. viol. 7—8. 24. In locis sterilibus. *Flaske-
kroen (!) Sölleröd (!) Imellem Bagsværd og Køl-
kolle. Roskilde Kro. Ved Kjøreveien fra Roskilde
til Bidstrupgaard (!) I en Skov ved Sønderup nær
Borreby Ehrenr.*

B. Flores pedunculati racemosi.

a. fol. glabriuscula lævia.

251. C. 2. *rotundifolia* L. (855, 1086)
fol. radic. longe petiolatis ovato-reniformibus
ovatisve, fl. nutantibus. H. 1. 238. Fl. coerul.
raro albi. Variat strictior et laxior, fol. angusti-
oribus et latoribus cet. 6—8. 24. In agris sterili-
bus, ad sepes frequens.

252. C. 3. *patula* L. (373) fol. denti-
culatis radic. oblongo-obovatis in petiolum
decurrentibus, panicula patula subcorymbosa
florib. erectis cal. lacin. subulatis. H. 1. 239.

Fl. coer. 6—7. ☉. *Paa Brinker ved Aaen imellem Dyrehaven og Nymölle Kamph., Björklingson! Paa Brankebakken ved Fredriksdal efter Müller.*

252. † C. 4. *rapunculus* L. (1326) fol. radic. oblongo-obovatis in petiolum decurrentibus, panicula subracemosa subcoarctata, flor. subnutantibus. H. 1. 239. Fl. coer. 7—8. ☉. Forsan inqvilina. *Paa Jægerbakken ved Fredriksborg (!) Ved Slangerup, Bregentved (!) Udby H.*

254. C. 5. *persicifolia* L. (1087) fol. denticulatis radical. oblongo-obovatis in petiolum decurrentibus, racemo paucifloro, cal. laciniis lanceolatis. H. 1. 240. Fl. speciosi coerulei. 7—8. 24. In sylvis haud infrequens. *Fredriksdal! I Krattet paa Klinterne imellem Torbæk og Papirsmöllen!*

b. fol. scabra.
 . α. calyx glaber.

255. C. 6. *latifolia* L. (782) fol. ovato-lanceolatis acuminatis grosse serratis. H. 1. 241. Fl. coer. 7—8. 24. In sylvis. *Ved Papirsmöllen i Anlægget paa høire Side af Veien! Hyppigere i det sydlige og vestlige Sjælland: Holstenborg (!) Vordingborg (!) o. s. v.*

β. calyx asper v. ciliatus.

256. C. 7. *Trachelium* L. (1026) cal.

laciniis adrectis racemo foliato (e pedunculis axillaribus composito). H. 1. 142. Variat pedunculis unifloris flor. minoribus (β — γ Schum.) et multifloris subracemosis florib. majoribus, porro cal. plus minus scabro, fol. plus minus argute cordatis cct. Cor. coer. vel dilute lilacina. 7—8. 4. In sylvis frequens.

257. *C. S. rapunculoides* L. (1327) cal. lacin. reflexis panicula arcta secunda subnutante. H. 1. 241. 7—8. 4. Ad muros, sepes, vias. *Valdby!*

Phyteuma L. Rapunzel.

1. *P. spicatum* L. (362). H. 1. 245. Fol. radie. petiolata cordata, fl. spicati lavidi. 7—8. 4. *Ved Sorgenfri, forvildet.*

28. **Lonicéra** L. Gedeblad.

258. L. 1. *Periclymenum* L. (908) scandens flor. capitato verticillatis, fol. glabris. H. 1. 267. Fl. rubelli intus flavidi. 7—8. In fruticetis. *Bagvær! etc.*

259. L. 2. *Xylósteum* L. (808) caule erecto, pedunculis bifloris, fol. villosis. H. 1. 268. Fl. dilute flavi. 5—6. In fruticetis. *Ordrups Krat! Möens Klint!*

29. **Rhamnus** L. Vrietorn.

259. Rh. 1. cathartica L. (850) ramis spinosis, flor. dioecis 4petalis, baccis 4spermis. H. 1. 269. Fl. flavo-vir. 7. In fruticetis. *I Krattet imellem Sorgenfri og Fuglevad Mølle ved Fodstien! Imellem Ordrup Mose og Dyrehaven. Fredriksdal i Nærheden af Broen. Ved Gurre Sö (!) I Kratter ved Gyldenholm ved Slagelse Ehrenr.*

261. Rh. 2. Frángula L. (278) inermis flor. androgynis 5petalis baccis 2spermis. — H. 1. 270. Fl. albid. 6—7. In fruticetis haud infrequens. *Ved Lyngby Mose!*

30. **Viola** L. Viol.

A. GRAMMIONUM Richb. petalis 4 superioribus sursum directis et imbricatis, stylo adscendente clavato stigmate urceolato utrinque piloso.

262. V. 1. tricolor L. (623. 1748). H. 1. 253 (V. tricolor) 254 (V. arvensis Murr). Formæ primariæ 1) vulgaris cor. tricolore (calyce brevior v. longior v. eam æqvante). 2) arvensis cor. unicolore (alba) v. bicolore (calyce brevior v. longior v. eam æqvante). 4—9. ☉. In agris, arvis, cultis, inter segetes frequentissima.

B. VIOLA, petalis 2 intermediis lateraliter

patentibus, stylo recto v. parum inclinato;
stigmatē adunco.

a. acaules.

263. V. 2. palustris L. (83) stigmatē explanato pedunculis fructiferis erectis apice hamatis fol. reniformi-cordatis glabris. H. 1.

250. Fol. angustiora v. latiora. Stipulæ ovatæ, acuminatæ, liberæ. Fl. lilacini. 5—6. 24. In pratibus. *Lundehusmosen! Ordrup Mose!*

Obs. Formæ hujus plantæ ulteriore observatione egent.

264. V. 3. hirta L. (618) stigmatē in rostellum deflexum adtenuato, pedunc. fructif. prostratis apice rectis, fol. cordatis obtusis hirtis, stolonibus nullis. H. 1. 249. Petala emarginata, coerulea v. lilacina. 4—5 24. In sylvis, collinis frequens.

265. V. 4. odorata L. (309) stigmatē pedunculisqve prioris, fol. reniformibus glabris, stolonibus reptantibus. H. 1. 249. Petala violacea fundo albo, infimum solum emarginatum. 4—5. 24. Ad vias, sepes, margines sylvarum. *Byens Volde! Udenfor Charlottenlund!*

b. caulescentes.

α. caulis unifariam pilosus.

266. V. 5. mirabilis L. (1045) fol.

lato-cordatis petiolis carinâ pilosis. H. 1. 252. Fl. violac. 4—5. 24. In dumetis, sylvis. *I Krattet mellem Ordrup Mose og Dyrehaven! Kjøge Aas Kamph.!*

β. caulis undiqve pubescens v. glaber.

267. V. 6. ericetorum Schrad (1453) caulibus adscendentibus, fol. e cordata basi oblongo-ovatis acutiusculis, stipulis caulinis intermediis petiolo suo pluries brevioribus. H. 1. 251 (V. canina). 2. 144 (V. c. ericetorum). Sepala ovato-lanceolata adtenuato-acuta, caps. truncato-obtusa apiculata, fl. violac. 5—6. 24. In collinis apricis umbrosisqve. — Inquirendum in V. arenariam DC. quæ differt caulib. pube subcanescentibus, fol. cordatis obtusis, caps. ovata acutiuscula. Rchb. I. 142—146.

268. V. 7. silvestris Kit (...) caule stipulisqve præcedentis, fol. cordatis v. subreniformibus breviter acuminatis. H. 1. 151 (V. canina sylvatica). Est quasi continuatio præcedentis. Sepala lanceolato-acuminata caps. acuta, fl. coer. v. lilac. calcare concolore v. decolore. 5—6. 24. In sylvis umbrosis ubiqve.

Obs. V. Riviniana Rchb. "ex omni parte a V. canina" (ericetorum) "distinctissima imprimis fructu", ad quam citatur fl. D. 1453, mihi incognita, V. silvestri certe propior est.

In hanc ut inquiratur maxime optandum. Conf. ic. Rchb. Cent. I. 150—153, 200—203, VII. 820—822, et Fl. germ. exc. p. 706—707.

269. V. S. *stricta* Hornem. (1812) caulibus erectis, fol. cordato-ovatis antice subcuminato-angustatis, stipulis intermediis petiolo duplo brevioribus superioribus suum æquantibus. H. 1. 252. (V. *montana stricta*) 2. 145 (V. *stricta*) V. *Ruppil* Koch.; nomen Cl. Hornem. aptissimum certissimumque. Sepala acuta, fl. magni lilacino-coerulei. 5—6. 24. *Ved Gjærder paa Vesterfælled og i Nærheden af Flaskekroen (in loco)!*

31. *Impatiens* L. Balsamin.

270. I. *Noli me tangere* L. (582). H. 1. 248. Fol. ovata crenata, fl. citrini punctati. 7—8. ☉. In sylvis humidis. *Ved Lyngby! o. s. v.*

32. *Ribes* L. Ribs.

A. *GROSSULÁRIA spinosa* pedunculis 1—3-floris.

271. R. 1. *Grossularia* L. (546). — H. 1. 275. “*Stikkelsbær.*” 5—6. In sylvis, dumetis. *Charlottenlund!*

B. *RIBES inermia* floribus racemosis.

a. racemi erecti, bractæ pedicellis longiores.

272. *R. 2. alpinum* L. (968). H. 1.
 274. *Baccæ rubræ*. 5. *Paa Möens Klint, ved Maglevandsfaldet!*

b. *racemî penduli*, *bracteæ pedicello breviores*.

273. *R. 3. rubrum* L. (967) *cal. glabrâ bracteis ovatis*. H. 1. 273. *Fl. flavescenti-virides, baccæ rubræ*. "Ribs." 5—6. *In dumetis humidiusculis*.

274. *R. 4. nigrum* L. (556) *cal. pubescente foliisque subtus glanduloso-punctato, bracteis subulatis*. H. 1. 275. *Fl. virentes petalis intus rubris*, "Solbær". 5—6. *In dumetis humidiusculis. Ved Brædderne af Fuursöen!*

34. *Hedera* L. *Vedbende*.

275. *H. Helix* L. (1027). H. 1. 277. *Fol. coriacea angulato-lobata, ca ramulorum florentium integra. Rarissime floret. 10. In sylvis (ad terram serpit v. arbores adscendit). I Krattet paa Brede Bakker! Blomstrende: ved Dronninggaard Aabye, ved Skovsgaard i en Skov "Hestehaven", ved Veien imellem Slagelse og Nestved Ehrenreich. Et udmærket stort Exemplar ved Hjembæk Præstegaard pr. Holbæk Poulsen.*

34. **Herniária** L. Bridurt.275. H. 1. *glabra* L. (529) *glabra*.

H. 1. 281. — 6—7. 24. In campis aridis, ad vias.

276. † H. 2. *hirsuta* L. (....) *hirsuta*.H. 2. 282. 7. 24. *Paa Hadstrup Mark ved Bel-
dringe nær Præstø Badstyber, Hornemann.*
(Søgt der forgjæves i 1837 *Kamphöv.*)35. **Thésium** L. Naalebæger.276. Th. 1. *ebracteatum* Hayne (1205)*florib. bractea singula instructis, bract. super.
vacuis.* H. 1. 279. (Th. *pratense*.) *Rechb. V.*
649. *Fl. albi.* 6—7. 24. In collinis apricis. *Brede
Bakker! Ballerup Mark ned imod Hareskoven
Hornem. (uvist om denne eller følgende). Ved
Iægerspriis Kamphövener!*278. Th. 2. *pratense* Ehrh. (....) *flo-
ribus bracteis ternis, bract. omnibus florigeris.*
Rechb. V. 647. Sine dubio hæc species a Vahl
determinata sed casu quodam specimen prioris mix-
tim crescentis pictori delineandum traditum. *Paa
Brede Bakker imellem den foregaaende Herbar.
Schlichtkrull et Steenberg!*

Ordo III. DIGYNIA.

36. **Ulmus** L. *Ælm.*

279. *U. 1. campestris* L. (632) florib. subsessilibus, samaris glabris. H. 1. 291. 5. In sylvis. *Borreveile Skov* H. *Dyrket overalt i Plantager, Alleer.*

U. 2. effusa Willd. florib. pedunculatis pendulis, samaris ciliatis. H. 2. 153. *Rarius colitur.*

37. **Salsola** L. *Sodaurt.*

280. *S. Kali* L. (818). H. 1. 292. *Variat glabra et hirsuta. Utraque forma ad oras Siellan-diæ et Amagriæ.*

38. **Schobéria** C. A. Mey. *Schoberie.*

281. *S. maritima* Mey. (489). H. 1. 287 (*Chenopodium maritimum* L.). 8—9. ☉. *Ad littora marina frequens. Amager! Ved Flaskekroen!*

39. **Kochia** Roth. *Kochie.*

282. *K. hirsuta* Nolte (187). H. 1. 293 (*Salsola hirsuta* Oed.) 7—8. ☉. *Ad littora rara. Ved Holbæk (!) Skjelskjör* H.

40. **Chenopodium** L. *Gaasefod.*

A. *Folia integerrima.*

283. *Ch. 1. polyspermum* L. (1153)

fol. laterinerviis ovato-oblongis ovatisve non farinosis. H. 1. 287. Engl. bot. t. 1480 et 1481 (Ch. acutifol.) Perigon. fructiferum patulum. Formæ primariæ: 1) erectum caule erecto ramis adrectis v. adscendenti-erecto, inflorescentia magis compacta; variat fol. sup. acutis v. omnibus obtusis, sæpe emarginatis mucronatis. 2) decumbens inflorescentia cymoso-paniculata laxa. 7—9. ☉. In locis cultis, ruderatis, argillosis. *Fredriksberg Have (!) Ved Uterslev (!) Nivaa (!) Vordingborg (!)*

284. Ch. 2. vulvária L. (1152) fol. basinerviis rhombeo-ovatis cano-farinosis. — H. 1. 286. Prostratum, racem. aphyllus ex glomerulis compactis compositus, perig. fructif. clauso. Odor foetidissimus. 7—9. ☉. In locis ruderatis, fimeta. *Udenfor Nørreport (!) Ved Salpeterværket udenf. Ö. Port H. Udenf. Amagerport til høire forbi Gjögens Batteri paa de sløifede Jordvolde!*

B. Fol. minus magisve angulata dentata.

285. Ch. 3. viride L. (1150) viride, fol. ovato-oblongis v. subrhombeis subsinuato-dentatis v. (in spec. humilior.) integerrimis, florib. corymbosis, semin. nitidis margine obtusis. H. 1. 285 (Ch. album viride). 6—9. ☉. In locis cultis cum subsequen-
 9.

286. Ch. 4. album L. (....) albo-farinosum fol. rhombeo-ovatis eroso-dentatis super. oblongis subintegerrimis, florib. spicatis spicis adrectis subaphyllis, glomerulis (majusculis) remotis, (sem. præcedentis). H. 1. 285. Engl. bot. 1723. 6—9. ☉. Cum præcedente.

287. Ch. 5. ficifolium Sm. (....) fol. elongatis subtrilobis sinuato-dentatis, spicis subadrectis subaphyllis glomerulis (majusculis) remotiusculis (sem. priorum). Engl. bot. 1724.

288. Ch. 6. opulifolium Schrad. (....) fol. subrotundo-ovatis subtrilobis obtusissimis sinuato- v. eroso-dentatis, inflorescentia paniculata glomerulis (minoribus) adproximatis, (sem. priorum). Vaill. bot. par. t. 7. f. 1. Variat farinosum et viride. 7—9. ☉. Cum prioribus.

Obs. Species 4 nuper recensitæ arctissimo vinculo inter se conjunctæ sunt et formis transitoriis connectuntur, sed necesse est aut omnes ut species distinguere aut omnes in unam reducere. Inter semina nullas differentias invenire potui. Ulteriori inquisitioni eas commendo, sed non nisi fructiferæ examinari possunt.

289. Ch. 7. murale L. (2048) fol. rhombeo-ovatis basi cuneatis sinuato-dentatis dentibus acuminatis, cymis paniculatis laxis,

semin. opacis (nigris) margine acute-carinatis. H. 1. 284. Præcedentibus adfine sed notis datis facile distingvitur. 7—9. ☉. In locis cultis, ruderatis.

290. Ch. 8. rhombifolium Mühlenb. (....) fol. rhombeo-ovatis in basin cuneatis sinnato-dentatis dentibus acuminatis, spicis compactis adrectis, sem. nitidis atro-fuscis lævissimis. Engl. Bot. t. 717 (Ch. urbicum). Ch. murale Schum. herb. Inter præcedentem et subsequentem quasi intermedium, Blito rubro adfine. 7—9. ☉. In locis ruderatis. Ved Helsingör Liebman!

291. Ch. 9. urbicum L. (1148) strictissimum, fol. ex basi truncatâ v. in petiolum breve protractâ triangularibus grosse et abbreviato-dentatis, spicis gracilibus adpressis, semin. opacis (nigris) tenuissime rugulosis margine obtusis. H. 1. 283. 7—9. ☉. In ruderatis, ad fimeta hand infreqvens. Skovshoved! Torbæk o. s. v.

292. Ch. 10. hybridum L. (2049) fol. cordatis angulato-dentatis dentibus acuminatis, panic. effusissima terminali aphylla, semin. opacis (nigris) obtusis punctulatis. H. 1. 284. In locis cultis minus freqvens. Amager og udenfor Kastelsporten H. Helsingör (!) Kjøge (!) o. s. v.

41. **Blitum** L. Stolthendrik.

A. Perigoninum fructiferum baccans coloratum.

B. capitatum L. (H. 1. 8.) racemo aphylo.

B. virgatum L. glomerulis axillaribus. Utrumque interdum occurrit in hortis et in rejectamentis hortarum profugum. (*Den förste, v. Valdbyl! Bagsværd (!)*)

B. Perig. fructif. herbaceum. ORTHOSPÓRUM Mey.

293. B. 1. bonus Henricus Mey. (579) fol. triangulari-bastatis integerrimis, racemis compositis terminali conico aphylo. H. 1. 282 (Chenopod. L.) 5—8. 24. Ad vias, muros, fimeta frequens.

294. B. 2. rubrum Mey. (1149) fol. triangulari-oblongis sinuato-dentatis, dentibus lanceolatis obtusis, racemis compositis foliatis, caule erecto ramis adrectis strictis. H. 1. 283. (Chenopod. L.) Planta succosa modo viridis, modo rubro tincta. "Fl. laterales glomeruli 3partiti, 1-2andri, seminibus erectis, terminalis 5part. 5and. sem. horizontali." 7—8. ☉. In ruderalis, ad fimeta, in loc. limos. exsiccatis, ad littora.

295. B. 3. botryoides (...) fol. sub-

hastato-triangularibus oblongisve integerrimis, racemis compositis subaphyllis, caule erecto ramis patentibus inferior. longissimis caulem subæquantibus. Engl. bot. 2247 (Chenopod. Sm.) B. crassifol. Rehb. An specie a præcedente differt non satis patet. In littoribus. Ved Flaskekroen J. Vahl! (Hofmansgave Vahl!)

296. B. 4. glaucum Koch. (1151) fol. oblongis v. ovato-oblongis remote dentatis subtus glaucis, racemis aphyllis. H. 1. 286 (Chenopod. L.) "Sem. plurima horizontalia, pauciora verticalia." 7-9. ☉. In ruderalis, locis limosis exsiccatis. Amager! Buddinge! o. s. v.

42. **Beta** L. Bede.

297. B. maritima L. (1571). H. 1. 292. Fol. rhomboideo-ovata, spicæ elongatæ foliatæ. 7-8. 24. Ad littora marina. Korsör (!) Reersö (!)

43. **Ātriplex** L. Mælde.

Obs. *Perigonis ex fructiferis descripta. Genus observationi ulteriori commendandum, sed observandum plantas florentes minime tute examinari posse.*

A. Rami omnes adrecti.

298. A. 1. littoralis L. (1287) fol. linearilanceolatis. H. 1. 291. Fol. integerrima

v. apicem versus dentata. Ultima forma est *A. marina* L., quæ a quibusdam nuper iterum distinguitur. Decidendum inquisitione perigonii fructiferi. 7—9. ☉. Ad littora marina.

B. Rami inferiores horizontaliter patentes.

299. *A. 2. angustifolia* Sm. (,...) fol. lanceol. superioribus integerrimis, inferioribus dente basilari horizontali subhastatis, flor. spicato-paniculatis defloratis sessilibus, "perigonii laciniis hastatis". — Schkuhr bot. Handb. IV. t. 347 (*A. patula*) H. 1. 290 (*A. p. angustifolia*). 7—9. ☉. In locis ruderatis, ad vias. *Amager!*

300. *A. 3. patula* L. (1285!) fol. a basi cuneata hastato-trilobis lobo medio elongato dentato, superioribus oblongo-linearibus integerrimis, flor. spicato-paniculatis defloratis sessilibus, per. lac. trapezoidalibus angulis apiceque acutis integerrimis denticulatisve. — H. 1. 290. 7—9. ☉. In ruderatis, ad littora.

301. *A. 4. microsperma* W. Kit. (....) fol. (omn. subconformibus) hastato-triangularibus integerrimis v. dentatis, flor. spicato-paniculatis defloratis sessilibus glomerulis approximatis nudis, per. lac. ovatis acuminu-

latis denticulatis integerrimisve. H. 1. 289
(*A. hastata* 1. *microtheca* Rfn., et 2 *macrotheca*? ex diagn.) Waldst. Kit. pl. rar. hung t. 250. In speciminibus minoribus inflorescentia minus ramosa, sed forma perig. plane eadem. Omnia quæ vidi albo-farinosa. Ad littora; in ruderatis frequens.

302. *A. 5. latifolia* Wahlenb. (1286?)
fol. inf. hastatis basi subcuneatis subintegerrimis sup. oblongis, flor. interrupte spicatis foliatis defloratis subsessilibus, per. lac. rhombo-subhastatis dentatis elongatis. H. 1. 288. (*A. hastata*, excl. varr. 1 et 3, et forte 2). Cum præcedente, ut videtur rarior.

303. † *A. 6. longipes* (....) fol. inf. hastato-triangularibus elongatis subintegerrimis super. oblongis, flor. interrupte spicatis foliatis defloratis longe pedunculatis, per. lac. hastato triangularibus basi dentatis (dentibus acuminatis) dorso elevato-nervosis. Viridis, humilior, characterum præcedentis et sequentis ut videtur particeps, ceterum mihi dubia et e sicco descripta. 7—9. ☉. In campis (et littoribus?) *I Mængde paa Marker ved Flaskekroen!*

304. *A. 7. hastata* L. (1638) fol. inf. hastato-triangularibus sinuato-v. laciniato-dentatis, sup. oblongis subintegerrimis, flor. inter-

rupte spicatis foliatis defloratis pedunculatis, per. lac. hastato-triangularibus basi acuminato-dentatis apicem versus remote dentatis v. integerrimis, dorso elevato-nervosis. H. 1. 289. (A. hastata v. calotheca Rfn.) Rchb. Cent. I. f. 33! Robustissima specierum, sæpe tota decumbens, fol. perigoniisqve facile distinguenda. 7—9. ☉. In littoribus haud infreqvens. *Vesterfæll!*

† A. hortensis L., quæ differt perig. femin. diphylo (non bipartito), subrotundo-ovato integerrimo, fol. cordato-triangularibus; interdum occurrit ex hortis profuga.

44. **Hálinus** Wallr. Kilebæger.

305. H. pedunculatus Wallr. (304 m.) H. 1. 291. (Atriplex L.) Fol. obovata integerrima farinosa, fl. fem. demum pedunculati. 8—9. ☉. Ad littore minus freqvens. *Amager ved Kastrup! Bag Flasekroen! Korsör, Frederikssund, Adlersborg H.*

45. **Cynánchum** R. Br. Svalerod.

306. C. Vincetóxicum R. Br. (849). H. 1. 280. (Asclépias L.) Caul. erectus, fol. ovato-cordata, cor. alba. 7—8. 24. In fruticetis, collinis *Charlottenlund (!) I Krattet paa Brede Bakker! Egebæksvang ved Helsingör. Bognæs Skov ved Roskilde (!) Slangerup, Adlersborg, Eriksholm, Nexelö H. Aasen ved Kjöge, Prambroen i Stevns*

red *Kamph.* (*Hveen, paa Bakken ved St. Ibs Kirke(!)*)

46. **Caucalis** Hoffm. *Fodangel.**)

307. *C. daucoïdes* L. (....) H. 1.

307. Fol. 2—3pinnata pinnulis pinnatifidis lacini-
lis acutis. 6—7. ☉. *Paa Marker ved Sömark paa*
Möen H.

47. **Tòrilis** Hoffm. *Randfröe.*

308. *T. Anthriscus* Gärtn. (919). H. 1.

307. (*Caucalis* L.) Fol. bipinnata foliolis inciso-serra-
tis, fl. albi v. rubelli. 6—7. ☉. In sylvis, fruti-
cetis, ad sepes haud infrequens!

48. **Scándix** L. *Langnæb.*

309. *S. Pecten* L. (844). H. 1. 331. Fol.

tripinnata, fl. albi. 6. ☉. Inter segetes in campis
calcareis. *Paa Möen almindelig! (ved Aalborg!)*

49. **Anthriscus** Hoffm. *Körvel.*

310. *A. 1. sylvestris* Hoffm. (2050) fol.

bipinnatis pinnulis pinnatifidis fructibus oblon-
gis lævibus. H. 1. 333. (*Chærophyllum sylvestre*
L.) 6—7. 24. In sylvis umbrosis, pratis, ad sepes
frequens.

*) *Fructus Umbelliferarum* est achenium distylum
dispermium bipartibile, ejus apicem dimidiam

311. A. 2. vulgaris Pers (863) fol. tri-
pinnatis foliolis pinnatifidis fructibus ovatis

occupat *stylopodium* s. *discus epigynus* (Griffelstol, topstillet Skive) a basi stylo-
rum dilatato formatus. *Carpidia* (drupacea), ante maturita-
tem connata, matura solvuntur et modo apice
adfixa sunt *carpophoro* (*Frugtholder*) filiformi
plerumque bipartito. (Paucis *carpophorum* car-
pidiis adnatum). *Carpidium* fere explet *albumen*
magnum, apice embryone minuto instructum.

In quovis *carpidio* (caute a fructu v. achenio
distingvendo) hæc observantur: 1) *planum com-*
missurale s. *superficies anterior* s. *interior* (*In-*
drefladen). Pars hujus plani quâ *carpidia* in-
vicem sese adtingunt est *commisura* (*den berö-*
rende Flade), quæ ant totum planum *commis-*
surale occupat ant eo angustior est. Linea *com-*
missuram circumscribens vocatur *raphe*. 2) *Dor-*
sum s. *superficies posterior* s. *exterior*. (*Rygfla-*
den, *Ryggen*) 3) *margo* (*Randen*) quo *dorsum*
et *pl. comm.* distingvuntur.

In dorso observanda: 1) *costæ*, *Ribberne* (juga
Koch) quæ longitudinaliter *dorsum* percurrunt;
hæ sunt *primariæ* (*Hoved-R.*), ubi adsunt, 5;
et *secundariæ* (*Bi-R.*), ubi adsunt, 4. *Co-*
starum *primariarum* tres mediæ vocantur c.
dorsales (*Ryg-R.*), duæ extremæ c. *laterales*
(*Ryg-R.*). — C. lat. sunt *marginantes* (*ran-*
dende) ubi *marginem* ipsum efficiunt (*Pim-*
pinella), *intramarginales* (*indenfor Randen*)
ubi *infra marginem* positæ sunt, (*Pastinaca*)
commisurales *plano comm.* impositæ (*Daucus*, *La-*
serpitium). — 2) *Interstitia* inter *costas* *primarias*
(*Mellenrummene*, *valleculæ* Koch) plerumque
instructa sunt *vittis oleiferis longitudinalibus*.

aculeatis. H. I. 332 (*Scandix Anthriscus* L.) 5—6.
 ☉. — Ad sepes, locis incultis circa pagos. *Alminde-
 lig omkring Kjöbenhavn!*

† A. *Cerefolium* Hoffm. (1640) fol.
 triplinatis fructibus linearibus lævibus. „Kör-
 vel“. Sæpe circa pagos occurrit ex hortis aufuga.

50. **Chærophýllum** L. Huulsvøb.

312. Ch. *témulum* L. (918). H. I. 334.
 Caul. sub geniculis tumidus, fol. bipinnata foliol.
 pinnatifidis. 6—7. ☉. In dumetis, ad sepes *Ved
 Charlottenlund! Ordrup!*

51. **Myrrhis** Scop. Kortnøb.

313. M. *odorata* Scop (1928). H. I.

3) vittæ (*Olickanalerne*) sunt aut *superficiales*
 (*yderlige*), aut *pericarpio obtectæ* (*bedækkede*).
 Vittæ in sectione transversali fructus ut puncta
 opaca melius conspiciuntur.

Carpidia porro sunt aut *solida* (*faste*), *peri-
 carpio semini arcte adnato*, aut *nucleata* (*løs-
 kjærkede*) quum semen liberum in cavitate *pe-
 ricarpium* adest (*Angel. littoralis*). *Carp. sole-
 nospermum* Rehb. *furefrøet* (*campylospermum*
 Koch) et *platyspermum* R. *fladfrøet* (*orthospermum*
 Koch) cfr. *Sciagr. gen.* — Hæc structura obser-
 vatur in sectione transversali fructus, vel etiam
 inspecto plano commissurali. — Pro voce: *fructus*
 s. *achenium* vulgo adhibetur: *cremocarpium*
 Mirb; pro *carpidio* autem *mericarpium* DC v.
carpellum DC.

330 (Scandix L) Fol. tripinnata foliolis pinnatifidis.
6—7. 24. *Imellem Charlottenlund og Ordrup strax
udenfor Skoven i en Dal til Venstre Lange. I en
Skov ved Kjöge Kamphövener!*

52. **Conium** L. Skarntyde.

314. **C. maculatum** L. (....) H. I.

311. Caul. violaceo-maculatus. 7—8. ☹. In rude-
ratis, ad vias. *Ved Birkerød!*

53. **Daucus** L. Gulerod.

315. **D. Caróta** L. (723). H. I. 318 Hi-
spidus, fol. 2—3—pinnata pinnulis pinnatifidis lacin-
lanceolatis cuspidatis. Fl. albid. 6—8. ☹. In
pratibus et pascuis.

54. **Laserpitium** L. Foldfrøe.

316. **L. latifolium** L. (1513). H. I.

316. Fol. ternato-bipinnata foliolis ovatis serratis
basi cordatis. 7-8. 24. *I Hareskoven og i Jonstrup
Vang! Ved Slangerup H.*

55. **Peucedanum** L. Svovlrod.

317. **P. palustre** Moench (257. 412).

H. I. 312 (Selinum L.) Involucrum polyphyllum de-
flexum; folia tripinnata foliolis pinnatifidis laciniis
lineari-lanceolatis acuminatis. 7—8. ☹. In pratibus
turfosis, sylvaticis.

56. **Pastināca** L. Pastinak.

318. *P. sativa* L. (1206). H. I. 335. Fol. pinnata foliolis oblongis. Fl. lutei. 7—9. ☉. In pratis, ruderatis.—Frequens colitur.

57. **Heracleūm** L. Björneklo.

319. *H. Sphondylium* L. (....) H. I. 317. Fol. profunde—pinnatifida pinnis lobatis v. palmato-partitis. Umbellæ flōres peripherici majores. Fl. albi v. rosei.—6—8. ☉. In pratis, dumetis subhumidis.

58. **Angélica** L. Angelik.

320. *A. l. sylvestris* L. (1639) caule sulcato superne albo-puberulo, fol. bipinnatis foliol. ovatis acute serratis. H. I. 321. 3—6 pedalis fl. rubelli v. albi. 7—8. 4. In pratis, dumetis humidis frequens. *Lundehusmosen!*

321. *A. 2. littoralis* Fr. (....) caule subsulcato glabro, fol. bipinnatis, foliolis ovatis inæqualiter serratis impari trilobo vel 5lobo. H. I. 320 (*A. Archangél.*) ex parte, exclus. Synon. plur. et locis borealibus. Areschong plant. Cot. gothob. p. 47 opt. Gigantea hominem altior, fl. viridi flavi, fol. foliolum impar. interdum subpinnatifidum v. trilobum lobo medio trilobo. *Carpidia*

nucleata, albumen vittis numerosis instructum. —
6—7. ☉. Ad ripas fluviorum. *Fuglevad Mölle!*
Roskilde, Nestved H. meget alm. i Egnen af Kjøge
Kph.!

Levisticum Koch. *Lostilk.*

1. *L. officinale* Koch. *Hornem. l.*
318 (*Ligusticum Levisticum* L). Fol. bi-tri-pin-
nata, foliola cuneato-rhombea inciso-serrata. Homi-
nem altum. — Ad hortos agricolarum hinc inde inve-
nitur.

59. **Selinum** L. *Seline.*

322. *S. Carvifolia* L. (667). *H. l. 313.*
Fol. tripinnata foliolis incisis, caul. sulcato-angu-
latus. 7—9. 24. In pratis, sylvis humidiusculis.
Flaskekroen! Grøfterne ved Veien til Charlottenlund!

60. **Buplévrum** L. *Hareöre.*

323. *B. l. tenuissimum* L. (1090). *H. l.*
306. Fol. lineari-lanceolata. 7—9. ☉. In pratis
maritimis. *Amager! Vesterfæll!*

B. 2. rotundifolium L. *H. l. 306.* Fol.
ovatis perfoliatis.—Hinc inde occurrit in hortorum
rejectamentis. *Møen efter Kyll.*

61. **Helosciadium** Koch. *Skjærmlille.*

324. *H. inundatum* Koch (89). *H. l.*
305 (*Sison* L) Fol. emersa pinnata fol. cuneiformi-

mibus apice bifidis, submersa multifida lacin. capillaribus. 6—7. 24. In fossis, stagnis. *Ved Bagsværd (!) Ermelund, Birkerød H. Örsholt (!)*

62. *Apium* L. Selleri.

325. *A. graveolens* L. (790). H. I. 341. Fol. pinnata superiora ternata foliol. cuneatis apice inciso-dentatis. 7—8. ☹. Ad littora. *Ved Flaskekroen! (sandsynligviis forvildet) Kjøge, Præstø, Vordingborg, Gavnø H. — Møen ved Phanefjord H.*

63. *Ægopodium* L. Busmekker.

326. *Æ. Podagraria* L. (670). H. I. 312. Fol. radical. biternata, caulina ternata. 6—7. 24. In hortis, dumetis, sepibus, hortulanis infestum.

94. *Carum* L. Kommen.

327. *C. Carvi* L. (1901). H. I. 337. Fol. bipinnata, foliola incisa laciniis linearibus. 6—7. ☹. In pratis, pascuis.

65. *Pimpinella* L. Pimpinelle.

328. *P. I. magna* L. (1155) caule folioso angulato-sulcato, stylis ovarium superantibus, fructibus oblongo-ovatis. H. I. 340. — 7. 24. In pratis, ad sepes. *Ved Nivaa! Frederiksberg Hove og Lundehusmosen H. Boholt Skov ved Kjøge (!)*

329. *P. 2. Saxifraga* L. (669) caule superne subnudo tereti striato, stylis ovario brevioribus, fructib. ovatis. H. I. 338. Variat glabra et pubescens, foliolis ovatis dentatis, et multipartitis (*P. dissecta* Autt. ex parte). 7—8. 24. — In pascuis, collinis apricis frequens.

66. *Cicuta* L. Gifttyde.

330. *C. virosa* L. (208). H. 328. Fol. tripinnata foliol. lineari-lanceol. serratis. 7—8. 24. In fossis, turfosis.

67. *Sium* L. Mærke.

931. *S. latifolium* L. (246). H. I. 322. Fol. pinnata foliol. oblongis serratis basi inæqualibus; fol. demersis foliola multifida. 7—8. 24. In fossis, stagnis.

68. *Berula* Koch. Berle.

332 *B. angustifolia* Koch (247). H. I. 322. (*Sium* L.) Fol. pinnata foliol. oblongo-lanceol. inciso-serratis, fol. involucri subserrata involuelli integerrima. 7—8. 24. In paludibus, fossis. *Gröfter i Lundehusmosen!*

69. *Cnidium* Cass. Brændeskjærm.

333 *C. venosum* Koch (1330). H. I. 314 (*Selinum lineare* Schum. *C. palustre*

Rehb.) Fol. bipinnata fol. linearibus. 7—9. ☉. —
Ved Flaskekroen!

70. *Æthusa* L. Halvsvøb.

334. *Æ. Cynápium* L. (1991). H. I.

329. Involucelli foliola terna reflexa umbellulâ longiora. Fol. nitida 2—3pinnata foliolis pinnatifidis laciniis incisis. 6—9. ☉. In hortis, ruderalis.

71. *Oenanthe* L. Klaseskjærm.

A. Radix fasciculata, umbellæ terminales.

335. *O. I. fistulosa* L. (846) stolonifer, petiolis fistulosis folio brevioribus, fructibus turbinatis. H. I. 325. Stolonum folia pinnata foliol. ovatis trifidis, fol. radic. 2—3pinnata, caulina pinnata foliolis oblongo-linearibus brevibus. 7—8. ☉. In pratis humidis.

336. *O. 2. Lachenalii* Gmel (1454) stolonibus nullis, petiolis folio brevioribus, fructibus basin versus adtenuatis sub calyce contractis. H. I. 326 (*O. pimpinelloides*). Fol. radical. 2pinnata, foliol. cuneatis inciso-crenatis, caulina inf. bipinnata, superiora pinnata lacin. linear. 7—8. 24. In pratis humidis. *Ved Præstø, Tappernøie (!) (Svendborg!)*

Obs. O. pimpinelloides L. differt fructibus cylindraccis basi callo cinctis. *O. mega-*

politana Nolte hols. ex spec. in hrb. Kamp-
höv. est alia planta.

B Radix fusiformis, umbellæ oppositifoliæ.

337. O. 3. *Phellándrium* Lam. (1154).

H. I. 327 (*Phell. aquat.* L.) Fol. 2-3-pinnata
foliol., ovatis pinnatifido-incisis. 7—8. ☹. In fos-
sis aquaticis.

72. **Libanòtis** Crantz. Hjorteroð.

338. *L. vulgaris* DC. (754). H. I. 315.
(*Athamánta Libanotis* L.) Fol. 2—3pinnata foliol.
pinnatifido-incisis, fructus hirti. 8. ☹. Ad littora
rarior. Ved Valbygaard pr. Præstö; Im. Overby
og Ebbelykke i Odsherred. N. Nexelö H. Reersö (!).

73. **Hydrocòtyle** L. Vandnavle.

339. *H. vulgaris* L. (90). H. I. 304.
Fol. orbiculata duplic.-crenata. Fl. albi v. rubelli.
7—8. 24. In paludosis, inundatis.

74. **Sanicula** L. Sannikel.

340. *S. europæa* L. (283). H. I. 305.
Fol. longe petiolata palmato-partita lacin. trifidis
inciso-serratis, umbellulæ capitatae. 5—6. 24. In
sylvis humidiusculis. I Krattet im. Ordrup Mose og
Dyrhaven! o. s. v.

75. **Eryngium** L. Mandstroe.341. *E. maritimum* L. (874 m). H. 1.

303. Involucri foliola ovata subtriloba dentato-spinosa capitulo longiora. Fol. rad. indivisa cordato-reniform., superiora amplexentia lobata omnia spinoso-dentata. Color plantæ albido glaucus, fl. coer. 7-8. ☹. In littoribus marinis arenosis. *Ved-bæk o. s. v.*

Obs. E. planum L. (invol. foliolis lineari-lanc. capitulum æquantibus v. paullo superantibus) interdum occurrit ex hortis aufuga.

Ordo III. TRIGYNIA.

76. **Viburnum** L. Qvalkved.342. *V. Opulus* L. (661). H. 1. 343.

Fl. albi umbellati, peripherici steriles radiantes.
6. — In paludosis.

77. **Sambucus** L. Hyld.

343. † *S. 1. Ébulus* L. (1156) caule herbaceo stipulis foliaceis. H. 1. 344. 7-8. 24.
Jægerspriis og Sorø H.

344. *S. 2. nigra* L. (545) caule arboreo stipulis nullis. H. 1. 345. Fl. corymbosi albi.

Colitur var. fol. laciniatis (*S. laciniata* Mill.)
5—7. Ad pagos.

S. racemosa L. H. 347. (racemo ovata)
haud infreqvens plantatur.

Ordo IV. TETRAGYNIA.

78. **Parnássia** L. Leverurt.

345. *P. palustris* L. (584). H. 1. 345.

Fol. rad. longe petiolata cordata, caulinum 1 am-
plexens. Fl. alb. parapetalis flavo-viridibus. 8—9.
24. In pratis. *Sjælden omkr. Kbh.*

Ordo V. PENTAGYNIA.

79. **Arméria** Willd. Faareleger.

A. Scapi in fasciculo foliorum laterales.

346. † A. 1. *maritima* Willd. (...) Invol.
foliola omnia obtusissima exteriora interdum
mucronata, scapus et fol. angustissima pube-
scentia. Engl. bot. 226? Spontaneam non vidi,
in hortis frequens colitur ad cingendas areas.

B. Scapi in fasciculo foliorum centrales.

347. *A. 2. purpurea* Koch (....) invol. foliolis exterioribus obtusis mucronulatis interioribus obtusissimis muticis. *A. maritima*, H. 1. 351 ex diagn? — Variat glabra et pubescens. 7—9. 24. In pratis frequens, etiam maritimis.

348. *A. 3. elongata* Koch (1092) invol. foliol. exterioribus cuspidatis herbaceis, interioribus obtusis mucronatis (margine lato membranaceo). *A. vulgaris* H. 1. 351 ex diagn.? Robustissima specierum, fol. lata ciliata. Var? minor invol. foliol. ext. breviorib., scapo pubescente. (Möen *Kph*!) 7—8. 24. In pratis præcipue maritimis, ut videtur rarior præcedente. Möen, f. *Ex. v. Ulfshale Kamphöven*!

80. *Státice* L. *Limonurt*.

349. *St. 1. rariflora* (....) ramis inflorescentiæ adrectis dissitifloris, bract. oblique truncatis muticis exteriore latiore interiore amplectente, omn. florigeris. *Limonium* angl. minus—flor. in spicis rarius sitis Ray. syn. 202. *Lim. humile* Mill. Ed. germ. — Omni parte tenuior, minus ramosa, in ramis exterior. fl. unilaterales solitarii interdum gemini, in interioribus in axi flexuosa distinctius alterni. Fol. juniora lanceol. in mucronem adtenuata, adultiora

obovato-spatulata mucrone (elongato recto v. brevissimo curvato) sub apice emergente. Panic. deflorata ob bract. coloratas marg. membranac. fusco-variegata. Huc St. Lim. bahusiensis Fr. mant. p. 10 (ex specim. a cl. J. Agardh datis), quæ sola magnitudine a nostra differt. 7—8. 24. In littoribus. *Paa Brædderne af Iseffjorden, ved Jægerspris og Fredrikssund (!) (I Fyen ved Hofmansgave (!))*

350. S. 2. Behen (....) ramis infloresc. subcorymbosis excurvatis fl. subimbricatis, bract. acuminato-mucronatis exteriore angustiore, inferioribus vacuis. St. Limonium Engl. bot. 102. Limon. majus multis, aliis Behen rubrum L. Bauh. L. vulgare Mill. St. Lim. scanica Fr. mant. ex spec. Robustior et sæpius major, caulis distinctius angulatus. Panic. ramosiss. ramis apice excurvatis, ramuli inferiores inferne bracteis vacuis obsiti apice sub-1-flori, superiores multifl. basi tamen squama vacua una alterave præditi. Cujusque ramificationis rami exteriores inferne latere interiore ramulis fl. unilaterales gerentibus obsiti, superne fl. gemin. adproximi; rami medii utrinque ramulosi fl. adproximatis. Fol. præcedentis modò latiora, mucronis insertio exacte eadem. 8—9. 24. — *Ved Holsteinborg (!) Ormö (!) Reersö (!) (Rødby Fjord i Laaland (!))*

Obs. Fig. fl. D. 315 pessima faciem generis modice referens, ex loco cit. ad St. rarifloram pertinet. Descript. bona speciei collectivæ St. Limonii vide ap. H. 1. 352. St. Limon. Rchb. (Cent. VIII. 997) "bracteis excisis" Eur. austr. civis est, specce tergest. a cl. J. Vahl lecta comparavi. S pseudo-Limon. Rchb. VIII. 959 St. rarifloræ proxima nec tamen bene convenit. Fol. specierum Dan. formâ non essentialiter inter se differunt. "Speciem hanc immense variare nulli non constat, præsertim vero foliis, a quorum figura nulla omnino in hac specie desumi potest certa nota". L. Hort. Cliff. 115.! St. Limonium præter loca supra memorata indicatur: ved Kallundborg H. Paa Saltholmen Kyll.

81. **Linum** L. Hör.

351. *L. catharticum* L. (851) H. 1.

353. Fol. oppos. ovato-lanceolata. Fl. albi. 6-8.

☉. — In pratis siccis.

82. **Drósera** L. Soldug.

352. *D. 1. rotundifolia* L. (1028) fol. orbicularibus. H. 1. 354. 7-8. ☉ et ☺. In uliginosis, pratis spongiosis.

352 b. *D. 2. intermedia* Hayne (2108) fol. obovato-cuneatis scapo basi arcuato foliis

breviore. H. 2. ... 7—8. 24. In pratis, uliginosis.
Ved Søborg Lyngbye!

353. *D. 3. longifolia* L. (1093) fol.
 oblongo-cuneatis scapo recto duplo brevioribus.
 H. 1. 355. 7—8. 24. In paludibus spongiosis haud
 infreqvens. *Lyngbye Mose! og andre Moser om-*
kring Kjöbenhavn.

Ordo VI. POLYGYNIA.

83. *Myosurus* L. *Musehale.*

354. *M. minimus* L. (406). H. 1. 355.
 Fol. linearia. 5—6. ☉. In locis aridis. *Amager!*
Flaskekroen! Gjærder ved Charlottenlund!

Classis VI. HEXANDRIA.

Ordo I. MONOGYNIA.

1. *Ácorus* L. *Kalmus.*

355. *A. Calamus* L. (1158) culmo su-
 perne foliaceo, spadice conica. H. 1. 378. *Odor*

aromaticus. 6—7. 24. Ad ripas stagnorum et am-
nium.

2. *Luzula* Desv. Frytle.

a. flores spicati spicæ subumbellatæ.

356. L. 1. campestris DC. (....)
spicis cernuis intermedia subsessili, radice
repente. H. 1. 392. "Caps. valvæ obtusæ". Poly-
morpha, forma insignis: congesta spicis omni-
bus subsessilibus in capitulum congestis. (L. con-
gesta H. 1. 394. Fl. D. 1692). 4—6. 24. — In
pratis, pascuis frequentissima.

357. L. 2. erecta Desv. (1333) spicis
erectis omnibus pedunculatis, radice fibrosa.
H. 2. 172. (L. camp. erecta) Host gram. 3. 97.
L. multiflora Lejeune. "Caps. valvæ acutius-
culæ". 6—8. 24. In pratis, sylvis frequens. *Lunde-
husmosen! Ordrup Mose! Frdal Skov!*

b. flores anthelici pedunculis sub 4-flo-
ris.

358. L. 3. albida DC. (....) anthela
supradecomposita involuero brevior. H. 1.
395. Host gr. austr. 3. 95. Fol. bractæque marg.
pilosa, antheræ subsessiles, fol. perig. exteriora
breviora mucronata inter. longiora acuta, omnia
albida, interdum macula fusca dorsali, pedunculi

atropurpurei! Ante anthesin lecta, flores plurimi ut vid. steriles. 6—7. 4. *Paa Gielsbakke ved Siderne af Landeveien Kamphöven er!*

c. flores umbellati pedunculis unifloris.

359. L. 4. pilosa Gaud. (....). H. 1.

395. Host. gr. a. 3. 100. L. vernalis DC. Caps. ovato-pyramidata mucronata. 4—5. 4. In sylvis umbrosis frequens. *Charlottenlund!*

3. *Juncus* L. Siv.

A. Culmus aphyllus basi squamis obsitus.

a. squama basilaris superior foliifer, anthela terminalis, semina appendiculata.

360. J. 1. maritimus Lamk (1689) culmo stricto rigido fol. basilaribus culmisque sterilibus pungentibus, anthela erecta. H. 1. 383. Caps. ellipt. mucronata perigonium æquans. 8. 4. In littoribus. *Saltholmen Kamphöven er! Holmene ved Præstø, ved Vordingborg, Kalundborg Hornem. Holsteinborg Petit!*

b. squamæ basilares aphyllæ, anthela spurie lateralis, sem. non appendiculata.

aa. anthela decomposita v. supradecomposita.

α. triandri, stylus brevissimus subnullus.

361. J. 2. conglomeratus L. (1094) anthela decomposita conglomerata caps. obovata retusa, stylo mamillæ elevatæ insidente. H. 1. 380. Culmus striatus. 6—7. 4. In locis ruderatis, uliginosis, ad ripas glareosas lacuum frequens.

362. † J. 3. subuliflorus (....) anthela supradecomposita laxa ramis exterioribus reliquos multum superantibus anthelam minorem gerentibus, caps. obovata truncatula, stylo mamillæ elevatæ insidente. Inter præc. et seqv. intermedius, ab illo diff. gracilitate, viridi colore, anthelæ forma, pedicellis bracteisqve longioribus, flor. fere duplo minoribus, fol. perig. lineari-setaceis, capsulæ (non satis maturæ) formâ, mamilla majore; ab hoc anthela, culmo striato, colore viridi, flor. magis adproximatis paullo minorib. fol. perig. et caps. forma. *Samlet i Omegnen af Fuursøen af Liebman og mig selv 1834!*

363. J. 4. effusus L. (1096) anthela decomp. laxa, caps. obovata retusa stylo ex emarginatura egrediente. H. 1. 381. J. effusus Schum.! Culmus lævis in sicco tenuissime striatus. Fl. in pedunc. elongatis magis remoti, multo minores iis J. conglom. Anthelæ rami exteriores

interdum elongantur et reliquos longe superant. —
6—7. 24. Cum *J. conglom.* frequens.

β. hexandri, stylus manifestus.

364. *J. 5. glaucus* Ehrh. (1159) culmo striato medulla loculosa farcto, fol. perigon. acutis, caps. oblongo-elliptica obtusa mucronata. H. 1. 382. Color glauco-cæsius. 7—8. 24. In locis incultis, glareosis. *I Grøften ved Garnisonskirkegd. som vender imod Kastellet Schum.! Ved Falkonerogaarden. Ordrup Krat(!) Östlige Ende af Fuursøen imod Frdals Mølle bag det lave Krat med Rosa rubig.! Ved Esrum(!). — Møen paa Strandbrædderne nedenfor Klinten Kampf.!*

365. † *J. 6. balticus* Wahlenb. (....) culmo lævi (in sicco striato) medulla continua farcto, fol. perig. ovato-lanceolatis mucronatis, interiorib. obtusatis, caps. ellipt. obtusa mucronata. H. 1. 381. Robustior, anthela minus composita, caps. majores. 7—8. 24. Dubia floræ nostræ civis, (in Jutlandia dunis frequens), *J. effusus* Schum. huc. non pertinet! —

bb. anthela simplex sub-7-flora, (stylus subnullus).

366. *J. 7. filiformis* L. (1207) culmo subincurvo lævi, caps. rotundata obtusissima

mucronulata. H. 1. 382. Variat ex loco major et minor. 7—8. 24. In locis sterilibus, uliginosis. Imellem Gladsaxe og Teprimose H. Hirschholm Skov H. Helsingör (!)

B. Culmus foliatus, anthela terminalis.

a. folia articulato-nodosa.

α. triandri.

367. J. 8. uliginosus Roth (817. 1099)

fol. perigon. lanceolatis exter. acutis, interior. obtusis. H. 1. 385 (J. subverticillatus Wulf.) 386 (J. supinus Mnch.) 2, 170 (J. repens Reqv.) Caps. oblonga obtusa mucronata perigonio longior, stam. perigonium sesquivilonga. Var. glomerulis majorib. minoribusve, sæpe foliatis (J. subvert.), culmo sæpe ad genicula radicante et prolifero, unde (in aqua v. limo) fluitans v. repens evadit (J. fluitans Lamk, repens Rqv.). 7—8. 24. In locis uliginosis frequentissimus.

β. hexandri. (J. articulatus L.)

368. J. 9. acutiflorus Ehrh. (2112)

anthelæ ramis patentibus, fol. perigon. acutis aristulatis interioribus longioribus caps. ovata acuminata brevioribus. H. 1. 385. Host. gram. austr. 3. 86. J. sylvaticus Reich. Caul. strictiusculus, in aqua interdum radicans. 6—8. 24. In uliginosis, turfosis minus frequens.

369. J. 10. lamprocarpos Ehrh. (....)
 anthelæ ramis patentibus v. subadrectis, fol.
 perig. æquilongis lanceolatis mucronatis ex-
 terioribus acutis, interior. obtusis caps. ovato-
 lanceolatâ mucronatâ brevioribus. Host. gr.
 a. 3. 87. An huc fl. D. 1097? — Culmus adscen-
 dens. 6—8. 24. Cum præcedente adfini frequen-
 tissimus.

370. J. 11. ustulatus Hoppe (2171)
 anthela erecta, fol. perig. æquilongis obtusis,
 exterior. sub apice mucronatis caps. ovato
 oblongâ mucronatâ brevioribus. H. 2. 169.
 (J. alpinus Vill.). Culmus basi adscendens, color
 pallidior magis in fulvum vergens. Præcedentibus
 adfinis sed bene distinctus, caps. crassior. 7—8. 24.
 In turfosis. I Moser i Sjælland! (Det speciellere
 Voxsted mig ubekjendt.) In dunis Jyllandiæ
 frequens!

371. J. 12. obtusiflorus Ehrh. (1872)
 anth. divaricata ramis lateralibus retroflexis,
 fol. per. æquilongis obtusis caps. acutam subæ-
 quantibus. H. 1. 384. J. retroflexus Rafn.
 Maximus, culm. fol. vaginæque teretia. Anthela
 juvenis ex bracteis hyalinis pallescit. 7—8. 24. —
 In turfosis minus frequens. Ordrup Mose! Ved
 Farum (!) I Dyreh. v. Strandmøllen (!)

b. fol. canaliculata v. planiuscula lævia.

α. culmus elongatus unifolius.

372. J. 13. squarrosus L. (430) culmo subangulato, fol. rigidis, perig. fol. ovato-lanceolatis acutis caps. obovatam obtusam mucronatam æquantibus. H. 1. 383. J. bulbosus α Schum.! 6-7. 24. In locis sterilibus, pratis, ericetis. Gjelskov! Hyppig im. Kbh. og Kjøge, og i det nordl. Sjæll.

373. J. 14. compressus Jacq. (431) culmo subcompresso, anthelæ ramulis cymosis, fol. perig. ovato-oblongis obtusissimis caps. subglobosa duplo breviorib., stylo ovario duplo brevior. H. 1. 387 (J. bulbosus). 6-7. 24. Ad littus marinum in loc. inund., in pratis in vicinio maris etc. frequens. Vesterfælle!

374. J. 15. bottnicus Whlb. (....) culmo subtereti, anthelæ ramis cymosis, fol. per. capsulam oblongo-ovatam subtrigonam subæquantibus, stylo ovarium æquante. Cum præcedente rarior. Vesterfælle Vahl! Amager ved Plantagen! Reersø Vahl. Lbm.!

β. culmus brevissimus foliatus (in ramos elongatos inflorescentiæ divisus).

375. J. 16. bufonius L. (1098) H. 1. 388. Fol. perig. lanceolata acuminata, caps. oblonga obtusiuscula, rami anth. dichotomi. α vulgaris florib. solitariis distantibus. β fasciculatus florib. glomeratis (2-4nis); memorabilis forma. (J. hybridus Brot.). 6-7 ☉. In locis ruderatis, humidis, sterilibus. α overalt! β meget sjelden: ved Damhussøen Vahl! Kamphövener!

4. **Convallaria L. Konval.**

376. C. majalis L. (854) H. 1. 375. Odor svavis. Fol. basilaria 2 oblongo-lanceolata, rarius late-ovata v. lanceolata acuminata. (Utraque forma ved Næsbyholm Hornem.!) 5-6. 24. In sylvis frequens.

5. **Polygonatum Moench. Seglrod.**

a. Folia verticillata.

377. P. 1. verticillatum Mnch. (86). H. 1. 376 (Convallaria L.). Fol. lineari-lanceolata, fl. albi apice virides, bacca coerul. 5-6. 24. In sylvis rarius. I Krattet imellem Ordrup Mose og Dyrehaven! ved Dumpedals Mølle nær Birkerød H.

b. Fol. alterna.

378. P. 2. anceps Mnch. (377) caule angulato, pedunc. 1-2floris. H. 1. 376 (Conv.

Polygonatum L.). Stam. glabra. 5—6. 24. —
In collinis sylvaticis rarius. *Brede Bakker! Bidstrupgaard, Aasen ved Kjøge, Nexeløen H. Möens Klint.*

379. *P. 3. multiflorum* Mneh. (192)
caule tereti, pedunc. 3-5floris. H. 1. 377.
(*Convallaria* L.). Stam. hirsuta. "Variat pedunc. 1 floris". H. 5—6. 24. In sylvis humidiusculis frequens.

***Galánthus* L. Sneeklokke.**

1. *G. nivalis* L. (1641). H. 1. 361.
Flos cernuus, perig. fol. exter. alba, interior. intus viridi-striata, extus apicem versus macula viridi notata. 3—4. 24. — In pratis ex hortis profuga. *Ved Bernstorf.*

***Narcissus* L. Narcisse.**

1. *N. poëticus* L. fl. albo corona brevissima margine crenulato coccineo. — Hinc inde occurrit in rejectamentis hortorum. *Ved Esrum (!)*

2. *N. pseudo-Narcissus* L. (2170) fl. luteo corona concolore lacinias perig. æquante. H. 2. 164. Ex hortis profuga. *Ved Esrum (!) Ved Søborg Lyngbye.*

Fritillaria L. Keiserkrone.1. **F. Meleágris L. (972).** H. 1. 366.

Fl. nutans, purpureo ochraceoque tessulatus v. totus ochroleucus. 4—5. 24. *Paa en Eng i Charlottenlund ved Slottet (!)*

6. Túlipa L. Tulipan.380. **T. sylvestris L. (375).** H. 1. 367.

Fl. odoratus, flavus. 5—6. 24. Ab initio profuga. *Paa Kbhavns og Kastellet's Volde hyppig, i Frberg Have! hist og her i Sjæll. i og ved Haver forvildet.*

Muscári Tournef. Druehyacinth.1. **M. botryoídes Mill.** H. 2. 168

(Hyacinthus L.). Flor. subgloboso-ovati superiores steriles. Hinc inde in rejectamentis horticorum.

7. Gägea Salisb. Guldstjerne.

a. bulbi 2 tunica communi inclusi, quorum major solus radículas gerit.

α. folium radicale 1.

381. **G. l. minima Schult. (1331)** fol. florali ab umbella distante, fol. perigon. acutis. H. 1. 369. (Ornithogalum L.). Gracillima specierum. 5. 24. In loc. umbrosis. *Ved Ermelunds-huset! Ved Jægersborg paa Skraaningerne ned*

*imod Hundesøen! I Holsteinborg Have og Buske-
rode Skov Steenbuch!*

β. folia radicalia 2.

382. G. 2. *spathacea* Schult (612)
glabra, umbella 2-3flora a folio distante, fol.
perigon. obtusis. H. 1. 367 (*Ornithogalum*
Hayne). 5. 24. In sylvis humidis umbrosis. *Ved*
Ermelundshuset! I Ordrup Krat ved en Grøft ned
imod Mosen! ved Kjøge paa flere Steder.

383. G. 3. *arvensis* Schult (1869) pe-
dunc. foliisque perigonal. acutis pubescen-
tibus. H. 2. 167 (*Ornith. Pers.*). Fol. perig.
externa apice barbata. 4-5. 24. — *Paa Møen i*
Haver (!)

b. bulbus 1 solidus folium unicum emit-
tens.

384. G. 4. *lutea* Schult. (378) fol.
erecto lanceolato superne latiore, acuto, fol.
perig. obtusis, bulbo ovato. H. 1. 368 (*Orni-
thogalum* L.). Var. major et minor, fol. floral.
modo oppositis modo alternis. 4-5. 24. In sylvis,
ad sepes frequentissima. *Frederiksberg Have! Char-
lottenlund strax ved Indgangen!*

Obs. Inquirendum in G. stenopetalam Rchb.
(Ornith. Fries) quæ a ceteris diff. bulbis 3

*perpendicularibus distinctis fol. 1. gerentibus,
fol. per. obtusatis a medio curvatis.*

8. **Ornithógalum** L. Fuglemælk.

385. O. 1. umbellatum L. (1266) flor.
cymosis pedunc. fructif. patentibus, stamin.
simplicibus. H. 1. 369. 5. 24. *Paa Kjbhavns
og Kassellets Volde! Kirsebærgangen fra Bade-
husene til Vesterport.*

386. G. 2. nutans L. (912) flor. race-
mosis pendulis, stam. tridentibus alternis mi-
noribus. H. 1. 370. *Albucea nutans* Rehb.
4—5. 24. *Paa Kastelsvoldene! i Erberg Have!*

Obs. Utraque ab initio efferata.

9. **Állium** L. Lög.

A. Umbella capsulifera.

387. A. 1. ursinum L. (757) fol. pla-
nis elliptico-lanceolatis. H. 1. 364. Stam. eden-
tula, bulbus oblongus tunica solida. Fl. alb. —
5—6. 24. — *In sylvis umbrosis. I Dyrehaven ved
Stien fra Ordrups Mose til Klampenborg! Ved
Örholm, Bidstrupgaard H.*

B. Umbella bulbifera.

a. folia plana.

388. A. 2. scorodóprasum L. (290.
1455) fol. marg. ciliato-asperis, vaginis anci-

pitibus. H. 1. 362. Porrum Scorod. Rchb. Stam. exteriora dentata, fl. viol. — 6—7. 24. — In pascuis. Paa Kjöbenhavns og Kastellet's Volde, ved Kjöge, — Möen v. Stege Nor!

b. folia teretia v. semiteretia basi fistulosa.

389. A. 3. vineale L. (1870) fol. teret. fistulosis, stam. alternis tridentibus perigonium superantibus, spatha univalvi. H. 2. 162. (an etiam 1. 363. A. arenarium; fra Möen, Femmetofte?) Porrum arenarium Rchb. Fl. purpur. β ? viridiflorum (2227) humilior. 6—7. 24. — In agris, pascuis, aggeribus, littoribus. Udenfor Österport Kph.! Reersö Lbm.! Möen! β Strandbrædderne paa Möen. Kph.!

390. A. 4. oleraceum L. (1456) fol. semiteretibus, stam. edentulis perigonium æquantibus, spatha bivalvi. H. 1. 363. Codonoprasum olerac. Rchb. Fl. rosei striis intensioribus. 7. 24. In dumetis. Paa Strandklinerne im. Torbæk og Strandmøllen! Bakkerne ved Örholm! Kjöge.

10. **Anthéricum** L. Edderkopurt.

391. A. 1. ramosum L. (1157) scapo ramoso stylo recto. H. 1. 371. Fl. alb. 6—7.

24. In collinis sterilibus. *Ved Brede, Örholm! Sölleröd (!) Bidstrup.*

392. *A. 2. Liliágo* L. (616) scapo simplici stylo declinato. H. 1. 372. Fl. alb. 7. 24. In dumetis. *Imellem Bidstrupgaard og Roskilde H. Paa Bakker ved Fortunen H. Ved Jægerpriis Kamphövener!*

11. *Bérberis* L. *Berberis.*

393. *B. vulgaris* L. (904). H. 1. 397. *Baccæ rubræ, fol. obovata spinoso-dentata. 6. Ad sepes, sæpius inqvilina. Vild i Sjælland ved Tryggerød og i Odsherred Hornem.*

12. *Péplis* L. *Vandkryber.*

394. *P. Pórtula* L. (64) fol obovatis. H. 1. 399. Cor. pallide rubra, interdum nulla. — 7—8. ☉. In uliginosis. *Ved Rudersdal H.*

Ordo II. TRIGYNIA.

13. *Polygonum* L. *Pileurt.*

A. Spicæ interruptæ filiformes.

395. *P. l. Hydropíper* L. (1576) spicis pendulis, fol. lanceol. subundulatis, ochreis subglabris breviter ciliatis, perig. glanduloso-

punctato. H. I. 440. Car. magnæ opacæ trigonæ.
7-9. ☉. In locis humidis, glareosis.

Obs. Inquirendum *P. laxiflorum* Weihe
(*mite Schranck*); spicis pendulis ochreis hirsutis longe ciliatis, perig. non glanduloso, car. nitidis triquetris multo minoribus.

396. P. 2. minus Huds (2230) spicis erectiusculis fol. sublanceol. subplanis, ochreis strigosis longe ciliatis, perig. non glanduloso. H. I. 440. Cfr. Kröy. Tidsskr. I. 345. Var caule erecto et tota longitudine prostrato, viride et rubro tinctum, flor. albis et roseis, stam. 5 et 6. Caryops. nitidæ trigonæ. 7-9. ☉. In loc. humid. umbrosis, ruderatis apricis, frequens. *Nørrefællad! Dyreh. hinsides Klampenb. Raadvadsdam! Örholm!*

B. Spicæ densifloræ subcylindricæ.

a. hexandra.

397. P. 3. *Persicária* L. (702) spicis oblongis densifloris ochreis longe ciliatis, perigon. non glanduloso. H. I. 438. P. biforme Wahlenb. Caryopsides in eadem spica variant trigonæ et compressæ. Fol. lanceolata var. subtus incana. 7-9. ☉. In loc humidis, ruderatis frequens.

398. P. 4. *lapathifolium* L. (....) spicis oblongis densifloris, ochreis breve ciliatis perig. glanduloso-scabro. H. I. 439. Carr.

magnæ compressæ lateribus subconcavis. Caulis ad genicula interdum incrassatus et rubro-maculatus, fol. præcedentis. 7—9. ☉. Cum præcedente.

b. pentandrum.

399. P. 5. *amphibium* L. (282) repens spicis cylindricis densifloris, fol. oblongo-lanceolatis. H. I. 438. — α natans fol. natantibus longe petiolatis glabris. β . terrestre erectum fol. breve petiolatis angustioribus scabris. Hæ formæ ex ratione aquæ (plus minus profundioris v. exsiccatae) plus minus evolutæ occurrunt. Fl. rosei. 6—7. 24. — In paludibus, fossis, stagnis, locis exsiccatis.

14. *Rumex* L. Skræppe.

Obs. Hæ plantæ, ut *Chenopod. Atriplex*, etc., post anthesin maturitatem versus tute examinandæ, tunc lac. corollæ marcescentes augentur et formam descriptam obtinent. (*Valvulæ* (male) tunc dicuntur).

1. Flores dioeci. ACETÓSA.

400. R. 1. *Acetosella* L. (1161) valvulis ovatis nudis, calyce adpresso, fol. hastatis. H. I. 406. Panicula et sæpe tota planta rubra, stigm. albida rubra v. rarius flava. 5—7. 24. In arvis, ad vias, loc. arenos. turfosis.

401. R. 2. *Acetosa* L. (....) valv.

subcordatis graniferis, cal. revoluta, fol. sagittatis. H. I. 405. „Syre.“ 6—7. 24. In pratis, pascuis, agris.

II. Flores hermaphroditici. RUMEX.

A. Valvulæ graniferæ.

a fol. lineari-lanceol. (valv. utrinque bidententes.)

402. R. 3. maritimus L. (1208) valv. deltoideis longitudine dentium, verticillis superior. adproximatis. H. I. 404. Color herbæ flavescenti-viridis. 7—8. 24. In littoribus maritimis pratisque a mari remotis. *Bellevue! Flaskekroen! Lundehuset! Bagsværd!*

403. R. 4. palustris Sm (1873) valv. ovato-oblongis dentes superantibus, verticillis subdistantibus. H. I. 404. Engl. B. 1932. Priori simillimes. In loc. paludosis rarior. *Ved Kastelsgravene Pouls!*

b. fol. radicalia basi cordata.

α. valvulæ dentatæ.

404. R. 5. obtusifolius L. (1335) valv. ovato-acuminatis basi inciso-dentatis, fol. radic. cordato oblongis obtusissimis. H. I. 403 et 402? (R. acutus). R. cristatus Nolte hols! *Rehb. Cent. IV. 550. Variat puberulus et*

glaber, ramis plus minus adrectis, verticillis foliatis nudisque. 7—8. 24. Vulgatissimus in loc. ruderratis, cultis, ad sepes cet. *I Gröfterne ved Strandveien o. s. v.!*

405. *R. 6. pratensis* Mert. K. (tab. ined.) valv. ex basi quadrata inciso-dentata ovatis obtusis nervosis, fol. radic. cordato-oblongis acutis. H. 2. 173. (*R. cristatus* Wallr.). Rami adrecti densiflori; valvularum fabrica insignis species. 7—8. 24. In Jutlandia haud infreqvens floræ nostræ adhuc dubia civis. *I Gröften ved Veien nær Charlottenlund? Septbr. 1837!*

β. valv. edentulæ v. obsolete denticulatæ.

αα. valv. lineari-oblongæ.

406. *R. 7. Nemolápathum* Ehrh. (2229) valv. graniferis unica ceteris multo majore, ramis rectis adrectisque. H. 1. 400 Rchb. IV. 552. Gracilis, valv. exiguæ. Var. caule simplici, interdum purpureo tinctus. 7—8. 24. In sylvis humidis. *Charlottenlund! Strandmøllen!*

† *R. conglomeratus* Schreb. (2228) valv. granif. granis omn. æqualibus, ramis patentibus adscendentibus. Rchb. IV. 551. *Laa-land Kamph!* In flora nostra nondum inventus.

33. valv. ovatæ v. cordatæ.

407. R. 8. *crispus* L. (1334) valv. ovatis omn. graniferis, fol. lanceol. undulato-crispis acutis. H. I. 401. Granum unicum sæpe ceteris robustius. Panicula sæpius rubens. 7—8. 24. In loc. ruderatis, apricis et umbrosis.

408. R. 9. *maximus* Schreb. (tab. ined.) valv. ovato-triangularibus omn. granif., fol. radic. cordato oblongis, caule fistuloso. Sv. Bot. 161. 7—8 24, In locis aqvaticis, ad ripas. *I et Vandhul ved Paullinelyst v Helsingör! Steenberg!*

409. R. 10. *Hydrolápathum* Ehrh. (....) (valv. præcedentis) fol. oblongo-lanceolatis acuminatis subundulato-crenatis, caule solidido. H. I. 401. Hominem altus, præcedente simillimus, quocum sine dubio sæpe commutatur. 7—8. 24. In fossis, ad amnes frequens.

B. Valvulæ nudæ (non graniferæ.)

410. R. II. *domesticus* Hartm. (tab. ined.) valv. lato-cordatis subreniformibus obtusissimis obsolete denticulatis, fol. undulatis radicalibus ex basi subcordata lanceolato-oblongis, floral. lanceolatis. H. I. 401? Valvulis magnis subplicatis nervosis, interdum granulo uno

alterove instructis distinctus, 2-3pedalis, fol. gramineo-viridibus, rad. sterilibus iis Armoracæ rusticanae similibus. (Qvo pertineat R. domesticus Rehb. IV. 526, nescio, huc minime!) 7-8. 24. In loc. ruderratis apricis, ad pagos. *Amager! Bellevue! Helsingör!*

411. † R. 12. aquaticus L. (....) valvulis cordatis acuminatis, fol. planis cordatis acuminatis. H. I. 405 Rehb. IV. 553. 5-6pedalis. 7-8. 24. *Ved Helsingör funden af Mertens efter H. l. c. Mon forvexlet med R. maximus?*

15. Triglochin L. Trehage.

412. T. 1. palustre L. (490) stigm. 3. caps. 3. in fructum linearem collectis. H. I. 409. 6-7. 24. In pratis, uliginosis. *Ved Flaskekroen!*

413. T. 2. maritimum L. (306) stigm. 6, caps. 6 in fructum ovatum collectis. H. I. 409. 6-7. 24. In pratis maritimis frequentissimum. *Amager! Flaskekroen!*

16. Scheuchzeria L. Scheuchzerie.

414. S. palustris L. (76). H. I. 408. Fol. carnosa semiteretia, flor. racemosi viridi-flavi.

6-7. 24. In turfosis. *Lyngby Mose! og andre Moser omkr. Kjöbenhavn.*

Ordo III. POLYGYNIA.

17. *Alisma* L. Godtraad.

415. *A. l. ranunculoïdes* L. (122) florib. in umbellam simplicem v. proliferam dispositis, fol. trinerviis. H. I. 413. Fol. lanceolata, fl. magni albi v. rubelli. 7-8. 24. Ad ripas. *Ved Söborghuus, Tiissö (!) flere Steder i det sydl. og vestl. Sjælland.*

416. *A. 2. Plantágo* L. (561) florib. umbellatis, umbellis in paniculam divaricatam dispositis, fol. 5-7nerviis. H. I. 411. Fl. minores, albi. Varr. α lanceolatum humilius fol. lanceolatis 5nerviis. β cordifolium elatum fol. cordatis v. cordato-ovatis. 6-7. 24. In paludosis, loc. glareosis irrigatis, ad ripas, α) sjælden: ved Brædderne af *Tiissö Lbm!* β) almindelig!

Classis VII. HEPTANDRIA.

Ordo I. MONOGYNIA.

I. **Trientalis** L. Skovstjerne.

417. *T. europæa* L. (84). H. I. 414.
Fol. verticillata ovato-lanceolata, fl. albi. 6—24.
In sylvis, collinis frequens.

Classis VIII. OCTANDRIA.

Ordo I. MONOGYNIA.

1. **Calluna** Salisb. Lyng.

418. *C. vulgaris* Salisb. (677). H. I. 430 (*Erica* L) Fl. secunde racemosi lilacini, rar. albi, fol. quadriseriata sagittata. 7—8. 24. In loc. steril. arenos. *Bagsværd! Almindeligere i Nord-sjælland!*

2. **Erica** L. Klokkelyng.

419. *E. Tétralix* L. (81). H. I. 432.
Fl. umbellato-capitati carnei v. albi, fol. verticillata

linearia marg. ciliato revoluta. 7—9. 24. In turfosis. *Bagsværd! Nordsjælland! o. s. v.*

3. *Myrtillus*. Blaabær.

420. *M. l. sylvaticus* (974) fol. ovatis serratis, ramis angulatis, cor. globosa. H. I. 426 (*Vaccin. Myrtillus* L.) Fl. viridi-carneus, bacca globosa nigra caeruleo-pruinosa intus rubra. 5—6. 24. In collinis, sylv. umbrosis. *Bakkerne ved Fuursöen! o. s. v.*

421. *M. 2. uliginosus* (231) fol. obovatis integerrimis ramis teretibus, cor. ovata. H. I. 427. (*Vaccinium* L.) Fl. albidus, bacca ovata coerul. intus alba. 6—7. 24. In turfosis. *Bagsværd! Hirschholm (!) Helsingör (!) o. s. v.*

4. *Vaccinium* L. Tyttebær.

422. *V. vitis idæa* L. (40). H. I. 428. Fol. obovata marg. revoluta subtus punctata, fl. pall. rubri, bacca globosa rubra. 6—7. 24. In ericetis, turfosis. *Hirschholm, Birkerød, Helsingör (!) o. s. v.*

5. *Oxycoccus* Pers. Tranebær.

423. *O. palustris* P. (80). H. I. 429. Caul. repens filiformis, fol. sempervirentia ovata, fl. albidii basi apiceqve rosei, antheræ aurantiacæ, bacca ovata rosca. 6—8. 24. In turfosis, supra sphagna repens.

6. **Chamaenérium** Spach. Gederams.424. *Ch. angustifolium* Spach (289).

H. I. 419 (*Epilobium* L.) Fol. lanceolata sparsa, fl. racemosi lilacini speciosi. 7—8. 24. In pratis, agris, sylvis. *Nordsjælland: Frborg! Helsingör(!) Hyppig fra Kjøge til Vordingborg. Kph. Holsteinborg Stbuch.*

7. **Epilóbium** L. Dueurt.A. *Caulis teres (lineis elevatis nullis).*a. *stigma 4partitum.*

425 *E. l. hirsutum* L. (326) fol. amplectentibus subdecurrentibus lanceolato-oblongis cuspidatis, radice stolonifera. H. I. 421. Villosum rarius parce pilosum, cor. magnæ purpureæ rar. albæ. 6—7. 24. In paludosis, dumetis. *Amager! Strandklinerne im. Torbæk og Pæpirsmøllen!*

426. *E. 2. pubescens* Roth (347) fol. sessilibus lanceolatis acutis inferioribus breve petiolatis, stolonibus nullis. H. I. 422. Magis minus hirsutum, cor. plerumque parva, interdum major pæne præcedentis, rosea rar. alba. 6—7. 24. In paludosis, sæpe cum præcedente. *Amager! Strandklinerne!*

427. *E. 3. montanum* L. (922) fol. ovatis breve petiolatis, stol. nullis. H. I. 423. Fol. sup. alterna. Fl. ante anthesin nutantes, rosei. 7—9. 24. In collinis, sylvaticis subhumidis.

b. stigma clavatum.

428. *E. 4. palustre* L. (1574) fol. lanceolatis sessilibus, stolon. repentibus. H. I.

424. Cor. parva lilacina. 7—9. 24. In uliginosis.

B. Caulis lineis elevatis 2 v. 4 oppositis notatus.

429. *E. 5. tetragonum* L. (1029) fol. serratis lanceolatis a basi sensim acuminatis acutis intermediis basi foliacea decurrentibus inferior. subpetiolatis. H. I. 424. Var. glaberrimum et caule pubescente, ramosissimum et minus ramosum. 6—7. 24. In paludibus. *Amager!*

Obs. E. virgatum Fr. fol. remote denticulatis a basi rotundata sensim angustatis infer. ovato oblongis obtusis super. acuminatis acutis subsessilibus v. breve petiolatis, caule lineis 4 elevatis notato. In Jutlandia non rarum, i Sjæll. nondum inventum. *E. palustri* maxime adfines, cui fol. in basin adtenuata et caulis absque lineis elevatis.

430. *E. 6. róseum* Schreb (1815) fol. oblongis utrinque acutis inæqualiter serratis petiolatis. H. I. 423. Caulis lineis 2 elevatis decurrentibus, fl. rosei; *E. montano* maxime affine, formæ intermediæ ulterius observandæ. 7—9. 24. In loc. uligin., sylvaticis. *Kastelsgravene! Im. Torbæk og Strandmøllen! o. s. v.*

Oenòthera L. Natlys.

1. *O. biennis* L. (446). H. I. 418. Fol. ovato-lanceolata, fl. lutei. Ab initio profuga jam multis locis copiose spontanea occurrit. *Ved Kjøge (!) Holsteinborg (!)*

Acer L. Lön.

431. † *A. 1. pseudoplatannus* L. (1575) fol. palmato-5lobis crenato-serratis subtus opacis et ad angulos nervorum pubescentibus, racemis pendulis. stam. corollâ duplo longioribus. H. I. 435. Fl. viridi-flavi. 5. In sylvis. *Vild ved Herlufsholm efter H. Hyppig plantet.*

432. † *A. 2. platanoides* L. (....) fol. palmato-5lobis 3-5dentibus, dentib. adtenuato-cuspidatis utrinque glabris, corymbis erectis. H. I. 436. — 5. — In sylvis. *Angives som vild af R a f n.*

433. *A. 3. campestre* L. (1288) fol. palmato-5lobis lacin. integerrimis obtusis inter-

media 3loba, corymb. erectis, stam. corollam æquantibus. H. 1. 437. 5. *Dyrehaven im. Kilden og Klampenborg! Hypp. i Skovene ved Holstenborg, Borreby. Möen.*

Ordo II. TRIGYNIA.

6. **Centinódium** Rchb. Fugleknude.

434. **C. aviculare** (803). H. 1. 443. (*Polygonum* L.). Fol. lanceolata v. elliptica plana. α . prostratum fol. brevissimis. $\dagger$ β . littorale fol. latioribus crassiusculis tota planta compacta. γ . erectum brevifolium. δ . erectum latifolium. 7—9. $\odot$. Frequentissimum. α . ad vias. β . in littoribus (*Amager!*) γ et δ . in loc. cultis, hortis.

7. **Tiniària** Rchb. Skedeknæ.

435. **T. 1. Convólulus** (744) perig. lacin. 3 interior. post anthesin obtuse carinatis, caryops. opaca. H. 1. 445 (*Polygonum* L.). Caul. volub. 7—9. $\odot$. — Inter segetes, ad frutices.

436. **T. 2. dumetórum** (756) perig. lac. 3 interior. post anthesin membranaceo-

alatis. H. 1. 446 (Polyg. L.). Caul. insigniter volubilis. 8-9. ☉. — In dumetis, sepibus rarior. *Paa Buskene ved Gjærdet langs Charlottenlund næsten fra Konstantia til Indgangen! Ordrup, Humlebæk Kph. Hareskoven ved Ballerup H. Tidsvilde H. Kjøge Kph. Grusgraven i Skjelskjør Dyrehave Ehrenr. Petersværk H.*

Fagopyrum Moench. Boghvede.

1. *F. esculentum* Mueh. car. angulis integerrimis. ☉. H. 1. 444. (Polyg. Fagopyrum L.). Freqvens colitur et quasi spontaneum occurrit.

2. *F. tataricum*. caryops. angulis repando-dentatis. ☉. *Polygonum* L. Minus freqventer colitur.

Ordo III TETRAGYNIA.

8. Elatine L. Elatine.

437. *E. 1. Hydropiper* L. (156) fol. longe petiolatis, flor. subsessilibus 4petalis Sandris. H. 1. 448. Schkuhr Handb. t. 109 b. Sv. Bot. 597. 1. Sem. semicircularia rugosa, dilute flava! Fl. ros. Ob exiguitatem observatoris ocu-

lum facile fallit. 6—7. ☉. — Ad ripas lacuum, etiam sub aqua. *Damhussöen! Angives desuden fra Frdal og i den mellemste Fiskedam i Frueskov ved Bagsværd, fra hvilke Steder den ei er undersøgt.*

Obs. Inquirendæ: E. triandra Schkuhr. (Handb. t. 109 b.; Sv. Bot. 597. 2.) "fol. breve petiol., flor. sessil. 3petalis 3andris, semin. leviter arcuatis" Koch. E. hexandra DC. (ic. rar. gall. t. 43 f. 1.) "fol. breve petiol., flor. peduncul. 3petalis 6andris, semin. leviter arcuatis" K.

E. 2. Alsínástrum L. (2239) fol. verticillatis. H. 1. 449. — Specimen in lacu quodam (nunc forsan exsiccato) ad Fredriksberg lectum in hb. Schum. adservatur. Postea non inventa.

9. **Ádoxa** L. Desmerurt.

438. **A. moschatellina** L. (94). H. 1.

448. Fl. capitati vir. 4—5. 24. — In sylvis umbrosis, fruticetis.

10. **Pàris** L. Fűrblad.

439. **P. quadrifolia** L. (139). H. 1.

447. Fl. vir. anth. purpur., bacca nigra. Rarius occurrit fol. ternis (*Kyll*) quinis (*Kyll*) et senis! 5. 24. — In sylvis umbrosis frequens.

Classis IX. ENNEANDRIA.

Ordo I. HEXAGYNIA.

1. **Bütomus** L. Brudelys.440. *B. umbellatus* L. (604). H. 1.

451. Fl. rubri umbellati. 6—7. 24. Ad ripas lacuum, in fossis frequens.

Classis X. DECANDRIA.

Ordo I. MONOGYNIA.

1. **Andrómeda** L. Andromeda.441. *A. poliifolia* L. (54). H. 1. 461.

Fl. terminales subumbellati, fol. lineari-lanceolata marg. revoluta, cor. ovata carnea anth. fusca. 6—7.

☉. In turfosis sphagnosis. *Mosen bag Vintappergaarden! Tepri Mose (!) Ramlöse (!) o. s. v. I Mængde i Holmegaardsmosen*, ubi sine dubio olim pro *Ledo palustri* L. habita est. Hæc planta, cor. polypetala foliis subtus tomentosis diversa, vix floræ nostræ civis est nec fuit.

2. **Arctostaphylos** Spreng. Meelbær.442. *A. officinalis* Wimm. Grab (33).

H. 1. 462 (*Arbutus uva ursi* L.). Caul. prostratus, fl. paniculati carnei, fol. sempervir. subtus reticulato-venosa. 7. 24. In ericetis. Ved Tidsvilde H.

3. **Monótropa** L. Snylterod.

Obs. *Plantæ parasiticæ (racemifloræ) in radicibus arborum, utraqve species apud nos in sylvis frondosis. Fl. terminalis 10ander laterales 8andri.*

443. *M. 1. hirsuta* Hornem. (232) caps.

oblonga stylo filamentis petalis cauleqve inter flores hirsutis sepalis ciliatis interne hirsutis.

H. 1. 457 (*M. Hypopitys*) 2. 179. Rechb. Cent.

V. 674. Bögeskove ved Bagsværd (!) Dronninggaard (!) Möen (!) o. s. v.

444. *M. 2. glabra* Bernh. (2051) caps.

subglobosa floribus cauleqve glabris. H. 2.

179. *M. hypophegea* Wallr. Rechb. V. 675. —

Möens Klint tæt ved Dronningstolen Kamphöv. Aug. 1835!

4. **Pýrola** L. Vintergrön.A. *Caulis uniflorus.*445. *P. 1 uniflora* L. (8). H. 1. 466.

Cor. alba magna odorata. 7. 24. In pinetis. *I en Granskov ved Rudergaard Frisnette! Ved Rungsted Fru Pingel.*

B. Flores racemosi.

a. racemus secundus.

446. P. 2. secunda L. (402). H. 1. 465.

Cor. albida. 7—8. 24. In sylvis frondosis. *Frdals Skov! Möens Klinteskov!*

b. flores undiqve versi.

α. stylus rectus corollâ brevior.

447. P. 3. minor L. (55). H. 1. 461.

Cor. alba v. rosea. 6—7. 24. In sylvis frondosis frequens. *Frdal Skov! Gjelle Skov!*

β. stylus declinatus corollâ longior.

448. P. 4. chlorantha Sw. (1693) cal. lacin. ovatis acuminulatis adpressis corollâ qvater brevioribus. H. 1. 464. Cor. subglobosâ viridescens. 7. 24. In pinetis. *I en Granskov ved Bagsværd Vahl 1837!*

449. P. 5. rotundifolia L. (1816) cal. lacin. lanceolatis acuminatis apice recurvatis corollam dimidiam subæquantibus. H. 1. 463. Cor. alba patens. 6—7. 24. — In paludibus spongiosis. *Lyngby Mose!*

Ordo II. DIGYNIA.

5. **Scleranthus** L. Knavel.

450. S. 1. annuus L. (504) cal. lacin. acutiusculis margine membranaceo angustissimo cinctis fructiferis patulis. H. 1. 479. 5-6. ☉. In agris siccis, inter segetes.

451. S. 2. perennis L. (563) cal. lacin. obtusis margine lato membranaceo cinctis fructiferis clausis. H. 1. 479. 6-8. 24. — In collinis aridis minus frequens. *Brede Bakker.*

6. **Chrysosplénium** L. Milturt.

452. C. 1. oppositifolium L. (365) fol. oppositis. H. 1. 467. Virescens minus. 6-7. 24. In loc. irrigatis glareosis umbrosis raro. *Gisselsfeldt Hornem.*

453. C. 2. alternifolium L. (366) fol. alternis. H. 1. 467. Majus flavescens, fl. lut., numerus staminum valde varians. 4-5. 24. — In uliginosis sylvaticis frequens. *Ordrup Mose! Charlottenlund!*

7. **Saxifraga** L. Steenbræk.

A. Sep. reflexa pet. flava maculis croceis picta.

454. S. 1. *Hirculus* L. (200). H. 1. 472. Caul. superne tomentosus, fol. lanc. — 8—9. 24. In loc. ulig. limosis. *Ordrup Mose henimod Ermelundshuset (!)* *Langholmsmosen v. Dronninggaard. Jonstrup, Slangerup o. s. v. H.*

B. Sep. adrecta pet. alba v. rosea.

455. S. 2. *granulata* L. (514) fol. reniformibus lobatis, rad. granulata. H. 1. 473. Semipedalis. 5—6. 24. — In pratis et pascuis frequens.

456. S. 3. *tridaactylites* L. (1517) fol. obovato-spatulatis sæpius 3-5partitis, rad. fibrosa. H. 1. 476. 1-3poll. Variat simplex et ramosa, fol. (in specim. hum.) integris. 5. ☉. — In agris siccis. *Amager (!)* *Ved Ordrup paa en Mark foran Skovløberhuset!* *Ladegaardsvangen ved Erborg, Slangerup, Kjøge (!)* *Vallö. — Möen v. Lisenlund! Magleby!*

8. *Dianthus* L. Nellike.

A. Fl. capitati v. adgregati. ☉.

457. D. 1. *prólifer* L. (221) caule glabro, flor. capitatis involucretis. H. 1. 482. — Squamæ invol. pellucido-membranaceæ, cor. rubra. 7. — *Möen ved Ulfshale og Magleby (!)*

458. D. 2. *Arméria* L. (230) caule fo-

liisque pubescentibus, flor. fasciculatis. H. 1.
482. Cal. squamæ lanceolato-subulatæ hirsutæ, cor.
viol.-rubra. 7—8. In fruticetis. *Brede, Kjøge*
Aas (!) Præstø, Vordingborg o. s. v. — Møen!

B. Fl. solitarii v. paniculati. 4.

459. D. 3. deltoïdes L. (577) pet.
dentatis fauce nudis, cal. squamis subbinis.
H. 1. 483. Fl. solitarii rosei, caul. pubescenti-sca-
ber. β glaucus minor fol. brevior., colore magis
glaucos cor. dilutiore annulo purpureo. 7—8. In
pascuis, collibus. *Paa Høien hinsides Flaskekroen!*
i Dyrehaven ved det østlige Stakit! Søllerød (!)
Brede! β. Kjøge (!) Nestved (!)

460. D. 4. superbus L. (578) pet. multi-
fidis fauce barbatis cal. squamis qvaternis.
H. 1. 484. Solitarius, pet. roseo-lilacina basi pi-
lis purpur. barbata. β cæspitosus gracilior fol.
angustior., flor. albis. 7—8. — *Ved Flaskekroen!*
i Nærh. af Charlottenlund! Dyrehavsgjærdet tæt
ved Fortungaarden. Fredrikssund, Slangørup H.
Ved Kalnæs (Stranden ved Holsteinborg) Stbuch.
β. paa en Bakke bag Flaskekroen Poulsen!

9. *Gypsóphila* L. Gypsurt.

461. G. muralis L. (1268). H. 1. 480.
Herba 2-6poll. cor. pallide rubra. 7—8. ☉. *Kron-*
borg Mure (!) Paa en Ager lige for Hestkjøbs-

gaarden ved Birkerød Schum.! (senere ikke gjenfunden), *ved Kollekolle, Rudersdal H.*

Saponaria L. Sæbeurt.

1. *S. officinalis L. (543). H. 1. 481.*

Herba 1-2 ped. cor. pallide rubra v. alba. 7-8. 24.

*Ad pagos inqvilina. Paa Grøfterne ud for Sluk-
eften! Lyngby Kirkegaard! o. s. v.*

Ordo III. TRIGYNIA.

10. Silène L. Silene.

A. *Fl. paniculati.*

462. *S. 1. viscosa Pers (1209) panic.
verticillata cal. dentibus obtusis. H. 1. 487.
(Cucubalus L.). Cor. alba. 8. ☹. In littoribus.
Paa Oxholmen i Isefjord (!)*

463. *S. 2. nutans L. (242) panic. se-
cunda sub anthesi nutante, cal. lacin. acutis.
H. 1. 488. Pet. alba. 6-7. 24. In collinis, du-
metis. Charlottenlund (!) Brede; im. Torbæk og
Papirsmøllen! Møen ved Magleby! Lisenlund!*

B. *Fl. corymbosi.*

464. *S. 3. inflata Sm. (914) cal. in-
flato reticulato venoso pet. albis. H. 1. 485.*

(Cucub. Behen L.) Panic. terminalis dichotoma.
6—8. 24. In pascuis frequens.

+ S. 4. Arméria L. (559) cal. tubu-
loso-clavato 10strio pet. rubris. H. 1. 489.
Corymb. terminalis fasciculato-coarctatus. 7—8. ☉.
Hinc inde in hortorum rejectamentis. *Ecn Gang*
funden i Stubber ved Flaskekroen Hornem. Fred-
riksborg, Vallö Kyll.

11. *Stellaria* L. Fladstjerne.

Obs. Fl. generum 4 sequentium albi.

A. Bracteæ nullæ.

465. S. 1. media Vill. (525, 438) caule
tereti unifariam piloso fol. ovato-cordatis.
H. 1. 348 (*Alsine media* L.). Forma minor flor.
5andris, major fl. 10andris. ☉. Floret fere per
totum annum. In locis cultis, ruderatis frequen-
tissima.

466. S. 2. crassifolia Ehrh. (2114)
caule quadrangulo glabro, fol. ovato-lanceo-
latis. H. 1. 494. Caps. sepalis enerviis (v. obso-
lete 3nerviis) duplo longior, pedunc. deflorati de-
flexi. Plerumque prostrata, in pratis erecta. 7—8.
24. In uliginosis maritimis et pratis a mari remo-
tis. *Ved Clasens Have! Flaskekroen H. Ros-*
kilde (!), omkr. Kjöge Bugt (!)

B. Bracteæ.

a. scariosæ.

467. S. 3. uliginosa Murr. (....) caule diffuso fol. oblongo-lanceolatis, pedunc. axillar. trichotomis patentibus. H. 1. 491. Cor. exigua. 7—8. ☉. In loc. uliginosis. *Ermelundshuset, Balle-rup. Fuglevad Mølle o. s. v.*

468. S. 4. palustris Retz (2115) caule erecto fol. lineari-lanceolatis acutis, pedunc. subsolitariis demum patentissimis. H. 1. 493. (S. glauca With) Color plerumque glaucus, pet. calycem superant v. æquant. 7—8. 24. In pratis, turfosis frequens.

469. S. 5. graminea L. (2116) caule diffuso v. erecto fol. lanceolatis v. lineari-lanceol. acutis, panicula effusa pedunculis subpatentibus. H. 1. 492. Plerumque glaberrima! rarius folia basi bractæque ciliata. Duplex forma, parvi- et grandiflora, ut præcedentis. 7—8. 24. — In pratis, pascuis, fruticetis frequens.

b. bractæ herbacæ.

470. S. 6. holóstea L. (698) fol. sessil. lanceolatis acuminatis marg. carinæque scabris. H. 1. 591. 5—6. 24. In sylvis, fruticetis ad sepes frequens. *Charlottenlund o. s. v.*

471. *S. 7. némorum* L. (271) fol. caulin. petiolatis cordatis lævibus. H. 1. 491. 6—7. 24. In sylvis. *Charlottenlund! Ved Sorgenfri!*

12. *Alsine* L. Norel.

472. *A. 1. rubra* Wahlenb. (919. 2232) fol. utrinque planis mucronatis, sep. capsulam æquantibus, seminibus apteris. H. 1. 497 (*Alsinella* Sw.). Fl. rubri. 6—7. ☉. In loc. arenosis, agris siccis. *Paa Markerne N. for Lyngby Mose!*

473. *A. 2. marina* MK. (470. 2231) fol. subtus convexis v. teretibus muticis, sep. calyce brevioribus, semin. apteris et alatis. H. 1. 497 (*Alsinella* Sw.). Fl. pall. rubri, rar. albi. In pratis maritimis, loc. aqua salsa inundatis. *Vesterfælle! Hinsides Flaskekroen!*

13. *Haliánthus* Fries. Strandarve.

474. *H. peploides* Fr. (624). H. 1. 500 (*Arenaria* L.). Fol. carnosa fl. albi. 5—7. 24. In littoribus arenosis. *Bellevue! Vedbæk!*

14. *Arenária* L. Sandvaaner.

475. *A. 1. serpyllifolia* L. (977) fol. ovat. acumin. sessilibus, sep. corollam æquantibus capsulam superantibus, sem. sine ap-

pendicibus. H. 1. 502. Caul. erectus ramosus. 5—6. ☉. In loc. siccis, aggeribus.

476. A. 2. *trinervia* L. (429) fol. ovatis acutis breve petiolatis sep. corollam capsulamque superantibus, semin. appendiculatis. H. 1. 501. Caul. debilis. Var. glabra et pubescens. 5—6. ☉. In sylvis subhumidis. *Frberg Have!*

Ordo IV. PENTAGYNIA.

15. *Sedum* L. Steenurt.

A. Folia teretia, radix tenuis fibrosa.

a. flores albi.

† *S. album* L. (56). H. 1. 507. 7—9.

24. *Paa et Steengjærde ved Fredriksdal, forvildet, Kamph.!*

b. flores flavi.

α. fol. linearia.

† *S. reflexum* L. (1818) fol. linearisubulatis acutis breve mucronulatis basi productis subcalcaratis, ramorum steriliumpotentibus reflexisque. H. 1. 508. — Interdum occurrit in hortorum rejectamentis.

† *S. sexangulare* L. (1644) fol. line-

aribus obtusis basi deorsum apiculata sessilibus. H. 1. 506. In hortorum rejectamentis.

β. fol. ovata dorso gibba (basi obtusa).

477. S. 1. acre L. (1457). H. 1. 505.

6-6. 24. In aggeribus lapidosis, agris sterilibus, calcareis, frequentissimum.

B. Folia plana, radix valida carnosae tuberosa.

478. S. 2. lividum Bernh. (686) fol. sparsis obovato-cuneatis subpetiolatis, cyma laxa. H. 1. 504 (S. Teleph. purpur.). Fl. purpur. Cum specim. S. lividi ex horto berol. omnino convenit. "*Sjælden i Sjælland*" H. (1 Holsteen (S. Purpur.) Nolte!)

479. S. 3. maximum Sut. (2168) fol. oppositis ovali-oblongis basi cordata amplectentibus, cyma compacta. H. 1. 504 (S. Telephium). Rchb. ic. Cent. VIII. 969. Robustum, fl. viridi-flavi v. rubri, (cyma non semper tripartita). 7-9. 24. In collibus sylvaticis, arenosis, argillosis haud infrequens. *Ved og i Charlottenlund! o. s. v.*

Obs. Inquirendum S. *Telephium* L. (Rchb. 968) quod differt fol. sparsis numerosis ovato-oblongis basi obtusa sessilibus, cyma multo compactiore minore.

16. **Agrostemma** L. Klinte.480. *A. githágo* L. (576). H. 1. 511.

Cor. violaceo-rubra. 6—7. ☉. Inter segetes.

17. **Lychnis** L. Pragstjerne.A. *Viscària* Roehl. pet. indivisis, caps. semi-5locula.481. L. 1. *Viscària* L. (1032). H. 1.512. *Viscaria* vulg. Roehl. Caulis superne sub geniculis viscosus. 6—7. 24. In collinis aridis.

B. Pet. divisa, caps. 1locula.

a. *Coccygànthe* Rehb. hermaphrodita pet. 4fidis.482. L. 2. *flos cuculi* L. (591). H. 1.

512. Fl. rubri, rar. albi, pet. interdum nulla. — 6—8. 24. In pratis freqvens.

b. *Melándrium* Roehl. diœcæ pet. bifidis.483. L. 3. *pratensis* Rafn (*vespertina* Sibth.) (792) stylo glabro recto, dent. capsulæ ovato-conicæ rectis, fl. albis. H. 1.

514. Fl. svaveolentes vespere aperti. 6—7. 24. (☉?). In pratis siccis, pascuis.

484. L. 4. *sylvestris* Rafn (*diurna* Sibth.) (2169) stylo hirta apice spiraliter con-

voluto, dent. capsulæ subrotundo-ovatæ revolutis fl. purpureis. H. 1. 673. Fl. inodori diu aperti. 6—7. 24. In sylvis, fruticetis humidis.

18. **Maláchium** Fries. Klövkrone.

Obs. Fl. generum sequentium albi.

485. *M. aquaticum* Fr. (1337). H. 1. 520 (*Cerastium* L.). Cor. alba. 6—8. 24. — In loc. humidiusc. umbrosis. *Gröften i Lundehusmosen! Gröfterne om Strandveien! Ved Brædderne af Fuursö! o. s. v.*

19. **Cerástium** L. Hönsetarm.

A. Pet. calyce duplo longiora.

486. *C. 1. arvense* L. (626). H. 1. 518. Repens caul. sup. erectis, fol. lineari-lanceol. 5—6. 24. — In campis aridis, aggeribus apricis. *Paa Gröfterne strax udenfor Österport! o. s. v.*

B. Pet. calycem æquantia eove breviora.

a. sep. herbacea apice barbata.

487. *C. 2. glomeratum* Thuill (1921) fol. subrotundis ovalibusve pedicell. fructif. calycem æquantibus eove brevioribus. H. 1. 516 (*C. ovale* Pers) Richb. Cent. III. 385-86. (*C. vulgatum*). Paniculæ rami superiores ob brevitatem pedicellorum glomerulati. β glanduloso-viscosum. 5—7. $\odot$. In loc. ruderal. apricis et

umbrosis. Omkring Sandgraven v. Ordrup! Ved Gl. Frdal! ved Veien igj. Skoven im. Bagsværd og Johnstrup! Lundbygaard pr. Præstø! Möen (!) β . rarius: ved Bregentved Pouls!

488. *C. 3. brachypétalum* Desport. (....) fol. oblongis ovalibusve, pedicell. fructif. calyce duplo triplove longioribus. H. 1. 517. (*C. strigosum* Fr.) Rchb. III. 381-82. "In planta juvenili pili magis adpressi sunt, dein pili divergunt"! — Möen (!) — (Ikke ved Ordrup!)

b. sep. margine scariosa apice glabra.

489. *C. 4. triviale* Link (1645) fol. oblongo-lanceolatis, pet. sepala subæquantibus. H. 1. 515 (*C. vulgatum*) Rchb. III. 402-3. Vulgatissimum, maxime variabile. Formæ præcipuæ: α . vulgare caul. later. basi radicanibus, bract. conformibus, pedicell. fructif. calyce duplo longioribus. β . obscurum caul. radicanib., bract. omn. scariosis pedicellis fructif. calycem æquantibus v. parum superantibus. γ . gracilius caul. non radicanibus bract. inf. (plerumqve) herbaceis, pedicellis elongatis. δ . holosteoïdes Fr. caule bifariam piloso. (H. 1. 518. Rchb. III. 317-18.) — 5—7. ☉. — In pascuis siccis, agris, aggeribus α . frequentissimum. β . in aggeribus. Paa den gamle Kalkovn ved Flaskekroen! den nordre Grøft

i Lundehusmosen! γ. in aggeribus, pratis. Den
gl. Kalkovn ved Flaskekroen! δ. in littoribus. I
Sjæll. efter H.

490. C. 5. semidecandrum L. (1212)
fol. ovato-oblongis, sep. petala superantibus.
H. 1. 517. Rchb. II. 315-16. β glutinosum Fr.
(1211; H. I. 516 (viscosum) 2. 187. Rchb. III.
399-401.) distingvere non possum. 4-7. ⊙. — In
agris siccis frequens. β in turfosis; semper arena,
pappo Leontodontum etc. inquinatum. Ordrup
Mose! o. s. v.

20. Spèrgula L. Spergel.

491. S. arvensis L. (1033). H. 1. 520.
Glanduloso-pilosa, folior. fasciculi 2 oppositi in ver-
ticillum (spurium) expansi, fol. supra convexa infra
sulco percursa. 7-8. ⊙. In agris, arvis, arenosis,
inter segetes frequens.

Obs. S. pentandra L. (1940) diff. fol. sub-
teretibus subtus lævibus, sem. ala dilatata
striata cinctis.

21. Spèrgèlla Rchb. Femling.

492. † S. 1. subulata Rchb. (858) fol.
ciliatis, caule pedunculisque pilosiusculis, pet.
calycem æquantibus. H. 1. 523 (Spèrgula L.).
6-7. 24. Ved Flaskekroen efter H.

493. *S. 2. nodosa* Rchb. (96) glabra
pet. calycem superantibus. H. 1. 522. (*Sper-*
gula L.). 7—8. 24. In loc. turfosis, humidis.

22. *Sagina* L. Fiirling.

494. *S. 1. stricta* Fr. (2104) caule erecto
stricto ramoso, pedunc. defloratis erectis.
H. 1. 187; 2. 137 (*S. maritima* Don). 5—6. ☉.
In pratis marit. hieme inundatis. *Paa Sjællands*
og Møens Strandbrædder f. Ex. ved Flaskekroen!

495. *S. 2. procumbens* L. (2103) caule
procumbente, pedunc. defloratis apice recurvis.
H. 1. 187. Pet. minima v. nulla. 5—9. ☉. — In
agris, pascuis frequens.

Classis XI. DODECANDRIA.

Ordo I. MONOGYNIA.

1. *Lythrum* L. Kattehale.

496. *L. Salicaria* L. (671). H. 1. 528.
Fl. rub. verticillato-spic. Variabile, formæ primar.:
α. antiphyllum caule simplici quadrangulo, fol.

decussatis, verticillis adproximatis. Ff. secundar:
 aprica fol. subcoriac. angust.; umbrosa pallidior
 fol. tenuior., latior.; forma derivata: alternifolia.
 β. triphyllum caule ramoso hexagono fol. ternis
 verticillis remotis. Plus minus hirsutum; f. deriv.:
 sparsifolia. (γ. tetraphyllum caule (simpl. v.
 ram.) quadrangulo fol. qvaternis. Sparsifoliam hanc
 non vidi.) 7—8. 24. In paludibus, turfosis, fossis,
 ad ripas. (γ. rarior: *Ved Fredrikshavn!*)

Asarum L. Tveblad.

† 1. *A. europæum* L. (633). H. 1. 525.
 Fol. 2 renif., cal. fusc. extus pilosus. *Forhen i
 Rosenborg Have H.*

Ordo II. DIGYNIA.

2. **Agrimónia L. Agermaane.**

497. *A. Eupatória* L. (588). H. 1. 527.
 Fol. interrupte pinn., fl. spicati flavi. 7—8. 24. —
 In pratis siccis, collinis, dumetis frequens.

Ordo III. TRIGYNIA.

3. **Reséda L. Vau.**

498. *R. Lutéola* L. (864). H. 1. 528.
 Fol. lanceol., fl. spic. ochrol. 6—8. ☉. In campis,

collinis, ad vias haud infreqvens. *Im. Charlottenl. og Skovsh.! I Valdby! o. s. v.*

Ordo IV. DODECAGYNIA.

4. *Sempervivum* L. *Semperviv.*

499. *S. tectorum* L. (601). H. 1. 532.
Fol. rad. rosul. oblongo-obov. ciliata, pet. purp. —
7—8. 24. In tectis stramineis haud infreqvens.

Classis XII. ICOSANDRIA.

Ordo I. MONOGYNIA.

1. *Prunus* L. *Kræge.*

A. Drupa globosa, rami spinâ terminati.

500. *P. l. spinosa* L. (926) gemmis
floriferis 1floris, pedunc. glabris fructiferis
erectis ramulis pubescentibus. H. 1. 541. —
"Slaaen". 4—5. — In fruticetis. *Ved Lundehuset!*
Ordrup Krat!

501. P. 2. *insititia* L. (...) gemmis floriferis sub-2floris, pedunc. pubescentibus fructiferis nutantibus ramulis velutinis. H. 1.

510. 4—5. — In sepibus, dumetis. *Helsingör!*

B. Drupa oblonga, rami inermes.

P. *domestica* L. (539). H. 1. 539.

Gemmæ sub-2fl., pedunc. pubesc., ramuli glabri.

"Blomme" — 5. — In sepibus iuvilina, frequentius colitur. *Assistentkirkegaarden! "ved Bernstorfsveien ved de første Gaarde fra Lundehuset" Schum.*

2. *Cerasus* DC. Kirsebærtræ.

A. Flores racemosi.

502. C. 1. *Padus* DC. (205). H. 1. 535.

(*Prunus* L.) Rac. pendulus. fol. ellipt. serrata. —

5—6. — In fruticetis rarior. *I Gjærdet imod Indkjørselen til Dronninggaard Schum.*

B. Fl. umbellati.

503. C. 2. *avium* Munch. (1647) fol. sub-

tus pubescentibus, petiolo 2glandulo. H. 1.

538 (*Prunus* L.). — 5—6. — In sylvis rara. *I Dyrehaven ved Klampenborg; i Horns Herred H.*

C. *Caproniana* DC. (...) fol. glabris petiolo sine glandulis. H. 1. 536 (*Prunus Cera-*

sus L.) "Kirsebær". Freqventer colitur. „Ved Bernstorfsvæien hvor Teglovenn har været". Schum.

Ordo II. DI-PENTAGYNIA.

3. *Spiræa* L. Mjödurt.

504. S. 1. *filipéndula* L. (635) fol. (glabris) interrupte pinnatis foliol. oblongis pinnatifido-incisis lobis serratis. H. 1. 552. Alabastra rubicundi pet. alba. — 6—7. 24. — In pascuis, collinis. *Bag Flaskekroen! ved Brede! o. s. v.*

505. S. 2. *Ulmária* L. (547) fol. (subtus pilosis v. niveo-tomentosis) interrupte pinnatis foliol. ovatis indivisis terminali majore palmato-3—5-fido. H. 1. 553. Fl. albi minores. — 6—7. 24. — In pratis humidiusculis, umbrosis ubique.

S. salicifolia L. frutex. fl. rubris racemosis, freqventer colitur.

4. *Crataegus* L. Havtorn.

506. C. 1. *oxyacántha* L. (634) pedunc. glabris drupis ovalibus sub-2-pyrenis. H. 1. 545 (*Mespilus*). — 5—6. — In dumetis, serpi-
pibus.

507. *C. 2. monògyna* Jacqv. (1162) pedunc. villosis drupis subglobosis 1-pyrenis. H. 1. 547 (*Mespilus*). An sit vera species nescio, numerus styliorum vacillat.; directio styli ulterius observanda. — 5—6. — Ad sepes etc.

5. *Malus* Moench. Avl.

508. *M. sylvestris* Mnch. (1101). H. 1. 549 (*Pyrus Malus*). Spinosa, culta inermis, fol. petiolum duplo superant. — 5. — In sylvis, dumetis.

6. *Pyrus* L. Pæretræ.

509. *P. communis* L. (2118). H. 1. 548. Spinosa, culta inermis. Fol. longitudine petioli. — 5—5. — In sylvis rara. *Ved Ermelunds-
huset, Herlufsholm H. Ved Kjøge Kph.*

7. *Sorbus* L. Rön.

510. *S. 1. aucupária* L. (1034) fol. pinnatis. H. 1. 542. Fl. alb. baccæ rub. — 5—6. — In sylvis haud infrequens.

511. *S. 2. torminalis* Crtz. (798) fol. ovatis lobatis lobis inferioribus majoribus. H. 1. 551 (*Pyrus* L). Fl. a. baccæ rub. — 4—5. — In dumetis rarissima. *Möen ved Ulfshale (Expl. samlede af Kamphövener!)*

Ordo III. POLYGYNIA.

8. **Rosa** L. Rose*).

A. Aculei e basi complanato-compressa adunci conformes, fructus subcoriacei, (petala integerrima).

512. R. I. canina L. (555. 1695) foliis ellipticis v. ovatis incumbenti-serratis laevibus glabris v. pilosis (subtus numquam glandulosis) fruct. ovatis v. ellipticis. H. I. 556. Fl. pallidius v. intensius rubri. Frutex maxime variabilis: (α. nitida Fr. fol. glaberrimis nitidis subtus viridibus.) β. opaca Fr. fol. (magis acuminatis) glaberrimis opacis subtus pallidioribus glaucisve. γ. collina fol. ellipt. acutis, petiolis et venis paginæ inferioris v. tota superficie inf. pubescentibus. δ. dumetorum fol. ellipt. duplicato

*) Fructus Rosarum præcoces (tidligmodne) dixit cl. Fries, qui versus autumnum ante delapsum foliorum maturant; serotinos (sildigmodne) qui fol. dilabentibus et instante hieme primum maturant. Coriaceos (læderagtige) dixit fructus durissimos, subexsuccos, colore pallido sæpius distinctos; carnosos (kjödfulde) duros quidem, sed molliores et succosiores, colore coccineo; pulposos (grödede) molles, maturos inter digitos facile friabiles et inquinantes, colore intense sanguineo.

serratis utrinque villosis. — Variat præterea indumento fructus et pedunculorum, directione ramorum cet. — 7—8. Ad sepes, in dumetis cet. frequens. (α . nondum observavi;) β . frequentissima in umbrosis, γ et δ . haud infrequentes.

513. R. 2. inodóra Fr. (2233) fol. ovatis impari subcordato argute serratis (serraturis glanduliferis subpatentibus) subtus glandulosis, fruct. ovatis. — Foliolis majoribus glandulosis, serraturis magis patentibus, pedunculis fere semper trifido-umbellatis a præc., serraturis minus patentibus, fructu magis elongato, foliis inodoris a sequente differt. Formis intermediis cum utraque certe connectitur. — 7. — Ikke sjælden omkr. Kjöbenhavn. f. Ex. ved Rungsted!

514. R. 3. rubiginosa L. (870) foliis ovatis (impari basi rotundato) patenter duplicato-serratis subtus glanduloso-rubiginosis, fructu coriac. obovato-subrotundo. H. 1. 556. Fol. svave olentia. Var: α fol. subtus subglabris (quæ forma serraturis patentibus facile cognoscitur). β . fruct. calycibusque hispidis aculeatis. γ . pedunc. aculeatis et glanduloso-hispidis, fr. subgloboso glabro cal. glanduloso. δ . pedunc. acul. hisp., fr. oblongo glabro cal. glanduloso, cet. — 7—8. — Ad sepes, in collinis haud infrequens. Paa hiin Side Lunde-

huset paa venstre Haand af Ordrupsvein! Ved Gjentofte (β!) Ved Enden af Fuursöen henimod Möllen! Paa Strandbrædden forbi Rungsted! Hjulebækshuset im. Helsingör og Hellebæk! Ved Sorö Bredsd.

B. Aculei teretiusculi v. teretes subfalcatis v. recti minoribus gracilioribus intermixtis, fructus carnosus v. pulposus (petala denticulata, an in omnibus?)

515. R. 4. mollissima Willd (1458) acul. subfalcatis v. rectiusculis, fructibus erectis obovato-subglobosis pulposis petiolisque hispidis. H. 1. 555 (R. villosa). Foliola ovato-oblonga molliter pubescentia (glabrata nondum vidi, nec petala ciliata). — β R. mollis Sm. (Engl. bot. 2459.) minor acul. rectis fruct. multo minoribus globosis foliol. magis rotundatis minoribus. 7—8. — In sepibus haud infrequens. Frborg. Papiersmöllen o. s. v.

516. R. 5. pomifera Herm. (....) ac. rectis, fruct. cernuis globosis carnosus. H. 1. 555 (R. vill. pomifera). Fr. iis prioris multo majores, hispidi. β littoralis (præcedentis β analogæ) minor, fruct. fere duplo minoribus, glaberrimis! — 7—8. — In dumetis, sepibus. Ved Tidsvilde H. Helsingör: Een Busk ved höire Haand

af Veien fra Hyrdehytten til Godthaab! flere paa Veien ovenfor Meulenburg! — β paa Strandbrædderne f. Ex. ved gamle Kjögekro, paa Möen Kamphövener!

9. *Rubus* L. Klynger.

I. Herbæ.

517. R. 1. *Chamæmorus* L. (1) dioecus caule 1floro fol. cordato-reniformibus 5lobis. H. 1. 565. Fruct. fulvus. "Muldebær". 6—7. 24. In turfosis. Im. Örsholt og Gurre ved Helsingör; paa Tuerne ved Brædden af Gurre Sö. (Liebman!)

518. R. 2. *saxatilis* L. (134) hermaphroditus corymbo terminali 4-6floro fol. ternatis. H. 1. 564. Fr. ruber, putamen foveolato-rugosum! 6—7. 24. In sylvis. Krat paa Brede Bakker! Ved Birkeröd! Nöddebo Holt ved Esrum Sö(!) Gyrstinge Skov(!)

II. Frutices.

A. fructus rubri, caulis erectus fol. inf. pinnata.

519. R. 3. *idæus* L. (788). H. 1. 560. Fol. subtus albo-sericea, pet. parva obovato-cuneata alba, sep. patentia. "Hindbær". 5—6. In dumetis haud infrequens.

B. fructus nigri v. nigro-violacei, caul. arcuatus v. decumbens, fol. inf. quinata v. (in R. cæsius) omnia ternata.

a. caulis sterilis acutangulus aculeis conformibus instructus (ceterum glaber, pubescens, pilosus, villosusve).

520. R. 4. fruticosus L. (....) caule glabro acul. curvulis obsito, fol. quinatis foliolis acuminatis serratis terminali subcordato lateralibus oblongo-ovalibus, panic. corymbosa abbreviata. H. 1. 562 ex parte. Weihe et N. v. E. t. 1—4. Admodum variabilis: fol. planis et plicatis, subtus pubescentibus virentibus et tomentoso-candicantibus, corymbo plus minus composito, fl. alb. et ros. 6—7. In nemoribus maxime vulgata species.

521. R. 5. vulgaris Weihe (1163) caule sulcato-angulato acul. rectiusc. validis obsito, fol. quinatis foliolis ovatis acuminatis terminali cordato, panic. elongata thyrsoides. H. 1. 562 sub R. fruticoso. Weihe et N. ab E. t. 14. Pan. thyrsoides præsertim agnoscendus, fl. albi v. rosei. α . canescens caule glabro fol. lat. subsessil. subtus cano-pubescentibus, panic. ramis pubescentibus patentibus. β . pyramidalis caule sub-

glabro parce glanduloso acul. validis rectis, panic. tomentosa glandulosa contracta ramis subadpressis. γ ? concinnus caule atrosangu. piloso ac. validis rectis, fol. subtus niveo-tomentosis venis rubicundis ornatis, panic. glandulosæ ramis subpatentibus. R. fruticosus Wh. t. 7? — 6—7. — In sylvis præcedente rarior. Charlottenlund (!) γ . Ved Fredensborg og Esrum Sö Kph.!

522. R. 6. discolor Weihe (....) caule angulato piloso atropurpureo acul. validis rectis, fol. subcoriaceis rugosis ovato- v. cordato-orbicularibus acuminulatis subt. argenteis, panic. thyrsoidea patente. R. fruticosus Sm. Engl. Bot. 517. Fl. ros., fol. supra inter venas pilosa subtus piloso-argenteo-micantia, var: α . mollior caule moll. piloso non glanduloso, pan. paucifl. β . glandulosus robustior caule superne glandulif., pan. multifl. 6—7. In dumetis littoralibus etc. Ikke bemærket i det nordligere Sjæll.; paa Strandkliner: α . Hulemose Klint v. Vordingborg! β . Möen ved Ulfshale! Kamphöven!

b. caulis sterilis obtusangulus v. tertiuseculus aculeis multiformibus obsitus, pruinosis v. pilosis, villosus, glandulosus.

α . fol. omnia ternata fr. cæsiopruinosus.

523. *R. 7. cæsius* L. (1213) foliolis rhombeo-ovatis lateral. sessilibus, panic. pauciflora, pet. emarg. H. 1. 560. α . umbrosus gracilior caule glaberrimo pruinoso, fol. inciso-serratis subtus concoloribus. β . arvalis robustior totus farinoso-pruinosis, fol. duplic. serratis supra pubesc., subtus cano-tomentosis. 6—7. In sylvis, sepibus, ad margines viarum, agrorum frequens.

β . fol. inf. quinata, fr. niger non pruinosis.

524. *R. 8. corylifolius* Sm. (...) caule subobtusangulo acul. rectiusculis crebris aciculisque obsito, fol. rugosis cordato-orbicularibus acuminulatis lat. sessilibus, pan. subcorymbosa paucifl. H. 1. 562. Fol. iis *Coryli Avellanæ* simillima. — 6—8. — In sylvis, ad sepes haud frequens.

525. *R. 9. hirtus* W. Kit. (2053) caule subtereti acul. rectiusculis aciculis et pilis glanduliferis obsito, fol. subcoriaceis acuminatis lat. petiolatis oblongis terminali cordato, panic. ramis divaricatis. H. 2. 192. De determinatione incertus sum, sunt nempe fol. subtus cano-tomentosa, caulis minus horridus ac in planta germ. — An forma aciculosa *R. vulgaris*?

— 6—7. — In sylvis sine dubio specierum rarissima. *Frederiksdalskov Vahl!*

10. **Fragaria** L. Jordbær.

Obs. Formæ hujus generis adhuc observationibus egent.

526. F. 1. vesca L. (2235) cal. demum reflexo pilis pedunculorum adpressis. H. 1. 566. Fl. alb. fr. rubr. 5—6. 24. — In sylvis, collibus frequens.

F. 2. elatior Ehrh. cal. demum reflexo, pilis pedunc. patentissimis. — Hinc inde quasi spontanea occurrit. *Frederiksberg Have!*

527. F. 3. collina Ehrh. (1389) cal. fructui adpresso, pilis pedunc. adpressis. H. 1. 569. — 5—6. 24. — In collibus siccis, fruticosis. *Bidstrupgaard H. Prambroen i Stevnsherred Kph.!*
Korsör, Eriksholm H. Möen Kph.!

11. **Cómarum** L. Kragefod.

528. C. palustre L. (636). H. 1. 582. Fol. impari pinnata, pet. rub., sep. intus sanguifusca. — 6—7. 24. — In pratis humidis.

12. **Potentilla** L. Potentil.

A. Fol. pinnata.

529. P. 1. anserina L. (544) caule sar-

mentosum fol. interrupte pinnatis foliol. argute serratis. H. 1. 569. Fl. lut. solitarii. — 5—7. 24. In pascuis, ad vias frequens.

P. multifida L. caule adscendente fol. pinnatis foliol. pinnatifidis. H. 1. 571. Fl. lut. corymb. — *Paa en Høi ved Bidstrupgaard, forvildet ell. plantet.*

B. Fol. digitata, ternata v. quinata.

a. fl. albi, *carpidia pilosa*.

530. P. 2. *Fragaria* Sm. (1579). H. 1. 577. Caul. procumbens subbiflorus fol. ternata. 5—6. 24. — In sylvis. *I et Krat ved Nysø!*

b. fl. lutei *carpidia glabra*.

α. cal. 8sepalus cor. 4petala.

531. P. 3. *Tormentilla* Schrank (589) fol. ternatis radical. petiolatis foliol. obovatis, caulinis subsessil. foliol. lanceolatis. H. 1. 578 (*Tormentilla erecta* L.) Rhizoma crassum. Variabilis planta: α. prostrata caule minus ramoso fl. majoribus, fol. caul. breve petiolatis stip. integerr. (Torm. reptans Autt. plurr.) β. adscendens caule ramoso pedunc. capillaribus fl. minorib., fol. latior. breve petiolatis, stip. incisoserratis. (T. erecta Autt.) γ. erecta fol. latior. breve petiolatis, stip. incisis v. subintegerrimis. — 6—8. 24. In pratis, ericetis, sylvis frequentissima.

Obs. *P. procumbens* Grew. (1819) quæ differt fol. inf. quinatis (2: foliolis 2 exterioribus foliorum ternatorum fere usque ad basin partitis) caulinisque longe petiolatis e. s. p., apud nos quantum scio non est reperta. *Tormentilla reptans*. Autt.

β. cal. 10sepalus, cor. 5petala.

αα. caulis flagelliformis repens simplex.

532. *P. 4. reptans* L. (1164). H. 1.

574. Fol. omn. quinata (ut in *P. procumbente*) longe petiolata, ad geniculum singulum plura, pedunc. solitarii. — Forma 4petala (*Tormentilla reptans* L. ex synon. Moris.!) apud nos nondum observata.

ββ. caulis adscendens v. erectus, ramosus.

†. fol. omnia ternata.

533. *P. 5. norvegica* L. (171). H. 1.

574. Caul. erect. superne dichotomus, foliola oblongo-obovata lanceolataque grosse serrata. — 6—8.

☉. — In pratis, interdum inopinato frequenter procrecit. *I en sumpig Eng ved Bernstorf Schum!*
I de udtørrede smaa Søer im. Rudersdal og Hirschholm Hornem.

††. fol. rad quinata superiora ternata.

534. *P. 6. verna* L. (...) sericea pedunc. subsolitariis caule adscendente foliolis obovatis serratis. H. 1. 573. (excl. locis). 5—6. 24. — In collinis apricis, calcareis rara. *Brede Bakker?* H. l. c. sub *P. opaca*. — *Store Klint paa Møen tæt ved Dronningstolen!*

535. *P. 7. opaca* L. (1648) longe pilosa pedunc. subsolitariis caulib. prostratis demum adscendentibus, foliolis anguste cuneatis argute serratis. H. 1. 573 (excl. loc., additis locis *P. vernæ*). — 5—6. 24. — In collinis apricis, pascuis haud infrequens. *Paa Markerne udenfor Charlottenl. og paa Bakk. henimod Skhoved! I Charlottenl. til høire over Broen paa de smaa Brinker!*

536. *P. 8. argentea* L. (865) tomentosa caule adscendente erectove subcorymboso, foliolis cuneatis ad apicem serratis margine revolutis. H. 1. 571. Multum variat magnitudine, directione caulis, indumento et inde colore, e. s. p. 6—8. 24. — In graminosis siccis, loc. calcareis, *Byens Volde! Amager! o. s. v.*

13. *Geum* L. Nellikerod.

537. *G. 1. urbanum* L. (672) fl. erectis luteis pet. subrotundis, carpid. arista su-

pra medium geniculata articulo sup. basi pubesc. H. 1. 579. Sv. Bot. 91. — 6—8. 24. — In dumetis, loc. umbros.

538. †. G. 2. intermedium Ehrh. (1874) fl. nutantibus luteis, pet. obovatis breve cuneatis (carpid. præced.) H. 2. 19. — Indicatur i Charlottenlund, i Krattet ved Aaen forbi Sorgenfri (!) an specimina quæ vidi vere huic speciei pertineant, decidere non audeo; potius videntur individua majora G. urbani; cal. fructifer reflexus! lobi fol. caul. longius cuneati.

539. G. 3. rivale L. (722) fl. nutante rubro pet. obcordato-longe cuneatis, carp. arista medio geniculata, articulo sup. piloso. H. 1. 580. — 6—7. 24. — In pratis, pascuis, dumetis cet.

Classis XIII. POLYANDRIA.

Ordo I. MONOGYNIA.

1. **Chelidónium** L. Svalerod.

540. Ch. majus L. (542). H. 1. 588. Fol. lyrato-pinnatifida, fl. flavi umbell. β. laci-

nium Mill. (676. 2054) fol. profundius pinnatifidis, pet. inciso-crenatis, aliquid monstrosi habere videtur. 5—7. 24. — In umbrosis subhumidis, ad muros. β . rarius: *I Gröfterne udenf. Ö. Port! I Ordrup o. s. v.*

2. Papáver L. Valmue.

A. Caps. hispida.

541. P. 1. Argemone L. (867). H. 1. 590. — 5—7. ☉. — Inter segetes, in aggeribus, ad vias.

B. Caps. glabra.

542. P. 5. Rhoëas L. (1586) caps. basi rotundata, pilis caulinis patentibus. H. 1. 592. 6—7. ☉. — Inter segetes rarius. *I det sydlige og vestlige Sjæll. H. (!)*

543. P. 3. dubium L. (902) caps. in basin adtenuata, pilis caulinis adpressis. H. 1. 591. Frequens int. seg., ad vias.

† P. somniferum L. (H. 1. 593) glaberrimum caps. subglobosis, interdum invenitur in hortorum rejectamentis.

3. Actæa L. Druemunke.

544. A. spicata L. (498). H. 1. 587. Fl. albi racem., fol. ternato-duplicato-serrata, bac. nig. 5—6. 24. — In silvis.

4. **Helianthemum** DC. Solöie.

545. *H. vulgare* Gärtn. (101). H. 1.
 599 (*Cistus Helianth. L.*). Suffrutex fl. lut. 6—7.
 24. In collinis apricis. *Brede! Fuglevad Mölle!*
Bagsvær! Odsherred, im. Korsör og Tornborg o. s. v.

Tilia L. Lind.

546. *T. parvifolia* Ehrh. (553). H. 1.
 598 (*T. microphylla* Willd). Fol. glabra subt.
 glaucescentia (in axillis venarum barbata) caps.
 globosæ, fl. alb. 7. In sylvis rarior. *I Jonstrup*
Vang. Ved Kjöge. Magleholmen v. Korsör. Örmö
ved Holsteinborg Stbuch. Horns Herred. Möen
ved Ulfshale.

T. grandifolia Ehrh. (europæa H. 1.
 597) cui fol. subtus puberula (in axillis venarum
 barbata) caps. angulatæ, — in hortis, ambulacris
 vulgo plantatur.

6. **Nymphæa** L. Aakande.

547. *N. alba* L. (602). H. 1. 596. 7—8.
 24. In stagnis, fluviis.

7. **Nuphar** Sm. Nökkerose.

548. *N. luteum* Sm. (603). H. 1. 594
 (*Nymphæa L.*). 6—8. 24. — In stagnis, amnibus,
 fossis turfosis frequens.

Ordo II. DI-PENTAGYNIA.

8. **Delphinium** L. Ridderspore *).549. *D. Consólida* L. (683). H. 1. 600.

Caul. ramosus divaricatus, fl. coer. in racemo paucifloro. 6-7. ☉. — Inter segetes.

† *D. Ajacis* L. cui caul. strictus, racemus multiflorus, interdum in hortorum rejectamentis occurrit.9. **Aconitum** L. Stormhat.550. *A. Napéllus* L. (1698). H. 1. 601.(A. neomontanum); 2. 196. Fl. coer. Fol. palmato-partita. 7. 24. In uliginosis sylvaticis. *Ved Hesttangsmölle i Nærheden af Farum. Kyll. Nolte. Kamphöv. Paa Öerne i Sorö Sö. Ved Herlufsholm H.*

*) In familia Ranunculacearum partes floris hucusque varie et plerumque falso explicatæ sunt. In Ranunculo, Ficaria, Actæa fl. regulares completi; in Anemone, Pulsatilla, Hepatica, Thalictrum, Caltha petala nulla; corolla autorum est calyx (cujus partes sepala, Bægerblade); in Hepatica calyx autorum est involucrum flori adproximatum, corolla autt. est calyx. In ceteris generibus petala quidem adsunt sed diminuta et hebetata, quare nectaria dicta sunt; sunt ergo quæ in hoc libro petala voco, nectaria floristarum. Calyx in his semper corollinus est, et corollæ nomine insignitus.

Aquilégia L. Akkeleje.

A. 1. vulgaris L. (695). H. 1. 602. Fl. coer. v. viol. 7. 24. — In hortorum rejectamentis, aggeribus profuga.

Ordo III. POLYGYNIA.

10. **Ficària** Roth. Vorteroed.

551. F. ranunculoides Rth. (499). H. 1. 612 (Ranunculus ficaria L.). Fol. subrotundocordata subangulata, fl. flavi. 4—5. 24. — In loc. cultis, dumetis ubique.

Ranúnculus L. Ranunkel.

1. BATRÁCHIUM pet. albis ad ungvem flavum fovea nectarifera nuda prædita, carpid. immarginatis transverse rugosis.

552. R. 1. hederáceus L. (321) fol. omn. reniformibus 5lobis lobis integerrimis, caule repente. H. 1. 622. 5—9. 24. — In loc. limos., ad fontes.

553. R. 3. aqvátilis L. (....) fol. aut omn. setaceo-multifidis lacin. undiqve patentibus, aut superioribus natantibus reniformibus inciso-lobatis lobis inciso-crenatis. H. 1.

623. *Carpidia hispida*, glabriuscula v. glabra.
 α. *pantothrix* fol. natantibus 0 (Fl. D. 376. R.
 aqv. *peucedanifol.* Sch.). β. *quinquelobus* fol.
 nat. 5lobis. γ? *tripartitus* (1993) fol. nat. tri-
 partitis lacin. triangulari-obovatis saepe petiolulatis.
 H. 2. 201. δ. *phellandrifolius* Sch. fl. minimis,
 fol. omn. multif. laciniis brevibus irregulariter dire-
 ctis. — Variat ceterum magnopere magnitudine cet.
 6—7. 24. In aqvis stagnantibus frequens. γ. in lacu-
 nis aqua subsalsa repletis ad littus marinum. *Ved*
Fed, Lindersvold, Møen, paa Havstokken. Kphöv.!

554. R. 3. *circinnatus* Sibth. (2236)
 fol. omn. submersis conformibus setaceo-multi-
 fidis circumscriptione orbiculatis lacin. bre-
 vibus rigidis. H. 1. 623 (R. *pantothrix* capilla-
 ceus) R. aqvaf. orbiculatus Schum. *Carpidia*
hispida! (et *glabræ?*) — 6—7. 24. — In aqvis sta-
 gnantibus et fluitantibus. *I Stadsgravene! Lyngby*
Sö (!) I Bækken ved Fredriksdals Mølle! Kjøge
Aa (!)

555. R. 4. *fluitans* Lam. (....) fol.
 omn. submersis conformibus setaceo-multi-
 fidis lacin. elongatis subparallelis porrectis.
 H. 1. 623 (R. *pantothrix* ex parte.) *Carpidia gla-*
bra! (et *hispida?*), caulis flaccidus elongatus num-
 quam fol. natantia emittit. 6—7. 24. — In fluviis
 rapacibus, lacubus tranquillis.

II. *RANUNCULUS* pet. flavis ad ungrem fovea nectarifera squamâ tecta præditis, carp. marginatis (lævibus, tuberculatis v. muricatis).

A. Folia indivisa.

556. *R. 5. Flammula* L. (575) caule adscendente basi radicante fol. ellipticis lanceolatisve, carpid. apiculo brevi terminatis. H. 1. 610. Fig. fl. D. plantam plus solito erectam sistit. β . *R. reptans* L. (108) minor caule prostrato radicante inter articulos arcuato, fol. ovali-linear. H. 1. 611. An distincta species? — 6—8. 24. In loc. ulig. frequens. β . ad ripas glareosas lacuum rarior. *Paa Brædderne af Fuursøen! Ved Emdrup, Gisselsfeldt* H.

557. *R. 6. Lingva* L. (755) caule erecto stricto fol. elongato lanceolatis acuminatis, carpid. rostro lato ensiformi terminatis. H. 1. 611. Var. glaberrimus et strigulosus, fol. angustioribus et latioribus, integerrimis et denticulatis. 7—8. 24. — In ulig. rarior.

B. Fol. divisa v. lobata.

a. carpidia lævia.

aa. pedunculus lævis teres.

558. *R. 7. auricomus* L. (665) glaberrimus pedunculo sepalisque pubescentibus,

H. 1. 613. Pet. sæpe 0. 5—6. 24. In nemoribus umbrosis, pratis frequens.

559. R. 8. acris L. (....) hirsutus. H. 1. 620. 6—7. 24. In pratis, pascuis ubique.

bb. pedunculus sulcatus.

α. caulis basi bulbiformis, sepala reflexa.

560. R. 9. bulbosus L. (551). H. 1. 617. 5—7. 24. In pascuis frequens.

β. caulis basi æqualis, sepala adrecta.

561. R. 10. polyánthemos L. (1700) fol. rad. palmato-partitis lacin. 3fidis incis. medio sessili lacinulis sublinearibus stolonibus nullis. H. 1. 619. R. acri similis. — 7. 24. In sylvis rarior. *Imellem Assessor Bojes Gaard og Flaskekroen Kph.! Kjøge Aas Kph.!*

562. R. 11. repens L. (795) fol. rad. ternatis biternatisque foliolis trifidis incisodentatis, stolonibus repentibus. H. 1. 619. — 6—7. 24. — In locis cultis, ad vias, frequens.

b. carpidia rugulosa tuberculis muricibusve obsita.

aa. sepala reflexa.

α. glaber.

563. R. 12. sceleratus L. (571). H. 1.

613. Receptac. elongatum demum spicaforme. —
6-9. ☉. — In loc. ulig. limos.

β. hirsuti.

564. R. 13. parviflorus L. (1218) fol.
cordato-subrotundis 3fidis lobato-crenatis. H.
1. 622. Pedunc. oppositifolii. — 7. ☉. — Ved
Dorthcalyst. Hofman Bang. (Ikke paa Ama-
ger Kampf.!))

565. R. 14. Philonotis Ehrh. (1459)
fol. rad. ternatis biternatisque foliolis 3fidis
inciso-dentatis. H. 1. 618. Carpid. ante margi-
nem tuberculis notata. — 5-7. — ☉. — In loc.
subhum, pratis, ad fossas. Amager! I det øst-
lige og sydl. Sjælland og paa Møen hyppigere!

bb. sepala erecto-patula.

566. R. 15. arvensis L. (219). H. 1.
621. Fol. rad. 3fida dentata, carpid. muricata. —
5-6. ☉. — Inter segetes. Paa Møen i Mængde!
Begynder at udbrede sig i det sydlige Sjælland,
f. Ex. ved Præstø! I V. Sjælland paa Snedinge
Marker v. Holsteinb. Steenbuch! Jeg har seet
den im. Kjøge og Kjbh. ved Milepælen 3 Mil
fra Kh.!

12. **Thalictrum** L. Frøstjerne.

a. flores in apice ramorum dense con-
gesti, stamina erecta.

567. *Th. 1. flavum* L. (339). H. 1. 608. Caul. sulcatus, foliola obovato-cuneiformia 3fida sup. angustiora, fl. flavi: 7—8. 24. — In pratis, sylvaticis humidis. I denfor Nørreport paa en Grøft nær Ladegaarden! I Ordrup Mose. I Eggen af Kjøge og ved Kongens Möller (!) Ved Fiurendal, Rude (!)

Obs. Th. elatum H. 1. 609 quid sit, quum caule tereti nec sulcato describitur, nescio; *Th. elato* Jacq. quod sectioni sequenti pertinet, caulis sulcatus est. — Ceterum ex descript. cl. H. distinguitur foliolis ovato-cordatis, colore magis glauco, fl. erectis. "I Bogenæsskov ved Roskilde."

b. fl. subumbellati v. sparsi, stam. pendula.

568. *Th. 2. simplex* Jacqv. (244) foliolis oblongo-cuneatis sub-3fidis, auriculis superiorum ovato-oblongis acuminatis, caule subsimplici stricto. H. 1. 607 et 608 (*Th. simplex* et *Th. flavum* dubium Schum.). Fl. lutei, foliorum latitudo varia. — 7—8. 24. In locis sterilibus. Paa en Grøft bag Flaskekroen!

569. *Th. 3 minus* L. (732) foliolis obovato-cuneatis 3—5-dentibus, auriculis brevibus rotundatis, caule ramosissimo flexuoso. H. 1.

607. Variabile, intra fines tamen modo forma fol. subtus glaucis mihi occurrit. — 7—8. 24. — In littoribus arenosis. *Ved Stranden imellem Flaskekr. og Kjøge (!) Ved Helsingør (!) — Möen ved Ulfshale (!) Budsemark (!)*

13. **Anemone** L. Anemone.

570. A. 1. *ranunculoïdes* L. (140)

involucro flores superante brevissime petiolato, sepalis flavis extus pubescentibus. H. 1. 606. — 5. 24. — In nemoribus: *Frederiksberg Have! Charlottenlund ved Slottet!*

571. A. 2. *nemorosa* L. (549) involucro floribus brevior petiolis folium suum dimidium æquantibus, sepalis albis v. roseis utrinque glabris. H. 1. 603. — 4—5. 24. — In nemoribus pratisque frequentissima. *Lundchusmosen! Charlottenlund! Frberg Have!*

14. **Hepatica** DC. Simmer.

572. H. *triloba* DC. (610). H. 1. 602. Fl. pulcherrime azurei anth. albidæ, fol. triloba integerrima. — 4—5. 24. — In nemoribus umbrosis. *Charlottenlund ved Slottet! o. s. v.*

15. **Pulsatilla** Mill. Kobjælde.

573. P. 1. *vulgaris* Mill. (153) fl. erectiusculo sep. a medio reflexo-patentibus. H. 1.

601. Fl. viol.-coer. — 4—5. 24. — In pascuis rara.
*I Charlottenlund til høire over Broen, kun meget
 faa Expl.! ligesaa i Grøften udenfor Gjærdet!
 Ved Helsingør flere (!)*

574. P. 2 pratensis Mill. (611) fl.
 pendulo sep. apice revolutis. H. 1. 602. Fl.
 coerulesc. — 5—6. 24. — In collibus apricis. *Paa
 Brede Bakker! Ved Svanholm, Jægerspriis.*

16. **Tróllius** L. Engblomme.

575. T. europæus L. (133). H. 1. 624.
 Fol. 5partita lacin. 3fidis indivisis, fl. lut. odor. —
 5—6. 24. — In pratis. *Lundehusmosen! o. s. v.*

17. **Eránthis** Salisb. Vinterblomme.

576. E. hyemalis Salisb. (1391). H.
 1. 625. Fol. 1 radicale peltiforme, caul. aphyllus.
 invol. flori adpropinquatum, fl. lut. 1—2. 24. —
*I Skove ved Antvorskov H. Ved Fiurendal Jacob-
 sen!*

Helléborus L. Nyserod.

1. H. niger L. — Fl. viridis. 12—1—2.
 24. — In hortorum rejectamentis hic inde.

18. **Caltha** L. Kabbeleje.

577. C. palustris L. (668). H. 1. 626.
 Fol. cordato-orbicularia crenata, fl. lut. — 4—5.
 24. — In loc. ulig. ubique.

Classis XIV. DIDYNAMIA.

Ordo I. GYMNOSPERMIA.

1. *Mentha* L. Mynte.

Obs. Plantæ maxime variabiles indumento, foliorum forma, inflorescentia. Sexuales duæ formæ, altera genitalibus exsertis, altera inclusis — fere ut in *Pulmonariis* cet. — Nonnullæ species bene distinguuntur de floratæ, formâ calycis.

A. Flores in verticillis axillaribus v. simul capitati (non spicati), folia petiolata.

a. verticilli omnes remoti (non capitati).

578. M. 1. *arvensis* L. (512) cal. campanulato dentibus triangulari-ovatis abbreviatis.

H. I. 643. Rehb. X. 1299—1304. Var. in campestribus hirsutior, fol. latioribus, pedicellis calycibusque hispidis; in locis humidioribus pubescens v. glabriuscula, fol. angustioribus, verticillis rarius pilosis, e. s. p. Calycis forma constantissima. — 7—8. 24. — In agris, pratis ubique.

579. M. 2. *sativa* L. (794) cal. tubuloso-infundibulari dentibus triangulari-lanceolatis acuminatis. H. I. 640 (*M. hirsuta sativa*).

α. fol. ellipticis fere omn. aequalibus v. sursum paullo decrescentibus. verticillis pedunculatis. Simplex et ramosa, stolones 0, fol. inf. sæpe integerrima v. parce crenata subrotunda glabrata. β. pyramidata fol. lato-ellipt. eximie decrescentibus, verticillis (inferioribus remotissimis) sessilibus globosis. γ. fol. rugosioribus subcordatis obtusioribus fl. majoribus. Transitum in sequentem efficit. — 7—8. 24. — In pratis, ad fossas vulgarissima.

b. flores capitati simul pauci verticillati axillares.

580. *M. 2. aquatica* L. (638) cal. dentibus ex basi triangulari subulatis. H. 1. 640. (*M. hirsuta* et h. aqv.). Rehb. X. 1308—9. Fl. majusculi, fol. semper vidi ovato-cordata v. basi rotundata v. truncata, numquam elliptica, quæ forma tamen ab Exteris indicatur. Interdum gigantea evadit. — 7—8. 24. — Ad fossas, in pratis hand infreqvens.

B. Verticilli in spicam cylindricam dispositi, fol. sessilia.

581. *M. 4. sylvestris* L. (484, 1932). H. 1. 638.; 2. 203 (*M. nemorosa*). Bract. linearisubulata. Variat ratione indumenti (pubescens et canescens). — 7—8. 24. — In sylvis, ad fossas minus freqvens. Ved Fredensborg, Hirschholm H.

Elshóltzia Willd. Elsholtzie.

1. *E. cristata* Willd. H. 2. 207. Ex hortis profuga.

2. **Origanum** L. Merian.

582. *O. l. vulgare* L. (1581). H. 1.

657. *Cor. rubra*. — 7—9. 24. — In dumetis: *Fredriksdal Skov o. s. v.!* *Alm. i det sydl.!* og *vestl. (!)* *Sjælland. Møen ved Magleby! o s. v.*

3. **Galeópsis** L. Hanekro.

a. *caul. hispidus sub. genic. incrassatus, verticilli sup. subcontigui.*

583. *G. l. Tétrahit* L. (1271) *cor. tubo calycem subæqvante.* H. 1. 649. *Cor. purp. v. alba lab. inf. maculata.* — 7—8. ☉. — In rud-ratis, cultis, inter segetes frequens.

Obs. Sequentes spec. observationi commendo:

G. Tétrahit lacinia media labii inf. subquadrata plana crenulata obtusa v. leviter emarginata.

G. bifida Boenng, *lac. med. lab. inf. oblonga integerrima ap. emarginata serius margine revoluta.*

584. *G. 2. versicolor* Curt. (929) *cor. tubo calycem bis superante.* H. 1. 650 (*G. cannabin*). *Cor. sulph. lab. inf. violaceo- et citrine macul.* — 7—8. ☉. — Inter segetes.

b. caul. pubescens æqualis, verticilli sup. distincti.

585. *G. 3. Ladanum* L. (1757). H. 1.

649. Cor purp. albo-punct., galea crenata. 7—8.

⊙. — Inter segetes, in arvis et agris siccis.

4. *Betónica* L. *Betonie.*

586. † *B. stricta* Ait. (726). H. 1. 652.

(*B. officinalis*). — An floræ civis incertum. “*Ved Sophienberg i Siæll.*” H. (*Falster Kamp h.*!)

5. *Stachys* L. *Galtetand.*

A. Cal. fere corollæ longitudine. ⊙.

587. *S. 1. arvensis* L. (587). H. 1.

654. Fol. pet. ovato-cordata obtusa crenata, fl. purp. — 7—8. — In arvis minus frequens, *Im. Charlottenlund og Skovshoved (!) Ved Helsingør (!)*

B. Cor. calycem bis superans. 4.

588. *S. 2 palustris* L. (653) fol. c

cordata basi lanceolatis acutis inf. breve petiolatis sup. sessilibus semiamplectentibus. H. 1. 653. Fl. purp. — 7—8. — In loc. ulig., graminosis, siccis, inter segetes.

589. *S. 3. ambigua* Sm. (1877) fol. petiolatis e basi cordata lanceolatis acumi-

natis, caule fistuloso. H. 2. 206. Inter præced.
et seqv. media. *I en Grøft ved Veien fra Stranden
forbi Agershvile Blytt!*

590. S. 4. *sylvatica* L. (1102) fol.
petiolatis ovato-cordatis acuminatis. H. 1.
652. — 7—8. — In sylvis, fruticetis humidis.

6. **Nèpeta** L. Katteurt.

591. N. *catária* L. (580). H. 1. 637.
Fol. cordato-ovata serrato-crenata, fl. albi lab. inf.
punct. — 6—8. 24. In ruderatis, circa pagos haud
infrequens.

7. **Glechóma** L. Korsknop.

592. G. *hederáceum* L. (789). H. 1.
615. Repens fol. reniform. crenatis, fl. viol.-coer.
— 4—6. 24. — Ad sepes, in cultis frequentissimum.

8. **Lámium** L. Tvetand.

A. Fl. albi, fol. acuminata, 24.

593. L. 1. *album* L. (594). H. 1. 616.
5—6. — Ad sepes, in cultis frequens.

B. Fl. purpur., fol. obtusa v. apice rotun-
data. ☉.

a. fol. sup. petiolata.

594. L. 2. *incisum* Willd (....) fol.
inciso-crenatis superioribus subrhombeis, cor.

tubo intus nudo. H. 1. 647. Rehb. Cent. III. 370—71. — 5—6. ☉. In cultis, ad fossas viarum. *Ved Veiene til Charlottenlund! Lundehuset! Flaskekroen! o. s. v.*

595. L. 3. *purpureum* L. (523) fol. ovato-cordatis crenato-serratis cor. tubo intus piloso. H. 1. 647. Habitus pyramidalis. Cum præced. vulgatissimum.

b. fol. sup. amplexentia.

596. L. 4. *intermedium* Fries (1701 m. b.) cor. fauce dentata cal. dentibus patulis rigidiusculis. H. 1. 648. Rehb. VIII. 964! — Cum præcedentibus minus frequens. *Paa Landeveisgrøfterne ved St. Vibenshuus! o s. v.*

597. L. 5. *amplexicaule* L. (752) cor. fauce edentulo, cal. dentibus (ante et post anthesin) conniventibus pubescentibus mollibus. H. 1. 648. Rehb. III. 373. Fl. magni speciosi. β. *clandestinum* (Rehb. VIII. 950) planta vernalis, sæpe pusilla, corollam non aperiens. Ad vias, in ruderalis haud infrequens. β. *Ved Charlottenlund! Lyngby!*

9. *Galeobdolon* Huds. Barsvælg.

598. G. 1. *luteus* Huds (1272). H. 1.

651. 5—6. 24. In sylvis, dumetis. *Ved Helsingör Liebm.! I Syd- og Vest-Sjæll, hyppig!*

10. **Leonurus** L. Hjertespand.

599. L. Cardiaca L. (727). H. 1. 656.

Cor. purp. extus tomentosa. 7—8. 24. Ad sepes, muros, circa pagos frequens.

11. **Marrubium** L. Marrube.

600. M. vulgare L. (1036). H. 1. 655.

Albo-tomentosum, fol. ovata rugosa subtr. reticulata, fl. albi. 7—9. 24. In loc. ruderatis, glareosis, circa pagos frequens.

12. **Ballota** L. Tandbæger.

601. B. 1. foetida Lam. (673) cal. den-

tibus dilatato-rotundatis mucronatis. H. 1. 655.

Engl. B. 46 (B. nigra L.). Fl. purp. 7—8. 24. —

In loc. rud., ad pagos, sepes frequens.

602. B. 2. ruderalis Sw. (1702) cal.

dentibus æqualiter attenuatis subulato-aristatis.

H. 1. 655. B. nigra Schum. Ut speciem propriam

autoritate cl. Friesii propono, vivam non examinavi.

In ruderatis rarior. *Omkr. Kbhavn Sch.! Ved*

Fredriksværk Steenstrup!

13. **Thymus** L. Timian.

603. Th. 1. Serpyllum L. (1165)

caule undique piloso. H. 1. 659. Admodum va-

riat indumento (sæpe tomentoso) forma foliorum, inflorescentia (modo capitata modo subspicata) genitalium longitudine (ratione ei Mentharum analoga) cet. 7—8. 24. Vulgatissimus in loc. aridis, arenosis, ericetis.

604. *Th. 2. Chamædrys* Fr. (2237)

caule bifariam piloso Robustior fol. latior., obovatis; caulis ut præcedentis radicans! angulis pilosus, sed hi per paria adproximantur, unde bifariam pilosus caulis videtur. *I Dyrehaven forbi Klampenb. paa den tuede Slætte! Im. Fredriksdals Mølle og gl. Frdal paa Brinkerne! Ved Fredrikssund (!) I Sydsjæll. formod. almindeligere: ved Lundbygaard! paa Bakkerne ved Tiissö (!) Paa Kongsbjerget paa Møen!*

14. *Calamintha* Moench. *Kalaminthe.*

605. *C. Ácinos* Clairv. (814). H. 1. 660

(*Thymus*). Fol. ovata serrata, cor. viol. 8—8. ☉. In agr. arenos. et cretac. *Im. Ordrup og Bernstorf H. Paa en Bakke ved Leerbæksgaarden nær Roskilde (!) I S. og V. Sjæll. (!) og paa Møen (!)*

15. *Clinopodium* L. *Krandsbörste.*

606. *C. vulgare* L. (930). H. 1. 657.

Fol. ovata, fl. purp. 7—8. 24. In sylvis, fruticetis. *Im. Torbæk og Papirsmøllen paa Klinterne! Frdals Skov! Hyppigere sydlig.*

16. **Prunella** L. Prunelle.

607. *P. vulgaris* L. (910). H. 1. 663.
 Cal. lab. sup. truncatum dentibus 3 distantibus,
 cor. viol. 7—8. 24. In pratis, sylvis frequens.

17. **Ájuga** L. Læbelös.

608. *A. 1. reptans* L. (925) pilosa
 v. glabriuscula stolonibus reptantibus. H. 1.
 635. Cor. coer., rar. purp. v. alba. In collibus
 siccis interdum stolones amittit. — 5—6. 24. — In
 pratis sylvaticis. *Frberg Have! Frdal! Alminde-*
ligere i S. Sjøll.!

609. *A. 2. pyramidalis* L. (185) py-
 ramidali-quadrate strigoso-hirta, stolonibus 0.
 H. 1. 633. Cor. coer. 6—7. ☉. — In loc. siccis,
 ericetis. *Im. Örsholt og Gurre(!) Ved Jonstrup*
H., paa Hjörlande Mark ved Slangstrup H. Fra
Sydsj. intet Vorested bekjendt.

18. **Teucrium** L. Kortlæbe.

610. *T. Scórdium* L. (593). H. 1. 636.
 Fol. oblongo-lanc. grosse dentata, cor. pall. rubra.
 7—8. 24. *I en Grøft bag Flaskekroen! i Kirke-*
skoven i Stevnsherred, i Æskemosen ved Vordingb.
H., ved Nestved (!) Herlufsholm H. Holstein-
borg (!) o. s. v.

19. **Scutellária** L. Skjolddrager.

611. *S. gallericulata* L. (637). H. 1.
 661. Cor. viol.-coer. α . fol. e basi truncata oblongo-lanceolatis sup. acutiusculis dente basilari majore patente subhastatis. Subinde pro *S. hastifolia* venditur. β . fol. ex basi cordata oblongo-ovatis v. lanceolatis obtusissime crenatis. 7—9. 24. In sylvis humidis, ad ripas frequens.

20. **Verbéna** L. Jernurt.

612. *V. officinalis* L. (628). H. 1.
 638. Fol. ovato-oblonga pinnatifido-lacin. 7—8. 24. — Circa pagos infrequens.

Ordo II. **ANGIOSPERMIA.**21. **Melámpyrum** L. Koföde.

A. Fl. undique versi.

613. *M. 1. cristatum* L. (1104) spica quadrangula bracteis cordatis pectinato-dentatis. H. 1. 667. Cor. pall. rub. ad faucem flava. 7—8. ☉. In pratis, sylvis. Ved Brede, Slangstrup, Odsherred, Strandskoven ved Kjøge (!)

614. *M. 2. arvense* L. (911) spica conica laxa, bracteis lanceolatis acuminatis pinnato-dentatis. H. 1. 668. Cor. ros. ad fauc. fl.

bract. purp. 7. ☉. In agris, inter segetes rarior.
Syd-Sjæll. (!) Recrsø (!) Møen (!)

B. Flores secundi.

615. M. 3. nemorosum L. (305) cal.
 lanatis corollam dimidiam subæquantibus, bract.
 sup. cordatis dentatis. H. 1. 669. Cor. croc.
 tubo aurant., bract. viol. 7-8. ☉. In fruticetis.
Paa Brede Bakker! Imellem Hirschholm og Nivaa!
Kjöge Aas (!) Roskilde (!) o. s. v.

616. M. 4. pratense L. (....) cal.
 glabris corollâ triplo minoribus, bract. lance-
 olatis. H. 1. 669. Cor. flava v. alba limbo fl. —
 7-8. ☉. In sylvis sterilibus, ericetis frequens.

22. **Alectorólophus** Hall. Skjaller.

A. Sem. alato-marginata.

617. A. 1. minor Rehb. (....) cor.
 tubo recto dentibus galeæ abbreviatis pistillo
 incluso, spica pauciflora bract. acute dentatis.
 H. 1. 665 (Rhinanthus crista galli var. parviflorus),
 666 (Rh. minor Ehrh.) Rehb. ic. Cent. VIII. 973.
 974. Dentes galeæ concolores, rarius coloratæ, cau-
 lis immaculatus, sæpe etiam maculatus. 5-8. ☉.
 In pratis editis, sylvaticis, collibus. *Paa Bakken*
im. Ordrup Mose og Dyrhaven (!) o. s. v. Meget
alm. i S. Sjæll. og paa Møen!

618. A. 2. major Rchb. (981) cor. tubo curvatulo dentibus galeæ elongatis pistillo exserto, spica floribus pluriserialibus, bract. cuspidato-dentatis. H. I. 665 (Rh. crista galli) Rchb. VIII. 975. Dent. galeæ coloratæ, rarius concolores, cal. glabri vel pubescentes. 5—8. ☉. In pratis frequens. *Lundehusmosen!*

B. Semina aptera.

619. A. 3. *Reichenbachii* (....). Rchb. ic. VIII. 976 opt.! Robustior et serius florens præcedente cum quo ceterum omnes notas communes habet præter semina vere aptera! Variat ut is cal. glabro et (rarius!) pubescente (villosum in nostris non vidi), quare nomina illa "hirsutus, villosus" cet. expungenda. Cl. Reichenbachius plantam nostram primus et fere, unicus rite distinxit. 7—8. ☉. — Inter segetes, in agris sterilibus.

23. *Euphrasia* L. Öientröst.

620. E. 1. gracilis (....) cor. tubo labium inferius superante, fol. ovali-lanceolatis crenatis crenis laciniisque calycinis acutis. Drejer in Krøy. Tidsskr. I. 230. Stricta, gracilis, colore vario. 7—8. ☉. In ericetis. *Ved Ramlöse. Liebm.! Vahl!*

621. E. 2. officinalis L. (1037) cor. labio inf. tubum superante, fol. ovato-cordatis

crenatis, crenis superiorum laciniisque calycinis cuspidatis. H. 1. 667. Drej. l. c. 231. Admodum variat. 7—8. ☉. — In pratis, pascuis sterilibus et fertilioribus, sylvis, ericetis, arenosis frequentissima.

24. **Odontites.** Hall.

622. † O. 1. verna Rchb. (...) fol. e basi latiore adtenuatis lanceolatis, (bract. florem superantibus?). Fl. purp., fol. crassiuscula. 6—7. ☉. *Paa en Eng paa Reersø? Steenberg!* (Specimina haud satis completa examinavi.)

623. O. 2. serótina L. (625) fol. lanceolatis acuminatis basin versus subadtenuatis (bract. flore breviorib.?). H. 1. 664 (Bartschia odontites). Cor. pallidius rubra. 7—9. ☉. — In agris, pratis, inter segetes.

25. **Pedicularis** L. Troidurt.

624. P. 1. sylvatica L. (225) caulibus pluribus simplicibus, medio erecto lateralibus procumbentibus. H. 1. 672. Cor. purp. 6—8. 4. — In pratis, turfosis ravior. *Ved Bagsværd!*

625. P. 2. palustris L. (2055) caule solitario erecto a basi ramoso. H. 1. 669. Cor. carn. 7. ☉. In pratis spongiosis frequens. *Lundehusmosen!*

26. **Linaria** L. Torskemund.

A. Fl. axillares. ☉.

626. L. 1. *Elatine* Mill (426) caule prostrato hirsuto, fol. hastatis glabris. H. 1. 678. Cor. lab. sup. viol.; inf. sulphur. 7—9. — In agris siccis, inter segetes. *Forhen ved Flaskekroen (!)* *Bröndshöi, Stevns (!)*

627. L. 2. *minor* Desf. (502) glanduloso-pilosa, caule erecto ramoso, fol. lanceolatis obtusis. H. 1. 680 (*Antirrhinum* L.). Cor. viol. lab. ochrol. 7—9. Cum præcedente. *Flaskekroen (!)* *Stevns (!)* *Faxö (!)*

B. Fl. racemosi terminales. 4.

628. L. 3. *vulgaris* Mill (982). H. 1. 679 (*Ant. Lin. L.*). Glabra fol. sparsa lineari-lanceol., cor. flava. *Peloria* cor. regul. calcar. 5. — 7—8. In agris et arvis frequens. (*Peloria ved Bröndshöi H.*)

27. **Antirrhinum** L. Lövemule.

629. A. *Oróntium* L. (941). H. 1. 680. Fol. lanceol., cal. lacinie corollæ purp. longiores. 7—8. ☉. Inter segetes. *Forhen ved Flaskekroen (!)* *Stevns (!)*

28. **Digitalis** L. Fingerbölle.

630. D. *purpurea* L. (74). H. 1. 683.

Fl. racem., viol., fol. ovato-oblonga. 7—8. ☉. —
Paa Öerne i Gurre Sö vild efter Liebman. For-
vildet ved Haver flere Steder!

29. *Scrophularia* L. Brunrod.

A. *Glabra*, fl. paniculati terminales fusci. 4.

631. S. 1. *nodosa* L. (1167) fol. acutis cordatis, caule tetragono. H. 1. 681. — 7—8. —
 In sylvis, ad sepes.

632. S. 2. *aquatica* L. (507) fol. ovato-lanceolatis obtusiusculis, petiolis cauleque alatis. H. 1. 682. 7—8. Ad fossas rarior. *Ved*
Clasens Have! Skjelskjör, Nestved, Præstø!

B. *Pubescens*, fl. axillares viridi-flavi. ☉.

633. S. 3. *vernalis* L. (411). H. 1. 682. 5—6. — In dumetis humidis, ad sepes rarior.
Frsberg Have ved Gröften til Venstre fra Ind-
gangen! Sorö ved et Gærde udenfor Byen; Ros-
kilde v. et Gærde im. Byen og St. Ibs Kirke.

30. *Limosella* L. Dyndurt.

634. L. 1. *aquatica* L. (69). H. 1. 684. Cor. pall. ros. — 6—9. ☉. — In loc. exsiccatis.
Bröndshöi, Gladsaxe, Kollekölle.

31. *Lathræa* L. Skjælrod.635. *L. squamaria* L. (136). H. 1. 670.

5—6. 24. *Charlottenlund! ved Jægersborg paa Siderne af Bakken ned imod Söen, begge Sider af Veien! Dyrehaven ved Stien fra Klampenborg til Ordrup Mose!*

32. *Orobánche* L. Gyelqvæler.636. *O. elatior* Sut. (1338). H. 1. 685.

Fl. pall. rub. — Plures species sub hoc nomine in flora nostra latere nullus dubito; specimina mea ex 3 locis diversa sunt, quæ autem, quum vivas plantas nondum examinavi, ad species suas referre non potui. Vivam examinanti conferendæ sunt icones cl. Reichenbachii (Ic. bot. Cent. VII. fgg. 876—938) et descriptiones cl. Kochii (Deutschl. Fl. IV. et Synops. fl. germ. et helv. p. 533 sqv.). Notandum quoque quarum plantarum radices inhabitet. 7—8. 24. — *Paa Bakkerne im-Bröndshöi og Söborghus(!) [in Centaurea Jacea]; paa de med Krat bevorte smaae Höie i Nærh. af Bidstrupg.(!) [in ?]. Paa aabne Pladser i Alindelille Fredskov Vahl! Liebm. [in ? — non Cent. Jac.!] paa en Mark "Borren" og paa Klinten ved Jordbroen ved Borreby Ehrenr. [in Cent. Scabiosa].*

Class. XV. TETRADYNAMIA*).

Obs. *Cruciferis conferendæ icones nitidissimæ
fidissimæque cl. Reichenbachii in Cent. XII.
sive Iconographia floræ germanicæ.*

Ordo I. SILICULOSA.

1. **Cakile** L. Strandvaaner.

637. *C. maritima* Scop (1168). H. 1.

*) *Seminibus Cruciferarum nullus est albumen, embryo solus nucleum efficit. Embryo est aut lomatorhizeus, Rchb. randrodet (pleuro-rhizeus DC.) cotyledonibus (Kjærnestykkerne Bredsd.) planis radiculâ rimæ earum adpressâ (Rodspidsen trykket ind til Ridsen imellem Kjærnest. Bredsd.; cotyledones adcumbentes DC.); notorhizeus DC. et Rchb. rygrodet, cotyledonibus planis radicula plano earum adpressa (Rodspidsen trykket ind til Ryggen af det ene Kjærnestykke Br., cotyl. planæ incumbentes DC.); aut ptychorhizeus Rchb. foldrodet (orthoploceus DC.) cotyledonibus complicatis radiculam in plica sub recipientibus. (Kjærnestykkerne sammenlagte, Rodspidsen inde-sluttet i Folden Br.) — Bunias cotyledones flexuosas habet. [spirolobeæ DC.]*

Signis sequentibus figuræ embryonis transverse secti fere exprimuntur, (quare in conspectu generam iis usus cum):

0< = lomatorhizeus

0() = notorhizeus

0>> = ptychorhizeus.

709. Fol. dentato-pinnatifida carnos. — 7—9. ☉.
— In littoribus arenosis.

Búnias L. Takkeklap.

1. *B. orientalis* L. (1651). H. 1. 710.
Fol. inf. runcinato-lyrata sup. lanceolata. — 7—8.
24. Udenfor Nørre og ÖsterPort, forvildet!

2. Crambe L. Klöftnaal.

638. *C. maritima* L. (316). H. 1. 710.
Fol. glauca subrotunda sinnata undulato-dentata.
— 6—7. 24. — In littore. *Helsingör ved Lappesteens Batteri (!) i Odsherred; paa Reersö (!) ved Jungshoved! Möen.*

Teesdália R. Br. Flipkrave.

639. *T. nudicaulis* R. Br. (323). H. 1. 707. (*Iberis* L.). Fol. rosulata pinnatifida, caul. nudi, fl. corymbosi albi. 5—6. ☉. — In agris siccis. *Paa Markerne im. Charlottenl. og Stranden! I Charl. paa Marken ved Naaletærerne! o. s. v.*

4. Thlaspi L. Pengeurt.

640. *Th. arvense* L. (793). H. 1. 701.
Glaberrimum, fol. caul. oblonga basi sagittata sessilia, fl. albi. 5—7. ☉. — Inter segetes frequens.

5. **Senebiéra** Poir. Raynesfod.641. *S. Coronopus* Poir. (202). H. 1.

707. (*Coronopus Ruellii* Gärtn.) Procumbens, fol. pinnatifida, fl. albi, silicula margine muricata. — 6—8. ☉. — In loc. ruderatis. *Tømmerpladserne paa Kristianshavn, især Holms Plads (!) Amager (!)*

6. **Lepidium** L. Karse.A. *Silicula alata.*642. L. 1. *campestre* RBr. (1221) fol.

cano-pubescentibus radic. oblongis petiolatis cauliu. sagittatis denticulatis. H. 1. 701 (*Thlaspi* L.). Caulis simplex v. ramosus, fl. albi. 6—7. ☉. In agris, arvis siccis.

† L. *sativum* L. (1761) "Karse" glabrum, fol. multipartitis. Hinc inde in ruderatis ex hortis profuga.

B. *Silicula aptera v. apice tantum alata.*

643. L. 2. *ruderales* L. (184) diandrum apetalum fol. inf. petiolatis pinnatis sup. linearibus integerrimis. H. 1. 100. Foetidum, ramosissimum, $\frac{1}{2}$ ped. 6—7. ☉. — In ruderatis. *Amager! Udenfor Nørreport!*

644. L. 3. *latifolium* L. (557) tetradynamum fol. indivisis ovato-lanceolatis. H. 1. 699. 2-3 ped., fl. alb. silic. pubescens. 7—8. 2.

Ad littora, fossas. *Paa Tømmerpladserne. Grøfter paa Amager! Ved Tappenøie (!)*

7. **Capsella** Medikus. Hyrdetaske.

645. *C. bursa pastoris* Mneh. (729). H. 1. 702. (*Thlaspi* L.). Admodum variabilis, pollicaris-2pedalis, subsimplex-ramosa, 1-multicaulis, fol. rad. argute pinnatifida-integra; fl. albi. 3—10. ☉. — In ruderatis, cultis, campis, aggeribus, ad vias, ubique.

8. **Draba** L. Gjeslingblomst.

646. *D. verna* L. (983). H. 1. 693. Fol. rosulata, oblongo-lanceolata dentata, caul. nudi, fl. racemoso-corymbosi, pedicelli fructiferi elongati. 4—5. ☉. — In ruderatis, loc. cultis, agris ubique.

9. **Alyssum** L. Kroгнаal.

647. *A. calycinum* L. (1704). H. 1. 697. Incanum, ramosum, $\frac{1}{2}$ ped., adscendens, fol. spatulata siliculæqve stellato-pubescentia, fl. pallide lutei. 6—7. ☉. — *Ved Kjøge paa Bakker imellem Svinevadkro og Eiby Kamphövener!*

Lunaria L. Sækbæger.

1. *L. annua* L. (1880). H. 1. 708. Fol. cordata fl. violacei. *Paa en Høi i Bidstrupgaards Mark, form. udkommen fra en Have.*

10. **Cochleária** L. Kokleare.

648. C. 1 danica L. (100) fol. rad. longe-petiolatis cordatis, caulinis in petiolum brevem decurrentibus, siliculis ellipticis. H. 1. 704. Stylus brevis, dissepimentum sæpe in foramen oblongum disrumpens! Fol. sæpius angulato-dentata, in β . integrifolia integerrima subrotunda. 5—6. ☉. — Ad littora marina frequens. *Amager! udenfor Kastellet til henimod Charlotten! o. s. v. β . imellem den alm. Form! Udmærket paa Aalholm i Isefjord. Cfr. Nolte Novit. p. 57 seqv.*

649. C. 2. anglica L. (329) fol. rad. petiolatis caulinis sessilibus amplectentibus, siliculis ellipticis longistylis. H. 1. 704. Civis mihi minus certa ab ipso non lecta, spec. monensia habent fol. rad. subcordata nec basi rotundata, et everbis conveniunt cum var. β C. officinalis cl. Kochii (Syn. p. 66), siliculæ autem fuere plane talia qualia a cl. Nolte C. anglicæ adscribuntur. — In littoribus. *Saltholmen I. Vahl. Dragö Hornem. Oxholm i Isefjorden Kph.! Ved Noret paa Möen. Mörch. I. Vahl!*

650. C. 2. officinalis L. (135) fol. rad. petiolatis, caulinis sessilibus amplectentibus, siliculis subglobosis brevistylis. H. 1. 703. Maxima specierum, floribunda. — 5—6. ☉. —

Ad littora rarior. *Ved Pesthuset paa Vesterfælled Vahl! Ved Stranden i Nærheden af Hellebæk i Sandet. Steenberg!*

11. **Armoracia** Fl. Wett. Peberrod.

651. *A. rusticana* fl. Wett. (....). H. 1. 705. (Cochl. armor. L.). Hinc inde in rudertis, an ab initio profuga?

12. **Brachyolobus** All. Kortskulpe.

Obs. Ex ratione siliquæ nonnullæ hujus generis species huic ordini, sequenti aliæ pertinent.

A. Cor. calyce longior.

652. B. 1. *Amphibium* (934?) sil. elliptica pedicello 2-3plo brevior, fol. emersis indivisis lanceolatis submersis pectinato-pinnatifidis. H. 1. 717 (*Sisymbrium* L.) Sv. Bot. 697. Robustum adscendens 1-2-pedale. 7-8. 4. — Ad ripas lacuum, in fossis. *Lundehussöen!*

653. † B. 2. *anceps* (....) sil. oblongo-lineari ancipite pedicello dimidio brevior, fol. pinnatifidis lacin. lanceolatis serratis. H. 1. 718 (*Sisymb.*) Sv. Bot. 696. Magis procumbens. 6-7. 4. — “Ikke sjælden ved Kanten af Damme og Søer” H.

654. † B. 3. *sylvestris* (1881) sil. lineari pedicelli longitudine fol. omn. profunde-

pinnatifidis pinnis oblongo-lanceolatis dentatis.

H. 1. 716 (Sisymb.) Sv. Bot. 695. 6—8. 24. —

"Hist og her paa sumpige Steder" H.

B. Cor. longitudine calycis.

655. B. 4. palustris (409) sil. oblonga
turgida pedicellum subæqvante, fol. inf. ly-
ratis sup. profunde pinnatifidis. H. 1. 717 (Si-
symbr.). Sv. B. 694. 6—8. 24. — In glareosis
irrigatis, umbrosis. *Bagsværd! Steensholt Mølle (!)*
Gisselfeldt (!)

13. *Néslia* Desv. Rundskulpe.

656. N. paniculata Desv. (204). H. 1.
692 (Rapistrum). Fol. lanceolata sagittata ample-
tencia subdentata. 6—7. ☉. Inter segetes. *Paa*
Markerne N. for Lyngby Sø! N. for Rungsted!
I Egnen af Kjøge (!)

14. *Camelina* Crantz. Dodder.

657. C. sativa Crtz. (1038). H. 1. 691.
Stylus siliculâ dimidio brevior, fol. a basi sagit-
tata latiore in apicem sensim angustantur, sæpius
integerrima; fl. lut. — 6—7. ☉. — Inter linum.

Ordo II. SILIQVOSA.

15. *Raphanistrum* Tourn. Kiddike.

658. R. segetum Baumg. (678). H. 1.

731. (*Ráphanus Raphanistrum* L.). Fol. lyrata hispida, fl. flavi, siliqva rostro ancipite longior. — 6—7. ☉ — Inter segetes frequens.

16. *Árabis* L. Gaasemad.

659. A. 1. *arenosa* Scop (1760) fol. rad. lyrato-pinnatifidis lobo terminali trigono, caulinis basi adtenuatis. H. 1. 718 (*Sisymb. ar.*). Fl. alb. v. lilac. magni (nec parvi ut ap. H.). Siliqvæ in pedicellis patentibus patentissimisve patulæ. β? siliqvis axi adpressis, stigmatē latiore. — 5—6. ☉. — In calcareis. *Stevns Kph.! Møen på store Klint og ved Magleby!*

660. A. 2. *hirsuta* Scop (1040) fol. rad. obovato-spatulatis caul. oblongis basi cordata sessilibus. H. 1. 726 (*Turritis* L.). Siliqvæ adpressæ, fl. a. — 5—6. 24. — In campis, cretaceis. *Ved Ordrup! Bernstorf o. s. v. Holsteinborg (!) Møen!*

17. *Turritis* L. Taarnurt.

661. T. *glabra* L. (809). H. 1. 726. Stricta fol. cordato sagitt. amplex., fl. pyramidati pet. a. — 6—7. ☉. — In agris, aggeribus.

18. *Cardamine* L. Springklap.

A. Petioli sagittato-auriculata.

662. C. 1. *impatiens* L. (1389). H.

1. 712. Fol. lanceol. foliol. 3-5-fidis, fl. sæpe apert. — 6. ☉. — *I en Mose i Klinteskoven paa Möen Freuchen.*

B. Petioli non auriculati.

663. C, 2. amara L. (....) caule anguloso foliolis angulatis inf. subrotundo-ovatis sup. oblongis. H. 1. 714. Cor. lact.; in apricis glabrescit, in umbroso-humidis pubescit (C. a. umbrosa DC. C. hirsuta sylvatica H. 1. 714). — 5-6. 24. — In fossis, pratis, ad fontes. *Paa en Eng udenfor Kastellet! I Dyrehaven!*

664. C. 3. pratensis L. (1039) caule tereti, fol. inf. foliolis subrotundis repandis, sup. foliolis oblongo-linearibus integerrimis. H. 1. 714. Cor. alba v. rubella. β . fol. omn. foliolis subrotundis. — 5-6. 24. — In pratis frequens. β . *Ordrup Mose Steenbuch!*

19. **Dentaria** L. Tandrod.

665. D. bulbifera L. (361). H. 1. 711. Fl. rub., bulbilli in axillis foliorum pinnatorum. — 5-6. 24. In silvis. *Ved Benzonslund H. — Möens Klinteskov!*

20. **Barbaræa** R. Br. Vinterkarse.

666. B. 1. vulgaris RB. (985) fol. caulinis sinuato angulatis, inf. lyrato-pinnatifidis.

H. 1. 720 (*Erysimum Barbaræa* L.) Fl. (ut sequentis) flavi. Variat sil. patentibus et adpressis. — 6—7. 24. In loc. subhum., ruderalis haud infrequens.

667. B. 2. *præcox* R. B. (1759) fol. omn. lyrato-pinnatifidis. H. 1. 721 (*Erys. Sm.*) — *Rarior: ved Helsingör Liebman! Steenberg!* — *Inquirenda B. stricta* Fr.: fol. summis integris, fl. exiguus, siliquis strictis, in Scania haud rara.

21. *Nasturtium* L. Bröndkarse.

663. *N. officinale* R. Br. (699). H. 1. 716 (*Sisymbrium Nasturtium* L.). Glaberrimum, ascendens, radicans, fol. pinn. — 5—7. 24. — In fossis, ad scaturigines. *Ved Damhussöen (!) ved Höfdingsgaard pr. Præstø!*

22. *Hesperis* L. Aftenstjerne.

669. *H. matronalis* L. (921. 924) pet. obovatis obtusissimis (lilac. v. alb.). H. 1. 724 (*H. inodora*). In dumetis, an vere indigena? *Ved Torbæk, Springforbi (!) Helsingör (!)*

H. tristis L. pet. lineari-lanc. (reticulatopictis), profuga. *I Sandgraven ved Ordrup!*

23. *Erysimum* L. Hjörneklap.

670. *E. l. cheiranthoides* L. (923) pedicellis fructif. patentissimis siliqvâ sua di-

midio brevioribus. H. 1. 722. — 6—7. ☉. — In agris, rarius. Paa Ö.-Fælled ved Salpeterværket Schum.! Ved Bagsværd 1837 (!) Ved Holmstrup H. Paa er høi Eng ved Baarse im. Byen og Landeveien! — Möen ved Magleby og paa Klinten (!)

671. E. 2. *hieraciifolium* L. (229) pedic. fructif. adrectis siliqvå sua 3-4plo brevioribus. H. 1. 722. — 6—7. ☉. — Rarissima planta: paa Möens Klint (!)

24. **Sisymbrium** L. Gabeklap.

a. Fol. tripinnata, pet. flava.

672. S. 1. *Sophia* L. (528). H. 1. 719. — 6—7. ☉. In rudertis, loc. cultis, ad vias.

b. Fol. integra, pet. alba.

673. S. 2. *Alliaria* Scop. (935) caule folioso fol. cordatis. H. 1. 722 (*Erys. L.*). Odor alliac. 5—6. ☉. — In dumetis, rudertis.

674. S. 3. *Thalianum* Gaud. (1106) fol. radical. rosulatis oblongo-lanceolatis. H. 1. 725 (*Arabis L.*). — 5—6. ☉. — In campis aridis. Ordrup! Frdsdal! Helsingör (!) Holstenborg (!)

25. **Chamæplium** Wallr. Sylskulpe.

675. Ch. officinale W. (560). H. 1. 720 (*Erysimum L. Sisymbrium Scop.*). Hirsutum,

pyramidatum ramis patentibus, fol. runcinato-pinnatifida, fl. fl. — 7-8. ☉. In ruderalis, circa pagos. *Amager!* *udenf. N. Port. Helsingör(!)*

26. *Sinapis* L. *Sennenp.*

676. *S. 1. arvensis* L. (753) rostro conico, fol. ovatis dentatis. H. 1. 729. — 6-7. ☉. — Inter segetes.

677. *S. 2. alba* L. (1393) rostro compresso ensiformi, fol. pinnatifido-lyratis. H. 1. 730. — 6-7. ☉. — Inter segetes rarior. — *Möen (!)*

27. *Brassica* L. *Kaal.*

A. Fol. amplexantia, siliquae patentes.

678. *B. 1. campestris* L. (550) fol. sup. ovatis basi cordata, racemo florente subcorymboso. H. 1. 727. Plantam vere sylvestrem esse consvasissimum me habeo (cfr. Fries fl. Scan. p. 62). — 5-6. ☉, ☉. — Inter segetes vernaes frequentissima.

B. Napus L. fol. sup. oblongis sagittatis, racemo florente elongato. H. 1. 728. "Raps". Copiose colitur.

B. Fol. petiolata, sil. axi adpressa.

679. *B. 2. nigra* Koch (1582). H. 1.

730 (*Sinapis* L.). — 6—9. ☉. — Inter segetes, ad
vias haud infreqvens. *Amager!*

Class. XVI. MONADELPHIA.

Ordo I. PENTANDRIA.

1. **Eródium** L'Herit. Tranehals.

680. E. 1. *cicutarium* L'Her. (986)
pet. calycem superantibus rostro glabro. H.
1. 733 (*Geranium* L.). Cotyledones trilobæ, pet.
purp. — 5—7. ☉. — In loc. steril. sicciss. freqvens.

681. † E. 2. *pimpinellæfolium* Willd
(...) pet. calycem subæquantibus, rostro stri-
goso. H. 1. 734. Cotyledones integræ. Species
mihi dubia, certe rara. *Ved Baarse og Lundby-
gaard i Nærheden af Præstø! (?)*

Ordo II. DECANDRIA.

2. **Geranium** L. Storkenæb.

1. *Pedunculi* uniflori.

682. G. 1. *sangvineum* L. (1107). H. 1.

740. Fol. reniformia 7partita lacin. 3-multifidis, pet. purp. emarg. calyce duplo longiora. — 7—8. 24. — In collinis apricis. *Paa Høien bag Flaskekroen! Paa Brede Bakker! o. s. v.*

II. Pedunculi biflori.

A. Folia ternata qvinataqve.

683. G. 2. *robertianum* L. (694). H.

1. 737. Pet. ros. striis albidis, caul. rubens. — 6—7. ☉. — In loc. cultis, dumetis, ad litt. inter saxa, frequens.

B. Folia multipartita.

a. caps. valvulæ rugosæ v. plicatæ.

aa. sepala glabra transverse rugosa.

684. G. 3. *lucidum* L. (218). H. 1.

738. Fol. renif. 5—7fida, pet. indiv. purp. — 6—7. ☉. — *Ved Helsingör? H. (Paa Hveen Hofman Bang!)*

bb. sepala pubescentia.

685. † G. 4. *Phæum* L. (987) fol. palmato-5fidis, pet. indivisis. H. 1. 735. Pet. atro-viol., crenata, basi barbata. — 6. 24. — In dumetis. *I Krattet imellem Sorgenfri og Aaen! Ved Sorø H.*

686. G. 5. *molle* L. (679) fol. reniformibus 7—9fidis, pet. bifidis. H. 1. 738. Villosum, caps. glabra, sem. lævia, pet. purp. — 6—8. ☉. — In loc. siccis, aggeribus frequens.

b. caps. valvulae laeves.

aa. sepala breviter mucronata.

687. G. 6. pusillum L. (1994) pet. emarginatis calycem æquantibus caule piloso glandulifero. H. 1. 734. Caps. pubescens, fol. renif. 5—9part. (argutius divisa ac ea G. mollis) stam. 5 steril. 5 antherif. — 6—7. — In agris siccis.

688. G. 7. pyrenaicum L. (...) pet. emarginatis calyce duplo longioribus, caule villosa non glanduloso. — Sem. lævia, fol. præcedentium, valv. adpresso-pubescentes. — 7—8. 24. *Ved Roskilde Hornem! Bregentved, Nysö Kph.*

689. † G. 8. rotundifolium L. (...) pet. indivisis calyce paullo longioribus. H. 1. 739. Caps. pub., sem. favoso-punctata. — 6—7. ☉. — Dubia civis, forsan cum G. 5. v. 6. commutata; numquam inveni nec specimina danica vidi.

bb. sepala longe aristata.

α. petala calycem sub æquantia.

690. G. 9. columbinum L. (1222) pedunc. folio 2—3plo longioribus. H. 1. 710 Valvulae pilis brevibus adpressis hirtæ!, pet. ros. — 6—7. ☉. — In campis, dumetis. *Ved et Gjärde im. Lyngb. og Frdal. för man kommer til Mosen! Ved Dronninggaard! Im. Valby og Flaskekroen!*

691. *G. 10. dissectum* L. (936) pedunc. folio brevioribus. H. 1. 739. Valvulae pilis longis patentibus (saepe glanduliferis) obsitae, pet. purp. — 5—6. ☉. — In agris rarius.

β. petala calyce duplo longiora.

692. *G. 11. sylvaticum* L. (124) pedicell. defloratis erectis, caps. rostro glanduloso-piloso, pet. supra unguem barbatis. H. 1. 736. Pet. viol.-purp. 6—7. 24. — In sylvis, dumetis. *Ved Brede! Örholm!*

693. † *G. 12. pratense* L. (...) pedicell. defloratis refractis, caps. rostro glanduloso-piloso, pet. ciliatis supra unguem glabris. H. 1. 737. Pet. coer. — 24. — *Ved Brede?* H. Vix vere indigenum.

694. *G. 13. palustre* L. (596) pedicell. defloratis declinatis, valvulis pilosis non glandulosis. H. 1. 737. Laxum, pet. ros. — 7—8. 24. In paludosis, dumetis humidis. *Ved Lyngby Mose! Ved Fredriksdal! Strandmöllen! Niberöd! o. s. v.*

3. *Óxalis* L. *Gjögemad.*

695. *O. Acetosélla* L. (980) acaulis fl. albo venis purp. picto. H. 1. 509. — 4—5. 24. — In nemoribus umbrosis ubiqve.

696. *O. 2. stricta* L. (873) caulescens
fl. luteo. H. 1. 510. — 7. 24. — In hortis cultis,
qvasi spontanea. *Nordsjælland: Helsingör (!),*
Fredensborg; i et Krat ved Fredriksborg og i
Slotshaven sammesteds (jam tempore Kyllingii);
Ved Nysö. Möen ved Marichenborg.

Ordo III. POLYANDRIA.

4. *Malva* L. Katost.

A. Fl. solitarii, fol. palmato-partita.

697. *M. 1. Alcéa* L. (1832). H. 1. 742.
Fructus glabri, pet. ros. v. alba. — 7—8. 24. —
Im. Charlottent. og Skhoved. Hinsides Frsberg!
I Bogenæs Skov ved Roskilde; paa Lille Ö og
Magle Ö ved Korsör H. — Möen H.

M. moschata, fructibus villosis diversa,
hinc inde in hortorum rejectamentis occurrit.

B. Fl. adgregati, fol. suborbiculata lobata.

a. caulis pedicellique deflorati erecti.

698. *M. 2. sylvestris* L. (1223). H.
1. 741. Cor. ros. striis purp. calyce multo lon-
gior. — 7—8. ☉. — In ruderalis, ad vias frequens.

b. caulis prostratus adscendens, pedicelli de-
florati declinati.

699. *M. 3. vulgaris* Fries (721) pet.

calyce 2-3plo longioribus, carpid. immarginatis lævibus. H. 1. 742 (*M. rotundifolia*). Cor. dilute ros. — 6-8. ☉. — Ad sepes, vias, circa pagos frequens.

700. *M. 4. borealis* Wallm. (1825) pet. calycem æquantibus v. parum superantibus, carpid. marginatis reticulato-rugosis. H. 1. 742 (*M. pusilla* Sm. *M. rotundif.* Fr.). Fl. pallide rosei. — *M. rotundifolia* L. est species collectiva hanc et præcedentem, utrasque a Linnæo memoratas!, includens. — 6-8. ☉. — In ruderatis, circa pagos frequens.

5. *Althæa* L. *Althæa*.

701. *A. officinalis* L. (530). H. 1. 741. Fol. tomentosa sub5loba, caul. erectus. — 7-9. 4. — In maritimis. *Bag Flaskekroen! Paa Møen* H.

Classis XVII. DIADELPHIA.

Ordo I. HEXANDRIA.

1. *Fumária* L. *Jordrög*.

Obs. Sepala in floribus nondum explicatis examinanda.

702. F. 1. *capreolata* L. (....) caule scandente, sep. corollam dimidiam æquantibus. H. 1. 750. "Pedicelli deflorati arcuati" Fr. Caps. subrotunda obtusissima, fl. alb. v. ochrol. — Mihi ignota. *Paa Möen* H.

703. F. 2. *officinalis* L. (946) caule ramosissimo, laxo sep. corollâ triplo brevioribus pedicello latioribus. H. 1. 749. Caps. subemarginata, pedic. recti! fl. ros. — 5—8. ☉. — In loc. cultis, ruderalis.

2. *Corydalis* DC.. Lærkespore.

A. Caulis simplex basi curvatis, radiculae per tuber demum intus excavatum sparsæ.

704. C. 1. *cava* Wahlenb. (605). H. 1. 747 (C. *bulbosa* P). Specierum maxima, fl. racem. densi, pet. ext. viol., carn., alba; bractæ ovatæ integerrimæ. Ex tubere interdum 2 caules emergunt. 4—5. 24. — In nemoribus umbrosis. I Charlottenlund henimod Slottet! (ikke tæt ved Indgangen.)

B. Caulis rectus uniramus (sqvama ramum fulcrante) tuber tunicatum radiculae basilares fasciculatæ.

705. C. 2. *fabacea* Pers. (1394) racemo paucifloro nutante fl. adproximatis, bract ovatis flore brevioribus. H. 1. 748. — 4—5. 24. In nemoribus. Charlottenl. strax indenfor Indgangen! o. s. v.

706. *C. 3. Halleri* Willd (1224) racemo multifloro recto fl. subremotis, bract. obovato-cuneatis digitato-incisis flores æquantibus v. superantibus. H. 1. 749. Præc. major et robustior, fol. et fl. pallidiora; pedicelli capsula multo breviores! — Eminus hæ species sine difficultate discernuntur; propius inspectæ vel inflorescentiâ, v. petalis internis, v. glandulæ insertionem et directionem, v. bractearum forma v. longitudine, v. solo apice bractearum foliorumque facillime et optime distinguuntur. Sola bractearum forma forsitan minus constans, quæ autem inconstantia constantiam specierum tollere vix poterit. — 4—5. 24. Cum præcedente.

Ordo II. OCTANDRIA.

3. *Polýgala* L. Mælkurt.

707. *P. vulgaris* L. (516). H. 1. 751. Var. colore (coer., rub., albo) florum, ratione sepalorum lateralium, cet. — 5—8. 24. — In pratis, pascuis, collinis, ericetis.

Ordo III. DECANDRIA.

4. *Ulex* L. Tornblad.

708. † *U. europæus* L. (608). H. 1.

756. — 6-7. — *Ved Charlottenlund. I Kongens Enghave ved Fredriksborg Røhde! Vix vere indigena.*

5. **Sarothamnus** Wimm. Gyvel.

709. *S. scoparius* Wimm. (313). H. 1. 752 (*Spartium* L.). — 7-8. — In collinis, crectis. *Ved Veien til Charlottenl. indenfor Stakittet til Venstre! I Mængde i Omegnen af Helsingör!*

6. **Ononis** L. Krageklo.

710. *O. 1. spinosa* L. (783) caule pubescente v. villosa, ramis spinosis, fl. axill. subsolitariis, foliolis ovali-oblongis, leg. calycem subæquantibus. H. 1. 757. Var subinermis et inermis (*paa en Mark ved Kongens Have ved Helsingör Stberg!*). — In pascuis, agris, collinis sterilibus.

711. *O. 2. procurrens* Wallr. (....) caule unifariam villosa ramis spinosis, fl. axill. subsolitariis, foliolis ovalibus, cal. legumen superante. *O. repens* L.? Sæpius forte cum priori commutata, a qua vix satis differt. — 7-8. — *Paa Skrænten ved det østlige Stakit i Dyrehaven! Paa Reersø Liebm.!*

712. *O. 3. hircina* Jacqv. (1584) caule (erecto) inermi villosa, fl. axill. geminis ad

apicem ramorum dense spicatis, cal. legumen superante. H. 1. 758 (*O. arvensis* Rtz.). Magna, speciosa. — 7—8. — In pascuis, agris. *Ved Flaskekroen!*

7. **Anthyllis** L. Rundbælle.

713. **A. Vulnerária** L. (188). H. 1. 758. Fl. didymo-capitati. — 6—8. 24. — In agr. arenosis, argillosis frequens.

8. **Trifolium** L. Klöver.

I. **TRIFOLIUM** fl. rubri, incarnati, albi, legumen intra calycem sessile, nervi laterales foliorum ramosi.

A. Fl. in capitulo pedicellati, cor. alba persistens. 24.

714. **T. 1. montanum** L. (1172) hirsutum, fol. ellipticis. H. 1. 785. — 7—8. — In collibus apricis rarissimum. *Paa en Høi bag Flaskekroen (!) nu næsten forsvunden.*

715. **T. 2. repens** L. (990) glabrum fol. obovatis. H. 1. 780. — 5—8. — In pratis, pascuis ubique.

B. Fl. in capitulo sessiles, cor. decidua.

a. cal. hirsutus post anthesin inflatus interne aequalis. 24.

716. **T. 3. fragiferum** L. (1042). H.

1. 785. Repens, fol. obovato-elliptica, capitulum involucro glabro multipartito fulcratum, fl. carn. 6-8. — In pratis maritimis cum Glauce marit., Sagina stricta cet.

b. cal. non inflatus interne annulo elevato instructus.

α. capitulum (in *T. arvensi* spiciforme) solitarium basi nudum (longius pedunculatum).

717. *T. 4. arvense* L. (724) spica cylindrica, cal. villosissimo. H. 1. 783. Fol. oblongo-linearibus, cor. exigua ros. — 7-8. ☉. — In agris aridis frequens.

718. *T. 5. medium* L. (1273) capit. globoso, cal. glabriusculo dent. ciliatis. H. 1. 782. Fol. ellipt., stip. lanceolatae, cor. purp. 6-8. 24. — In pratis sterilibus, agris, ad vias.

β. capitulum basi stipulis foliorum fulcrantium involucretum (breve pedunculatum).

αα. cor. calyce multo longior. 24.

719. *T. 6. pratense* L. (989) cal. 10nervi pubescente, fol. ovatis, stip. ovatis breve acuminatis. H. I. 781. Capitula saepius gemina; forma foliorum aliquantum varia, fl. purp. (rar. albi). — 6-8. — In pratis, pascuis frequens.

720. *T. 7. alpestre* L. (662) cal. 20nervi villosa, fol. ovato-lanceolatis, stip. lanceolatis

acuminatis. H. 1. 783. Caul. erectus, fl. purp.
6—8. — In sylvis. *Hareskoven (!) Kjøge Aas (!)*
ββ. cal. corollam æqvans v. superans. ☉.

721. *T. 8. striatum* L. (1171). H. 1.
784. Fot. obcordato-cuneata. β. strictum fol.
obovato-ellipticis. — 6—7. — In agris, graminosis,
inter segetes. *Ved Flaskekroen! o. s. v. β. ulterius*
observandum! paa en tår Mark imellem Charlotten-
lund og Sundet!

II. *LOTOPHYLLUM* Rehb. Fl. lutei, legumen
intra calycem stipitatum, foliorum nervi la-
terales simplices.

A. Stip. oblongo-lanc., acum., glabræ, foliola
omnia subsessilia. 24.

722. *T. 9. agrarium* L. (558). H. 1.
786. Stylus leguminis longitudine! foliola obovato
cuneata truncata vix emarginata, caul. erect. strict.
ramis adrectis, pedunculi folium suum 3-4plo supe-
rantes. β? brevipes caule stricto robusto multi-
ramo ramis subpatentibus, pedunculis folio suo multo
brevioribus, foliolis oblongo-lanc., truncatis emar-
ginatis. Forma singularis observatione digna. —
7—9. — In agris, collinis apricis. *Paa Bakkerne*
hinsides Charlotten! Brede Bakker (!) Ved Græse
Mølle ved Frsværk (!) — β. ved Landeveien imellem
Slangerup og Farum paa en Ager ved et Kalk-
brænderi Poulsen!

B. Stip. ovatae breve acuminatae pilosae, foliolum medium longe petiolulatum. ☉.

723. T. 10. procumbens L. (796)
caule flexuoso adscendente capit. 20-30floris
densis. H. 1. 787. Foliola obovata apice truncata v. submarginata, pedunc. folium suum multum superantes (in T. campestre Schreb., ap. nos nondum lecto, pedunc. folii longitudine) stylus legumine brevior. — 6-8. — In campis aridis, collibus apricis. *Paa Markerne im. Charlottenl. og Sundet! o. s. v.*

724. T. 11. filiforme L. (1707) caule diffuso vix flexuoso, capitulis sub10floris laxis. H. 1. 787. Foliola obcordata basi integerrima apicem versus obsolete denticulata, stylus legumine brevior. — 6-8. — Cum praecedente frequens.

9. **Melilotus** Lam. Steenklöver.

A. Flores albi.

725. M. 1. vulgaris Willd (1705). H. 1. 779. Stip. setac. integerrimae, legumina glabra pedicellata, cor. ala cymbae*) longitudine vexillo brevior. — 7-9. ☉. — In pratis maritimis. *Ved*

*) Petala floris papilionacei:
vexillum, Fanen,
alæ, Vingerne,
cymba, Baaden (= carina Autt, Kjölen H.).

Flaskekroen (!) *Fredriksdal* (!) *Ved Charlottenlund* H. — *Paa Møen ved store Klint* H.

Obs. Inquirenda M. arvensis Wallr., leguminibus sessilibus.

B. Flores lutei.

726. *M. 2. officinalis* Willd. (934) stip. setac. integerrimis, foliolis obovatis. H. 1. 778. Cor. petala æqualia, leg. ad suturam superiorem pubescens. 7—8. ☉. — In pratis, ad vias. *Ved Flaskekroen! Buddinge! o. s. v.*

727. *M. 2. dentata* Willd (1883) stip. e basi latiore inciso-dentata subulatis, foliolis oblongo-lanceolatis. H. 1. 778. Cor. alæ vexillo breviores cymba longiores, leg. glabra. — 7—8. ☉. — In pratis, aggeribus. *Ved Kastrup* (!) *Paa Reersø* (!)

10. *Lotus* L. *Kjællingtand*.

728. *L. 1. corniculata* L. (991. 1995) procumbens umbellis sub5floris, cal. dentibus ante anthesin conniventibus. H. 1. 788. Fl. inf. Planta maxime variabilis. — 6—8. 24. — In loc. arenos., pratis, ericetis.

729. *L. 2. major* Scop. (1521) erectiusculus capit. sub12floris, cal. dentibus ante anthesin reflexis. H. 1. 789 (*L. cornic. v. syl-*

vaticus). Major, robustior. — 7—8. 24. — In loc. ulig., sylvat. humidis.

11. **Tetragonólobus** Scop. Kantbælle.

730. *T. siliquosus* Roth (800). H. 1. 788 (*Lotus maritimus* L.). Fol. subcarnosa, fl. lut. Apud exteros etiam in pratis a mare remotis occurrit, inde fol. tenuioribus non carnosus; nostra tunc varietas maritima dicitur. 6—7. — In pratis maritimis. *Ved Kongebroen im. Korsör og Tornborg, paa Öerne ved Korsör, Skjelskjör, Kalundborg H.; ved Fiurendal, Basnæs, Holsteinborg (!)*

12. **Medicágo** L. Sneglebælle.

731. *M. 1. lupulina* L. (992) spica multiflora densa ovali, leg. reniformibus apice contortis. H. 1. 791. Fl. lut.; sub anthesi Trif. procumbenti et affin. similis. — 6—9. ☉. — In loc. argill., arvis, pratis.

732. *M. 2. falcata* L. (233) racemo multifloro capituliformi, pedicellis bract. superantibus, leg. falcatis. H. 1. 790. Fl. lut. 7—8. 24. — In pratis siccis, loc. cretac. *Ved Helsingör paa Ankersmedbakken Stberg! Ved Græse Mölle pr. Frværk (!) Stevns (!) o. s. v.*

M. sativa L. (1495) racemo oblongo, bract. pedicellos superantibus, leg. cochleato-

contortis, fl. viol.-coer. H. 1. 789. Ex cultis profuga hinc inde. *Paa et Gjarde im. Charlottenl. og Skhoved! Amager!*

13. **Astragalus** L. Astragel.

733. A. 1. glycyphyllus L. (1108) fol. 5-6jugis foliolis ovatis, stip. liberis. H. 1. 775. Fl. flavesc. — 6-8. 24. — Ad sepes, in fruticetis.

734. A. 2. hypoglóttis L. (604) fol. 8-10jugis foliolis lanceolatis stip. oppositifoliis. H. 1. 777. Fl. viol. — 6-7. 24. — In collinis apricis. *Bag Flaskekroen! Paa Slagterfælleden. o. s. v.*

Onóbrychis DC. Esparsette.

1. O. sativa DC. (2243). Hedysarum Onob. L. Fl. rub. Hinc inde profuga.

14. **Ornithopus** L. Fugleklo.

735. O. perpusillus L. (730). H. 1. 772. Prostrata hirsuta, cor. albida venis viol. — 6-7. ☉. — In campis aridis rara. *Ved Præstø H.*

15. **Vicia** L. Vikke.

I. Pedunculi brevissimi.

A. 1-2flori.

a. folia mucrone (non cirrho) terminata, sem. cubica scabra.

736. V. 1. lathyroides L. (58). H. 1.

770. Fl. exig. pall.-purp., arillus hilum conformem brevissimum tegens; seminum forma insignis. — 4—6. ☉. — In pasc. steril., collibus gramin. *Paa Marken lige ud for Indg. til Charlottenl. o. fl. St.*

b. fol. cirrho terminata, sem. subglobosa lævia.

737. V. 2. angustifolia Roth. (1340)

fol. 4-5jugis, leg. patentibus glabrescentibus, sem. globosis. H. 1. 770. Fl. magni purp.; arillus fere precedentis. — 5—6. ☉. — In agris, inter segetes.

738. V. 3. sativa L. (522) fol. sub7ju-

gis, leg. adrectis pubescentibus, sem. globoso-subcompressis. H. 1. 769. Vexillum coer., alæ purp. — 6—7. ☉. — In agris, inter segetes; copiose colitur.

B. Pedunc. 4-5flori breviter racemosi.

739. V. 4. sepium L. (699). H. 1. 771.

Fol. 5-8juga cirrhifera, leg. glabra, intus lævia!, arillus altero latere in setam longam tortam productus, quæ nota ab omnibus mihi visis Viciæ speciebus differt; sem. quæ vidi testaceo-marmorata! — 6—7. 24. — In sylvis umbrosis frequens.

II. CRACCA Pedunculis elongatis.

A. pauciflori (1—4fl.).

740. V. 5. hirsuta Koch (639) hir-

suta, pedunc. 2—4fl., leg. sub-2spermis pubescentibus. H. 1. 772 (*Ervum* L.). Fl. exig. albo-coer. — 5—7. ☉. — In collinis apricis, inter segetes.

741. V. 6. *tetrasperma* Munch. (95) glabriuscula pedunc. subfl., leg. sub-4spermis glabris. H. 1. 771 (*Ervum* L.). Fl. pall.-coer. — 6—7. ☉. — Cum præcedente rarior. *Sandgraven ved Ordrup. Paa Bakken im. Ordrup Mose og Dyreh.! Ved Skovhuset i Krag Skov v. Kjøge (!)*

B. pedunc. multiflori.

a. stip. semihastatæ integerrimæ v. obsolete denticulatæ.

α. stylus undique pilosus.

742. V. *Órobus* DC. (98) fol. mucrone (nec cirrho) terminatis. H. 1. 763 (*Orobus* sylv. L.). Fol. albido-viol. striis saturatioribus picti. — 6—7. 24. — In collinis apricis, dumetis, ericetis. *Paa Brede Bakker. Ved Roskilde (!)*

743. V. 8. *cassubica* L. (1395) fol. cirrho terminatis. H. 1. 767. Fl. viol. — 7—8. — In sylvis. *Charlottenl. til høire over den lille Bro! Brede Bakker! Frdals Skov!*

β. stylus sub apice barbatus.

744. V. 9. *Cracca* L. (804) H. 1. 768. Tres affines species, quarum modo hanc in Dania

inveni, sic a cl. Fries (Fl. Scao. p. 107) distinguuntur: *V. tenuifolia* Rth. rigida, fracto-flexuosa, stip. bifidis integerrimis, leg. ensiformibus. *V. Cracca* L. (804) laxa, leg. convexo-linearibus. *V. villosa* Rth. (2177) laxa, leg. rhombeis planis. — 6—7. 24 (*V. villosa* ☉ ex Koch.). — In campis graminosis, sepibus, inter segetes frequens.

b. stip. semilunares dentatae.

745. *V. 10. sylvatica* L. (277) stylo piloso, fol. 7—8jugis, stip. dentatis. H. 1. 767. Fl. albidis venis coer. — 7—8. 24. In sylvis. *I Gjelskov til Venstre fra Landeveien paa denne Side Bakken (!) Ved Dronninggaard (!) I Frdals Skov o. s. v. Kongsbjerget paa Møen Kph.*

746. *V. 11. dumetorum* L. (1464) stylo apice barbato, fol. sub5jugis, stip. laciniato-dentatis. H. 1. 766. Fl. rubro-viol. — 7—8. 24. — In sylvis. *Boserup Skov ved Roskilde (!) Korsør Skov, Lethrabort, Esbønderup H.*

16. *Lathyrus* L. Fladbælle.

A. Caulis angulatus apterus.

a. flores flavi.

747. *L. 1. pratensis* L. (527) H. 1. 764. Fol. 1juga, stip. sagittatae, fl. subsecundi! 6—8. 24. — In pratis, pascuis, ad sepes.

b. flores purpurei.

748. L. 2. *tuberosus* L. (1463) fol. 1jugis, fl. bracteatis, caule tetragono. H. 1. 763. — 7—8. 24. — *Paa Kastelsvoldene efter Schum. Ved Bidstrupgaard (!)*

749. L. 3. *maritimus* Bigel. (338) fol. sub-4jugis, fl. nudis, caule trigono. H. 1. 759 (*Pisum maritimum* L.). Stip. hastata foliorum fere magnitudine, fl. purp. rar. alb., planta prostrata glauca, glabra rar. pubescens; ne minima quidem notâ a Lathyri genere recedit. — 7—8. 24. — In arenosis maritimis. *Ved Skjelskjör, i Odsherred, paa Møen H.*

B. Caulis lato-alatus.

750. L. 4. *palustris* L. (399) fol. 2—3jugis petiolis apteris. H. 1. 766. Stylus rectangulo refractus supra angulum rectus linearis, fl. coer.-viol. — 7—8. 24. — In pratis humidis. *Lundehusmosen! Tidsvilde Mose (!) Ved Kongens Möller (!)*

751. L. 5. *sylvestris* L. (325) fol. 1jugis petiolis alatis. H. 1. 765. Stylus arcuatus versus apicem dilatatus, fl. ros. — 7—8. 24. — In dumetis, ad sylvarum oras.

17. *Örobis* L. Glatbælle.

A. Caulis alatus.

752. O. 1. *tuberosus* L. (781). H. 1.

761. Fol. 2—3juga, foliolorum latitudo et forma variae, fl. viol. — 6—7. 24. — In collibus, sylvaticis, ericetis.

B. Caulis angulatus apterus.

753. O. 2. vernus L. (1226) fol. 2—3jugis foliolis ovatis acuminatis ciliatis subtus nitidis. H. 1. 761. Fl. purp. — 5—6. 24. — In nemoribus umbrosis. *Ordrup Krat ned imod Mosen! Brede Bakker H. Almindeligere i S. Sjælland! og paa Møen.*

754. O. 3. niger L. (1170) fol. sub-6jugis foliolis ovato-oblongis obtusis subtus glaucis opacisve. H. 1. 762. Fl. purp. vexillo striato. — 6—7. 24. — In fruticetis, nemoribus. *I Krattet im. Ordrup Mose og Dyrehaven! Brede Bakker, Kjøge Aas, Korsør Skov H.*

Pisum L. Ært.

1. P. sativum L. fl. albis, (sem. globosis concoloribus). Sine dubio plures species varietatum nomine coluntur, cfr. Rehb. fl. exc. p. 532, no. 3423—3438.

2. P. arvense L. vexillo coeruleo alis purpureis, (sem. angulatis maculatis). Colitur, Sec. Schum. in palude *Lyngby Mose* inventum, quod minus credibile videtur. (cfr. Schum. En. 2. p. 3.)

Class. XVIII. POLYADELPHÍA.

Ordo I. TRIGYNIA.

1. **Hypèricum** L. Perikon.

A. Sepala integerrima.

a. caulis anceps.

755. H. 1. humifusum L. (141) caule procumbente, sep. oblongis obtusis mucronulatis. H. 1. 795. — 7—8. 24. — In loc. siccioribus. *Hinsides Lyngby Mose paa Markerne! Ved Vedbæk, Brede, Birkerød o. s. v.*

756. H. 2. perforatum L. (1043) caule erecto, sep. lanceolatis acutissimis. H. 1. 795. 7—8. 24. — In pratis siccioribus, ad sepes, in fruticetis. *Paa Brinkerne ved Lundehuset! o. s. v.*

b. caulis quadrangulus.

757. H. 3. tetrápterum Fr. (640) sep. lanceolatis acuminatis, caule angulis alatis. H. 1. 793 (H. quadrangulum). — 6—9. 24. — In loc. ulig., pratis. *Paa den nordlige Grøft i Lundehusmosen! Ved Isenkræmmerværket imellem Krat! Ved Bagsværd(!) o. s. v.*

758. H. 4. tetrágonum Fr. (quadrangulare L.) (....) sep. ellipticis obtusis,

caule angulis obtusis. H. 1. 791 (H. dubium Leers.). — 6—9. 24. — In pascuis siccioribus, pratis.

B. Sepala serrato-glandulosa (caulis teres).

a. Glabra.

759. H. 5. pulchrum L. (75) sep. obovatis obtusis, fol. cordato-ovatis. H. 1. 796. 7—8. 24. — In collinis sylvaticis, ericetis. *Hel-singör (!) Fredriksberg. — Möens Klint H.*

760. H. 6. montanum L. (173) sep. lanceolatis acutis fol. obovato-oblongis. H. 1. 795. — 7—9. 24. — In collinis, fruticetis. *Strand-klinterne im. Torbæk og Papirsmöllen! Hareskoven, Fredriksdal, Kjöge Aas, Næstved; Örmö ved Holsteinb.; Möen.*

b. Hirsutum.

761. H. 7. hirsutum L. (802). H. 1. 795. Sep. linearia, fol. ovata. — 6—7. 24. — In loc. umbros., incultis. *Dyrehaven, höire Haand fra Klampenb. imod Söen. Frdals Skov ved Stien fra Ördrup Mose til Ermelundshuset! Kjöge Aas, Stevns Herred. — Möen H.*

Classis XIX. SYNGENESIA *).

Ordo I. ÆQUALIS.

Obs. Flores generum 1—15, exceptis Cichorii coeruleis, flavi v. lutei sunt.

1. *Lápsana* L. Haremad.

762. *L. communis* L. (500). H. I. 827.

Fol. inf. lyrata, caulis paniculato-ramosus. — 6—7.

⊙. — In loc. ruderatis, cultis.

*) *Inflorescentia primaria* Synantherearum est calathium Cass., *Blomsterkurv* (flos compositus L. capitulum *Autt.* sammensat *Blomst* H.). Basis calathii, cui flores (flosculi L. *Smaakroner* H.) adfixi sunt, est *anthoclinium* *Bisch.*, *Blomsterstol* (*clinanthium* Cass. *receptaculum commune* L. *fælles Frugtbund* H.). Calathium cingit *periclinium* Cass. *), *Kurvdække* (calyx communis L. *involucrum* *Autt.* *fælles Bager* H.) e *foliis* pluribus compositum. Calathii pars peripherica *radius*, *Straalen*, *media discus*, *Skiven* dicitur, unde flores *discales*, (*Skiveblomster*) et *radiales* (v. *marginales*, *Straale-* v. *Randblomster*); si omnes flores tubulosi sunt, *calathium discoideum*, si radicales lingulati, c. *radians* vocatur. Nonnullis *anthoclinium paleis* (*Avner*) *vestitum* (*anthoclin. paleatum* [*paleaceum* *Autt.*]) nonnullis pilis (*anth. pilosum*), multis nudum (*nögen*, pa-

*) Melius esse nova nomine fingere quam, eodem nomine diversas notiones significando, confusionem efficere, mea quidem est sententia.

2. *Cichórium* L. Cikorie.

763. *C. Íntybus* L. (907). H. 1. 827.

Fol. inf. runcinata, caul. erectus strictus. — 7—9.

4. — Ad vias, in agris, pratis freqv.

3. *Apárgia* Scop. Borst.

764. *A. l. autumnalis* Willd (1996)

scapo ramoso glabro superne periclinioqve subhírto, fol. glabriusculis. H. 1. 815. Hypoch.

leis pilisqve destitutum). Fructus *achenium*, Skálfrugt.

Caulis *monocalathius*, *eenkurvet* (uniflorus L., *monocephalus* Al. *eenblomstret* H.) *di-tri* — — *polycalathius*, *2-3-fleerkurvet*; — *oligo-calathius*, *faakurvet* (*pauciflorus* H. etc.).

Calathium homógamum, (*eenskjönnet Blomsterkurv*), flores continet qvoad sexum æquales; *c. hom. monoclínium*, (*samkjønnet og eenskjønnet*), non nisi hermaphroditos, *c. hom. di-clínium* (*særkjønnet og eenskj.*) in uno calathio flores masculos, in altero femineos. *Calath. heterógamum* (*forskjelligkjønnet Bl.*) *monoclínium* in disco gerit flores hermaphroditos fertiles v. steriles et ad peripheriam flores femineos v. neutros; *calath. heterog. di-clínium* fert in calath. masculo paucos flores femineos et quidem in margine; in calath. fem. aliquot masculos v. hermaphroditos steriles in centro.

Inflorescentia secundaria plerisque est *corymbus* (*Hierac. cymos*, *Tanacetum*, *Achillæa Millefol.* etc.) multis eiam *racemus*, multis *glomerulus*, *glomeruli* etiam nonnullis in *racemos* v. *spicas* dispositi.

glabra α et β . Schum.! — 7—9. 24. — In pratis ubiqve.

765. A. 2. hispida Willd (862) scapo simplici foliisque periclinioqve hirtis pilis furcatis. H. 1. 813. — 7—9. 24. — In pratis. Ved Flaskekroen o. s. v.

4. **Pieris** L. Bittermælk.

766. P. hieracioides L. (1522). H. 1. 807. Rufescenti-hispida, fol. oblongo-lanc., sinuato-dent. Hieracium sabaudum Schum. — 7—9. ☉. — Paa Brinkerne ved Lundehuset! Paa Klinterne im Torbæk og Papirsmøllen!

5. **Crepis** L. Högeskjæg.

A. Caulis aphyllus racemiferus.

767. C. 1. præmorsa Tausch. (942). H. 1. 819 (Hieracium præm. L. — Intybus præmorsa Fr., genus sine dubio admittendum). Fol. oblonga denticulata. — 5—6. 24. — In pratis rarior. I Lundhusmosen! Kjøge Aas, een Gang funden. Kph.!

B. Caulis foliatus apice corymbosus.

a. achenia flavicantia v. dilute fusca, styli lutei.

768. C. 2. virens Vill (....) periclinii foliolis externis adpressis, achen. lævibus. Engl. Bot. 1111. — Virens, ramosa, formæ prim.: α . multicaulis Kph. humilis diffusus debilis fol.

rad. subintegerrimis. β . elatior erecta robustior
 fol. inf. runcinato-pinnatifidis, sup. linearibus basi
 laciniato-dentatis. — 7—8. $\odot$. (α . 2??) In cam-
 pis (α . aridis), agris, ad vias. α . ved Sölleröd (!)
 I Fyen Kamp h.! β . sandsynligviis hyppigere end
 bekjendt: Paa Marker ved Dronninggaard! Im.
 Roskilde og Jægerspris Aabye. Ved Arresödal i
 Nærheden af Fredriksværk Liebm.! Ved Örstel-
 gaard Poulsen!

769. C. 3. biennis L. (1997) periclinii
 fol. ext. patulis, achen. brevissime sursum
 muriculatis. H. 1. 824. Robusta, interdum gi-
 gantea, erecta, fol. caul. subamplectentia plana basi
 dentata. — 6—7. $\odot$. — In agris, præcipue calcareis.
 Ved Gyrstinge (!) I Egnen af Kjöge!

b. achenia castaneo-fusca, styli fusi.

770. C. 4. tectorum L. (501). H. 1
 823. Fol. caul. sagittata marg. revoluta, achen.
 transverse rugosa. — 6—8. $\odot$. — In agris, arvis,
 inter segetes.

6. *Aracium* Neck. Örneöie.

771. A. paludosum Monn. (928). H.
 1. 821 (*Hieracium* L.). Fol. glabra inf. oblonga
 runcinato-dentata basi adtenuata, periclinii fol. gland.-
 pil. — 6—7. 24. — In pratis, sylvis humidis.

7. **Hieracium** L. Högeurt.

A. Scapus simplex aphyllus v. folio uno alterove instructus.

a. calathium unicum (magnum).

772. H. 1. *Pilosella* L. (1110). H. 1. 816. Fol. lanc. v. ellipt., setoso-pilosa subtus incano-tomentosa. — 6—7. 24. — In agris siccis, aggeribus, ad vias.

b. calathia plura cymosa (minora).

773. H. 2. *Auricula* L. (1111) calath. 2—4, fol. glaucis sparsim pilosis. H. 1. 817. 5—7. 24. — In loc. argillosis solo compacto, ad vias.

774. H. 3. *cymosum* Willd. (...) calathiis numerosis corymbosis fol. cauleque sub-2folio hispidis. H. 1. 818. Stolones reptantes. H. dubium, H. 1. 817, Fl. D. 1044 et 810 quid sit nescio, nisi sit forma non stolonifera calathiis paucioribus hujus speciei, quod fere crederem. Stolones deficientes notam essentialem vix præbent. H. collinum Fries. — 6—7. 24. — In collinis. *Paa Strandklinerne imellem Torbæk og Papirsmøllen! Imellem Birkerød og Farum* H. (sub H. dubio)?

B. Caulis foliatus (plerumque) ramosus.

a. latifolia fol. ovatis v. ovato-lanceolatis, (calathia pauciora, majora.)

775. H. 4. *murorum* L. (...) fol. rad. plurimis, caulino subsolitario petiolato. H. 1.

820. Diagnosin nuper datam Frisianam optimam practico usui esse ad distingvendas hanc et sequentem speciem, omni dubio invicem in se transgredientes, et ego expertus sum. — Forma major fol. laciniato-dentatis caulinis pluribus longius petiolatis, seorsim notanda. — 7—8. 24. — In sylvis, fruticetis haud infreqvens.

776. H. 5. vulgatum Fr. (1113) fol. caulinis plurimis summis sessilibus. H. 1. 810. Cum præcedente, copiosius.

Obs. Inquirendum *H. boreale* Fr. H. 1. 821, fol omnibus caulinis summis semiamplectentibus; in Jyllandia haud infreqvens.

b. angustifolia fol. lineari-lanceolatis (calathia plura minora).

777. H. 6. umbellatum L. (680). H. 1. 822. Periclinii foliola squarrosa. — 7—8. 24. — In fruticetis, ericetis freqvens.

8. **Hippochaëris** L. Kongepen.

a. Periclinii foliola hispida marg. tomentoso ciliata, caulis hispidus.

778. H. 1. maculata L. (149. 901!). H. 1. 825. Fol. variant maculata et immaculata, caulis simpl. et ramosus; achen. omn. conformia. — 7—8. 24. — In pascuis, collinis.

b. Periclinii fol. caulisque glabra.

779. H. 2. radicata L. (150). Fl. periclinii longioribus, achen. omn. longe rostratis.

H. 1. 826. — 7—8. 24. — In prat., pasc., collinis sylv.

780. H. 3. glabra L. (424) fl. periclinium æquantibus, achen. radialibus brevibus, discalibus longe rostratis. H. 1. 826. Achenia radialia minime, ut vulgo scribitur, pappum sessilem gerunt, brevius quidem quam discalia sed evidenter rostrata sunt. — 7—8. ☉. — In agris arenosis. *Bag Flaskekroen Kph. Ved Bagsværd, hb. Schum.!* (cfr. *Aparg. aut.*). *I Hornsherred alm. Kph.*

9. *Taraxacum* Iuss. Lövetand.

781. *T. officinale* Wigg. H. 1. 812 (*Leontodon Tarax. L.*). Fol. runcinata. Formæ hujus plantæ innumeræ, hæc fere primariæ: α. obliquum Fr. (1935) periclinii fol. ext. adrectis (demum patulis) scapo oblique adscendente, fol. angustiss. falcatis. — 5—6. — In pratis marit. *Paa Amager Vahl! Bag Flaskekroen!* β. arenarium pericl. fol. ext. adrectis demum patulis, scapo recto; gracile — In arenosis. *Ved Rungsted!* Formæ ut videntur excentricæ; γ. typicum (574) pericl. fol. ext. linearibus reflexis, scapo subrecto. — 4—10. 24. — In pratis, pascuis copiosissimum.

10. *Lactuca* L. Laktuk.

782. *L. scariola* L. (1227). H. 1. 811. Fol. pinnatifido-runcinata mucronato-dentata carinâ

aculeata. — 7—9. ☉. — In ruderatis, ad vias.
Omkr. Kbhvn: paa Amager! udenfor Nørreport!
paa Volden ved Ö. Port.

11. *Mycélis* Cass. Hængeblomst.

783. *M. muralis* Rchb. (509). H. 1.
812 (*Prenanthes* L.). Fol. tenuia lyrato-pinnatif.
lacin. angulatis dentatis. — 7—8. ☉. — In sylvis.

12. *Sonchus* L. Svinemælk.

A. *Periclinium glabrum*. ☉.

784. *S. 1. oleraceus* L. (682) achen.
transverse rugulatis. H. 1. 809. Fol. tenuiora,
calathia subpaniculata. — 6—9. — In hortis, ruderatis ubique.

785. *S. 2. asper* Vill. (843) achen. lævibus. — Fol. subcoriacea, calathia subumbellata.
— Cum præcedente.

B. *Periclinium pedunculique glanduloso-pilosa*. 24.

786. *S. 3. arvensis* L. (606 m.) fol.
runcinatis basi cordatis, rad. repente. H. 1.
809. Calath. subcorymbosa, raro solitaria. — 7—8.
— In agris fossis.

787. *S. 4. palustris* L. (1109) fol.
runcinatis basi sagittatis, stolonibus 0. H. 1.
808. — 8. — In paludibus rarior. Ved Kastellet,

Tømmerpladsen H. I Kirsebærgangen (1) Ved
Lindersvold H.

13. **Scorzonéra** L. Skorzonere.

788. *S. humilis* L. (816. 1653). H.
I. 806. Variat foliorum latitudine. — 5—6. 24. —
In pratis collinis. Ved Lundhuset! Brede!

14. **Tragopógon** L. Gedeskjæg.

789. *T. pratensis* L. (906). H. I. 805.
Pedunc. sub calathio parum incrassati, periclin.
8phyllum flores radiales æqvans. β . undulatus
calath. minorib., periclinio flores superante, fol.
angustioribus undulatis apice tortis. (an *T. minor*
Fr.) — 6—7. ☉. — In pratis pascuis frequens.

T. porrifolius L.? fl. purpureis, ad Hol-
steinborg quasi sponte crescit, si descriptionem
verbis datam rite accepi.

15. **Carlína** L. Karline.

790. *C. vulgaris* L. (1174). H. I. 838.
Fol. lanc. sinuato-dentata dent. spinescentibus. —
7—8. ☉. — In collinis siccis.

16. **Serrátula** L. Skjær.

791. *S. tinctoria* L. (281). H. I. 830.
Fol. integra, lyrata v. pinnatifida, argute serrata,
fl. purp. — 7—9. 24. — In loc. incultis, pratis,
collinis. Ved Flaskekroen! Bagsværd! o. s. v.

17. **Lappa** Lam. Burre.

792. L. 1. major Gärtn. (....) pericliniis glabris, calathiis subcorymbosis. H. 1. 828 (Arctium Lappa). Fl. purp. — 6—9. ☉. — In ruderatis, ad vias.

793. L. 2. minor DC. (....) pericliniis lanatusculis, calathiis subracemosis junioribus conicis. Fol. oblongo-subcordata grosse mucronato-dentata, color plantæ dilutior, fl. pall. rub. — 7—8. ☉. — Loc. rud., ad vias frequens.

794. L. 3. tomentosa Lam. (642) pericliniis arachnoideo-lanatis, calath. subcorymbosis junioribus semiglobosis. H. 1. 899 (Arct. Bardana Wlld.). Fol. cordata subdentata, fl. saturate purp. — 7—8. ☉. — Cum præcedente.

Silybum Gärtn. Marietidsel.

1. S. marianum Gärtn. H. 1. 835. Fol. amplect., sinuato-spinescentia, fl. viol. — 7—8. ☉. Circa pagos profuga. Ved Stege(!)

18. **Onopordon** L. Æselsfoder.

795. O. Acanthium L. (909). H. 1. 837. Fol. ellipt. oblonga sinuato-lacin. arachnoideo-lanata; fl. purp. — 7—8. ☉. — In sepibus, ad pagos. Udenfor Vesterport! Ved Fredriksdal!

19. **Cirsium** Hall. Bladhoved.

A. Folia decurrentia. ☉.

796. C. 1. palustre Scop. (...) fol. pilosis, calath. racemoso-glomeratis. H. 1. 833 (Carduus L.). Fl. purp., calath. parva. — 7-8. — In pratis udis.

797. C. 2. lanceolatum Scop. (1173) fol. supra spinuloso-hispidis subtus albo-tomentosis, calath. solitariis. H. 1. 831 (Carduus). Fl. purp., cal. magna. — 6-8. — In sylvis, ad sepes.

Obs. Inquirendum C. nemorale Rehb. — Ex cl. Koch (Syn. p. 392) hoc modo distingvitur: C. lanceolatum: fol. subtus arachnoideo-sublanatis, calath. ovatis. C. nemorale: fol. subtus albo-lanatis, calath. subrotundis.

B. Fol. non decurrentia. 24.

a. Calathia terminalia congesta bracteis involucrata.

798. C. 3. oleraceum Scop. (860) H. 1. 837 (Carduus). Bract. decolores, fl. ochroleuci. 7-9. — In pratis, sylvis humidis. Lundehusmosen!

b. Calathia ebracteata.

α. calathia paniculato-corymbosa.

799. C. 4. arvense Scop. (644). H. 1. 834 (Carduus). Fl. purp., calath. diœca. — 7-8. In agris frequens.

β. calathia solitaria.

800. C. 5. acaule All. (1114) fol. lanceolatis sinuato-pinnatifidis glabris v. subhirtis. H. 1. 836 (Card.). α. vulgare caule brevissimo subnullo, β. caulescens (1881) caule elongato foliato. Fl. viol.-purp. — 7—8. — In pratis, pascuis frequens. β. ved Flaskekroen!

801. C. 6. heterophyllum All. (109) fol. subtus niveo-tomentosis, inf. laciniatis serratis, sup. integerrimis. H. 1. 835 (Card.). Fl. purp. — 7—8. — I Jonstrup Vang! Hareskoven lige for Bullerup H.; i Charlottenl. v. Slangerup H.

20. **Carduus** L. Tidsel.

802. C. 1. crispus L. (621) fol. subt. lanato-tomentosis oblongis sinuato-pinnatifidis, calath. adgregatis. H. 1. 833. Fl. purp. 7—8. ☉. — In agris, aggeribus.

803. C. 2. acanthoides L. (1341) fol. subtus in venis villosis profunde pinnatifidis, calath. subsolitariis. H. 1. 832. Fl. purp. — 7—9. ☉. — Ad vias, aggeres. Udenfor Nørreport! ved Flaskekroen!

21. **Eupatorium** L. Hjortetröst.

804. E. cannabinum L. (745). H. 1. 840. Fol. tripartita lacin. lanceolatis serratis, calath.

corymb., fl. viol. — 7—9. 24. — In loc. palud.,
dumetis hum. *Lundhusmosen!*

22. *Bidens* L. Bröndsel.

805. *B. 1. tripartita* L. (2174) fol.
3partitis, calath. erectis. H. 1. 839. — 8—9.
⊙. — In turfis, loc. inund., irrig., limos.

806. *B. 2. cernua* L. (841) fol. lanceo-
latis, calath. nutantibus. H. 1. 839. Calath.
nunc discoidea nunc radiantia. — Specimina parva
Nonnullis species: *B. minima* (312). — 8—9. ⊙.
Cum præcedente.

Ordo II. SUPÉRFLUA.

23. *Petasites* Gärtn. Hestehov.

807. *P. 1. officinalis* Mnch. (842 m. b.)
fol. cordatis inæqualiter dentatis lobis baseos
rotundatis, thyrsos oblongos. H. 1. 856 (*Tussil.*
Petas. L.). Fl. carn. — 5—6. 24. — In loc. hum.,
pratis, ad ripas. *Jægersborg ved Søen til Venstre*
af Veien! Fredriksborg. Sydsjæll. H.

808. † *P. 2. albus* Gärtn. (524) fol.
subrotundo-cordatis angulatis mucronato den-
tatis, thyrsos ovato. H. 1. 855 (*Tussilago*). —

Skal være funden ved Sorö. Maaskee forvexlet med en hvidblomstret Afart af foreg.

24. *Tussilágo* L. Fölfod.

809. *T. Fáfara* L. (594). H. 1. 854.

Fl. lut. — 4—5. 24. — In loc. argillosis. *Ved Veiene udenfor Ö. Port! Paa Bakkerne ved Foursöen!*

25. *Tanacétum* L. Regnfand.

810. *T. vulgare* L. (871). H. 1. 841.

Fol. bipinnata, fl. flavi. — 7—9. 24. — Circa pagos. *Ved Lyngby! Flaskekroen! paa Amager!*

26. *Artemisia* L. Bunke.

A. *Anthoclinium setosum*.

811. A. 1. *Absinthium* L. (1654). H.

l. 844. Caul. erectus fol. incana, calath. subglobosa. — 8. 24. — Ad pagos inqvilina. *Paa Öerne ved Korsör H. sine dubio spontanea.*

B. *Anthoclinium glabrum*.

a. *calathia heterogama*.

812. A. 2. *campestris* L. (1175) caul.

adscendentibus, fol. sericeo-canís 2-3pinnatifidis lacinulis linearibus. H. 1. 842. Caul. steriles cæspitiosi. — 7-8. 24. — In campis sterilibus, arenosis.

813. A. 3. *vulgaris* L. (1176) caul.

erectis, fol. subtus albo-tomentosis pinnatifidis pinnis lanceolatis incis. serratis. H. 1.

844. — 7-8. 24. — In loc. ruderatis, circa pagos.

b. calathia homogama, omnia hermaphrodita.

814. A. 4. *maritima* L. (1655). H. 1.

842. Fol. niveo-tomentosa v. subglabra 2-3pinnata lacinulis linearibus obtusis. α . vulgaris calath. erectis ramis recurvatis. β . gallica (2119) calath. erectis ramis strictis. γ . salina calathiis pendulis. 8-10. 24. — Ad littus marinum, omnes formæ haud raræ.

27. *Filago* L. *Museurt.*

815. F. 1. *minima* Fr. (1276) sublanata calathiis conicis (parvis). H. 1 850 (*Gnaphal. montanum* Willd.). Gracilis a basi ramosa. — 7-8. ☉. — In campis arenosis minus frequens. *Ved Bagsværd!*

816. F. 2. *arvensis* L. (1275) dense lanata paniculata calath. ovatis. H. 1. 851 (*Gnaph.*). Major calath. majorib. — 7-8. ☉. — Cum præcedente. *Bagsværd! Rungsted! Holsteinborg.*

817. F. 3. *germanica* L. (997) tomentoso-lanata dichotoma calath. globosis. H. 1. 850 (*Gnaph.*). — 7-8. ☉. — Cum præcedentibus.

28. **Gnaphálium** L. Nöglekurv.

817. *G. 1. uliginosum* L. (859) caule a basi ramoso diffuso, fol. lanceolato-linearibus. H. 1. 849. — 8—9. ☉. — In loc. ulig., inundatis.

818. *G. 2. rectum* Sm. (1229) caule simplici erecto, fol. rad. lanceolatis caul. decrescentibus supremis linearibus. H. 1. 847 (*G. sylvaticum* L., nomen collectivum, confusum et ineptum). — 8—9. 24 — In collinis, ericetis, ad oras sylvarum.

29. **Antennária** Gärtn. Kattefod.

819. *A. dioeca* Grtn. (1228). H. 1. 846 (*Gnaphal.*). Stolones reptantes, fol. rad. obovata ad terram strata caulina lanc. cauli adpressa, calath. corymb., fl. alb. v. ros. — 6—7. 24. — In agris sterilibus, ericetis.

30. **Helichrysum** Gärtn. Evighedsblst.

820. *H. arenarium* DC. (641). H. 1. 845 (*Gnaph.*). Calath. corymbosa, fl. lut., periclinii fol. citrina. — 7—9. ☉. — In collibus arenosis. Ved Bagsværd! Ørholm! o. s. v.

31. **Senécio** L. Brandbæger.

A. Fl. lingulati nulli.

821. *S. 1. vulgaris* L. (513). H. 1. 857.

Nitidus glaber v. arachnoideo-lanatus. — 7—8. ☉.
In loc. cultis, hortis copiosissimns.

B. Fl. radiales lingulat.

822. S. 2. *sylvaticus* L. (869) pubescens acheniis puberulis. H. 1. 858. — 7—8. ☉.
Loc. rud., arenos., in aggeribus.

Obs. Pro S. denticulato Müll. sine dubio partim editur forma S. vulgaris (talem interdunos ad Skagen legi), partim S. sylvatici (cui specimina Helsingorana mihi visa pertinent).

823. S. 3. *viscosus* L. (1230) glanduloso-viscosus acheniis glabris. H. 1. 858. — 7—10. ☉. — In loc. ruderatis. Ved Marmorkirken og i Studiigaarden (!) Paa de sløifede Skandser paa Amager forbi Gjögens Batterie! Ved Birkerød, Bagsværd!

32. *Jacobæa* Moench. Jakobsurt.

A. Fol. incisa.

824. J. 1. *vulgaris* Much. (944) fol. bipinnatifidis inf. lyratis, achen. scabris. H. 1. 859 (Senecio Jacob. L.). Laciniae foliorum sursum dilatatae. — 7—8. 24. — In pratis, pascuis hand infreqvens.

825. J. 2. *aquatica* (784) fol. lyratopinnatifidis, inf. subintegris, achen. glabris.

H. 1. 860 (Senec. Huds.). In loc. paludosis. *Ved Flaskekroen!*

B. Fol. indivisa (lanceolata serrata).

826. † J. 3. paludosa (385) fol. sub-
tus tomentosis, radio sub13floro, achen. pube-
rulis. H. 1. 860 (Senecio L.). — 7—8. 24. — In
paludosis, fossis. *I en Aa ved Beldringe efter Schum.*

J. sarracenica (2059) fol. glabris, ra-
dio 7-8floro, achen. glabris. H. 1. 861 (Sene-
cio L.). Interdum occurrit ex hortis profuga. *I
Fredriksberg Have. Söndermarken (!)*

33. Cineraria L. Fnokurt.

827. C. palustris L. (573). H. 1. 863.
Villosa, fol. lanceol. sinuato-dentatis, fl. lut. 6—7.
24. — In paludibus, turfosis.

34. Arnica L. Volverlei.

828. A. montana L. (63). H. 1. 860.
Fol. rad. ovato-lanceol. v. ovalia, fl. lut. — 6—7.
24. — In pratis editis, ericetis. *Ved Bagsværd!
I Hammermölleskoven ved Helsingör (!)*

35. Pulicaria Gärtn. Loppeurt.

829. P. vulgaris Gärtn (613). H. 1. 865
(Inula Pulicaria L.). Fol. oblongo-lanc., undulata,
fl. lut., radius brevissimus. — 7—8. ☉. — In pas-
cuis, ad aggeres. *Paa Amager ved Kastrup og i*

*Nærheden af Skoven! I Bagsværd H. Ved Rude
og Bisserrup (!) Paa Reersø (!)*

36. *Īnula* L. Alant.

A. *CORVISĀRTIA* Méral. fol. periclinii interiora
apice dilatata.

830. I. 1. *Helénium* L. (728). H. 1.
864. Fol. caul. cordato-ovata acuminata ample-
tentia, fl. fl. — 7—8. 24. — Circa pagos. *Im.
Bloustrød og Fredriksborg, ved Sorgenfri, Herlufs-
holm H. Ved Kongens Möller (!)*

B. *INULA* fol. periclinii interiora acuminata.

831. I. 2. *britannica* L. (413) villosa-
lanata. H. 1. 864. Var. caule simplici & corym-
boso. — 7—9. 24. — In pratis littoralibus. *Paa
Amager flere Steder! Paa Reersø (!) Ved Hol-
steinborg og paa Ormø (!)*

832. I. 3. *salicina* L. (786) glabra.
H. 1. 866. — 7—9. 24. — In aggeribus pratorum.
*Paa Grøfter ved Flaskekroen! Kjøge, Slangstrup,
Grønnehave i Odsherred H.*

37. *Solidāgo* L. Gyldenriis.

833. S. *virga aurea* L. (663). H. 4.
862. *Calathia racemosa* fl. flavi. — 7—8. 24. —
In collinis sterilibus, sylvis.

38. *Aster* L. Aster.

834. A. *Tripólium* L. (615). H. 1.

861. Fol. subcarnosa lanceol. Calath. subcorymbosa, fl. rad. lilacini, disc. lut. — 8—9. 24. — Ad littora frequens.

39. **Erigeron** L. Bakkestjerne.

835. *E. acris* L. (874) caule racemoso ramis 1-3calathiis, fol. lanceolatis hirsutis. H. 1. 853. — 7—8. ☉. — In collinis apricis, siccis.

E. canadensis L. (1274) caule stricto paniculato ramis racemosis, fol. ciliatis. H. 1. 852. — Hinc inde profuga. Ved Helsingör (!) Nestved!

40. **Bellis** L. Tusindfryd.

836. *B. perennis* L. (503). H. 1. 868. — 3—11. 24. In loc. humidiusc. frequentissima.

41. **Chrysanthemum** L. Oxeöie.

837. *C. l. ségetum* L. (995). H. 1. 869. Glaberrimum, fol. laciniato-dentata. — 6—7. ☉. — Inter segetes.

B. Fl. radiales albi.

a. fol. indivisa.

838. *Ch. 2. Leucanthemum* L. (994). H. 1. 869. Fol. rad. longe petiol. obovato-spatulata crenata, caul. sessilia. — 6—7. 24. — In agris, arvis frequens.

b. fol. divisa.

839. Ch. 3. *Parthénium* Pers. (674) fol. pinnatis pinnis ovato-oblongis pinnatifidis. H. 1. 870 (*Pyréthrum* Sm.). — 6—7. 24. — In loc. ruderatis. Ved Værløse, im. Torbæk og Papirmøllen; i Skoven ved Holsteinborg (!)

840. Ch. 4. *inodórum* L. (696) fol. 2-3pinnatifidis lacin. lineari-filiformibus. H. 1. 871 (*Pyrethrum* Sm.). — Variat in maritimis fol. crassioribus caule magis diffuso (1936. *P. maritimum* Sm.). — 7—8. 24. — Inter segetes, in agris, littoribus.

42. *Matricaria* L. Munkekrone.

841. *M. Chamomilla* L. (1764). H. 1. 872. Fol. 4pinnata lacinulis lineari-setaceis, radius albus. — 6—7. ☉. — In agris, inter segetes.

43. *Achillaea* L. Röllike.

842. A. 1. *ptármica* L. (643) fol. lanceolato-linearibus serratis. H. 1. 875. — 7—8. 24. — In pascuis.

843. A. 2. *millefólium* L. (737. 1937) fol. bipinnatifidis pinnulis 2-3fidis. H. 1. 875. Fl. alb. v. ros. — 7—9. 24. — In pratis, pascuis frequens.

44. **Anthemis** L. Kamille.

A. Radius luteus. 24.

844. A. 1. tinctoria L. (741). H. 1.

874. — 7—8. — In collinis rarior. Ved Rudersdal! Paa Ankersmedbakken ved Helsingör (!) de eneste bekjendte Voxesteder i Floraen.

B. Radius albus. ☉.

845. A. 2. arvensis L. (1178) paleis lanceolatis rigidis acuminatis. H. 1. 872. — 6—7. — In arvis, loc. siccis copiose.

846. A. 3. Cótula L. (1179) paleis setaceis. H. 1. 873. Cum Chrysanthemo inodoro confundi potest. — 6—7. — In loc. ruderatis, ad vias.

Ordo III. FRUSTRÁNEA.

45. **Centauréa** L. Knopurt.

A. Fol. periclinii scariosa integerrima.

847. C. 1. Jacéa L. (519). H. 1. 878.

Fol. lanceolata variant integerrima, dentata et subpinnatifida; fl. viol.-fusci. — 6—8. 24. — In arvis, collinis apricis.

B. Fol. periclinii fimbriata.

848. C. 2. Cyanus L. (993) fol. linearilanceolatis, fl. coeruleis. H. 1. 877. — 6—8.

☉. — Inter segetes hyemalis.

849. *C. 3. Scabiòsa* L. (1231) fol. pinnatifidis bipinnatifidisve lacin. lanceolatis, fl. atropurpureis. H. 1. 878. Maxima specierum nostrarum. — 7—8. 24. — In agris, ad sepes frequens.

Ordo IV. SEGREGATA.

Echinops L. Tidselkugle.

E. sphærocéphalus L. (2175). H. 1. 880. Fol. pinnatifida subtus cano tomentosa, calathia sphæroidea. — 7—8. 24. In campis Siællandiae occidentalis copiose. *Ved Holsteinborg.*

Classis XX. GYNANDRIA.

Ordo I. MONANDRIA*).

1. **Platanthéra** Rich. Fladknap.

850. *P. 1. solstitialis* Boenng. (235)

*) Hic ordo continet genera nostra e familia *Orchidearum*. His perigonium duplex, utrumque triphyllum; folia perigonialia interna dissimilia infimum labellum, *Læben* (Hønningjemmet's Læbe H.) dicitur, quod multis basi calcaratum (calcare vario) v. gibbum. Stamina et pistillum intime conjuncta in gynostemium Rich. *Kjønssøilen*.

antheræ loculis parallelis. Rchb. ic. IX. 1113 (P. bifolia). Sv. Bot. 314. Sep. sup. adrecta acuminata, anthera oblonga fornicata. — *Orchis bifolia* L. est species collectiva, cujus bonam descript. vide ap. H. 1. 882. — Fl. D. 315 huc certe spectat; variat enim spica elongata et abbreviata. — 6—7. 4. — In pratis, dumetis, ut videtur sequente minus frequens.

Obs. *P. brachyglossa* Rchb. IX. 1111: sep. sup. conniventibus obtusis, anthera oblonga truncata, mihi ignota.

851. *P. 2. chlorantha* Cust. (...) antheræ loculis inferne divergentibus. Rchb. IX. 1115. Engl. bot. 22. Robustior, procerior, fl. viridesc. subinodori, anth. inferne latissima, sep. sup. conniventia obtusa — 6—7. 4. — In sylvis humidiusc., ad latera paludum. *Meget alm. i Sjælland!*

2. *Orchis* L. Gjögeurt.

A. *Tubera indivisa.*

a. labellum tripartum lacinia media antice dilatata bifida.

852. *O. l. militaris* L. (1277) bract. ovatis ovario multoties brevioribus. H. 1. 885. Fl. pallide purp., lab. dilute purp. medio albidum punctis saturatiorib. pictum. — 5—6. 4. — In pratis, collibus cretaceis. *Möen paa Aborrebjerget! paa en Eng ved Siiden af Maglevandsfaldet!*

853. O. 2. *ustulata* L. (103) bract. lanceolatis ovarium subæquantibus. H. 1. 885. Fl. atropurp. lab. album guttulis atropurpureis. — 7. 24. — In collibus, sylvis, solo cretaceo. *Ved Flaskekroen? Sölleröd? paa en Klint ved Tudsens Hornem. Kjöge Aas Haugberg! I Fiurendal Skov Steenbuch! — Möen II.*

b. labellum trilobum lobis integerrimis.

α. labellum supra bicornè, spica densa.

854. O. 3. *pyramidalis* L. (2113). H. 1. 883. Fl. purp. — 7. 24. — In sylvis solo calcareo. *I Alindelille Skov (!) — I et Krat ved Kjelby paa Möen A. Mörch! Paa Aborrebjergtet Poulsen 1837!*

β. labellum non cornutum, spica laxa.

855. O. 4. *Mório* L. (253) lab. lobo medio crenulato subemarginato, perig. lacin. obtusis conniventibus. H. 1. 883. Fl. purp-viol. — 5—6. 24. — In pratis haud infreqvens. *Bag Flaskekroen! Ved Ordrup (!) Ved Kjöge! — Paa Möen!*

856. O. 5. *màscula* L. (457) lab. lobo medio crenulato emarginato, per. lacin. lateral. acutis reflexis. H. 1. 884. Fl. viol.-rub. labell. punct. — 5—6. 24. In pratis.

B. *Tubera palmata*.

854. *O. 6. sambucina* L. (1232) fol. antice latioribus obtusis, bract. flores æquantibus. H. 1. 885. Fl. lut., rar. purp. — 6. 24. — *Paa en Høi ved Slagelse* H.

855. *O. 7. latifolia* L. (266) fol. lanceolatis acutis, bract. flores superantibus, calcare ovario brevior. H. 1. 886. Spica elongata, fl. purp. rar. alb. — 5—6. 24. In pratis frequens.

Obs. Sequenti modo a cl. Fries O. latifolia ab O. incarnata L. distinguitur:

O. latif. fol. acutis patulis fol. perig. later. adscendentibus maculatis.

O. incarnata: fol. acutis erectis fol. perig. later. reflexis immaculatis. — Hæc sine dubio apud nos minime rara et pluries eam me vidi fingo, præcipue in Sjæll. australi; quum autem nuper non vidi et specimina sicca examinationem fidam non permittunt, satius esse duxi mentionem modo eorum facere.

856. *O. 8. maculata* L. (933) fol. lanceolatis acutis, bract. inf. flores superantibus sup. eos æquantib., calc. ovarium æquante. H. 1. 887. Variat latitudine foliorum, spica (conica) longiore et brevior; fl. carn., maculis saturatioribus. 6—7. 24. — In pratis, umbrosis frequens.

3. *Gymnadenia* Rich. Traadspore,

857. *G. conopséa* R. B. (224). H. 1.

888 (*Orchis* L.). *Rechb.* VI. 816. *Labellum* 3fidum lob. ovatis obtusis, calcar filiforme ovario longius, fl. purp. — 6—7. 24. — In pratis rarior. *I Lundehusmosen paa en enkelt Plet henad imod Charlottenlund (!) Ved Aastrup, Tidsvilde H.*

4. **Himantoglóssum** R.Br. Poselæbe.

858. *H. viride* Rich. (77). *H.* 1. 890 (*Satyrium*). *Rechb.* VI. 813 (*Gymnadénia*). *Habenaria* R. B. *Coeloglossum* Hartm. *Labelli* lobus medius brevissimus. — 6—7. 24. — In pascuis: *Paa en Klint ved Tudsens Hørnem.*

5. **Herminium** R. Br. Pukkellæbe.

859. *H. monorchis* R. Br. (102). *H.* 1. 895 (*Ophrys* L.) *Lab.* 3fidum lacin. linear., intermedia duplo longior, fl. parvi, viridesc., dense spicati. — 6—7. 24. — In pratis haud infrequens. *Lundehusmosen N. for Grøften! Paa Bakkerne ved Skodsborg! Ved Gyrestinge (!) Gisselfeldt, Arre Sø H.*

6. **Ophrys** L. Fliglæbe.

860. *O. myódes* L. (1398). *H.* 1. 896. *Lab.* puberulum atrofuscesc. macula coerulesc., fol. perigonial. int. atropurp., ext. virescentia; spica sub-6fl. fl. remotis. — 6—7. 24. — In loc. cretaceis. *I Alindelille Fredskov (!)*

7. **Spiránthes** Rich. Skrueax.

861. *S. autumnalis* Rch. (387). H. 1.
 894 (*Ophrys spiralis*). Fol. rad. ovata. — 9—10.
 24. — *Paa Steenved Overdrev ved Kielsbjergene, og*
paa en Høi i Nærheden af Præstø H.

8. **Habenaria** R. Br. Remlæbe.

862. *H. albida* R. Br. (115). H. 1.
 890 (*Satyrion* L. *Gymnadenia* Scop. *Coeloglossum*
Hartm.). Lab. lobus medius longior. — 6—7. 24.
In pratis editis, collinis. Ved Brede (!)

9. **Corallorhiza** Haller. Koralrod.

863. *C. innata* R. Br. (451). H. 1. 893
 (*Ophrys Corallorh. L.*). Spica pauciflora fl. albo-
 vir. — 5—6. 24. — *In sylvis umbrosis rarissima.*
Klinteskovene paa Møen!

10. **Cephalanthéra** Rch. Huullæbe.

A. Ovarium pubescens.

864. *C. 1. rubra* Rch. (345). H. 1. 901
 (*Serapias* L. *Epipactis* Sw.). Lab. lamina ovata
 acuminata foliorum ceterorum longitudine, fl. purp.,
 fol. ensif. — 6—7. 24. — *In sylvis solo cretaceo.*
I Gyrtinge Skov Aabye! Store Klint paa Møen!

B. Ovarium glabrum.

865. *C. 2. pallens* Rch. (1400) bract.
 ovarium superantibus. H. 1. 900 (*Serap. grandi-*

flora; *Epipactis* Sm.). Fol. perig. omn. obtusa, lab. lamina cordato-ovata, fol. ovato-lanc., fl. alb. — 6—7. 24. — In sylvis solo cretaceo. *Aasen ved Kjøge, Kph.! I Alindelille Fredskov (!) Möens Klint!*

866. *C. 3. ensifolia* Rch. (506) bract. ovario multo brevioribus. H. 1. 900 (Serap.). Fol. perig. ext. acuta, lab. lamina obtusissima, fol. inf. lanc., sup. lineari-lanc., fl. alb. — 6—7. 24. — Cum præcedente rarior. (?) *Ved Dronninggaard, Gjelskov, ved Aldershvile, Kjøge Aas, Vallø H. (?) Möens Klint (!)*

11. *Neóttia* L. Fuglerede.

867. *N. nidus avis* Rch. (181). H. 1. 892 (*Ophrys* L.). Albido-fuscescens, caul. vaginis tectus, radix intricato-fasciculata. — 6—7. 24. — In sylvis frondosis, umbrosis. *I Hareskoven (!) ved Kollekolle, Dyrehaven o. s. v. Strandskoven ved Holsteinborg Stbuch.! — Möens Klinteskov!*

12. *Listéra* R. Br. *Listére.*

868. *L. ovata* R. Br. (137) fol. ovatis labello 2fid. H. 1. 893 (*Ophrys* L.). Fl. vir. 6—7. 24. — In pratis sylvat. *Im. Sorgenfr. og Fuglevad Mølle! Im. Ordrup og Dyreh. o. s. v.*

869. † *L. cordata* R. Br. (1278) fol.

cordatis labello 4fido. H. 1. 894 (Ophrys L.).
*Funden i Frberg Have af M. Vahl! senere ikke
 gjenfundet.*

13. *Epipactis* Swartz. Sumprod.

A. Lamina labelli cordata obtusissima crenulata.

870. E. 1. palustris Sm. (267). H. 1.
 899 (Serapias L.). Fol. lanceol. amplexantia, fl.
 albidis subcernui, ovar. pub. — 7-8. 24. — In pa-
 ludibus, pratis. *Lundehusmosen N. for Grøften!
 Lyngby Mose! o. s. v.*

B. Lamina labelli acuminata acuta.

871. E. 2. latifolia All. (811) fol.
 ovatis perigonio labellum superante, ovario
 glabro. H. 1. 898 (Serap. L.). Fl. rubro-virentes.
 7-8. 24. — In sylvis umbrosis. *Dronninggaard (!)
 Kjøge Aas (!) Egebækvang ved Helsingør (!)
 Holsteinborg (!) Møen (!) o. s. v.*

872. E. 3. atrorubens Hoffm. (1938) fol.
 ovato-lanceolatis, labello perigonium æquante
 ovario tomentosulo. H. 1. 899 (Serap. micro-
 phylla) 2. 260 (S. latif. atrorubens). Fl. atro-purp.
Paa Møen H.

Obs. 870 et 871 mihi non satis cognitæ, illius
 specimina modo sicca vidi, hujus nulla, in-
 quirenda igitur constantia characterum.

14. **Epigógium** Gmel. Knælæbe.

873. *E. Gmelini* Rich. (1233). H. 1. 892 (*Satyrrium Epigógium* L.). Decolor, aphyllum, caulis ad genicula vaginis squamæformibus obsitus, spica paucifl. fl. flavesce. pendulis. "Genus maxime memorabile exoticarum formarum quasi umbrant nobis relinqvens, — quasi impatiens climatis nostri rariter dispersum, caducum, parasiticum, cl. Friesio meteoricum". Richb. — 6. 24. — Rarissima planta apud nos paucis modo locis observata. *Paa Möens Klint (!) I Gyrstinge Skov? Albrecht.*

15. **Malàxis** Sm. Hjertelæbe.

874. *M. 1. paludosa* Sm. (1234) caule 5gono labello acuminato. H. 1. 897. *Gynostemium brevissimum teretiusculum*, anthera persistens, fl. flavo-vir. — 6—7. 24. — In turfosis sphagnosis. *Lyngby Mose! I den tredie Mose ved Aasen ved Kjøge Kph.*

875. *M. 2. Loeselii* Sm. (877) caule triqvetro labello obtuso H. 1. 897. *Sturmia* Richb. *Liparis* Rich. Præcedenti similis sed robustior; gynostemium elongatum basi incrassatum apice subalatum, anthera decidua. — 6—7. 24. — Cum præcedente. *Lyngby Mose! Lundehusmosen (!) Ved Bidstrupgaard.*

Ordo II. POLYANDRIA.

16. **Calla** L. Mysse.876. *C. palustris* L. (422). H. 1. 902.

Fol. cordata, spatha externe viridis, interne alba. —

6—7. 24. — In turfosis, ad ripas. *Ved Frdal!**Kollekollc (!) o. s. v.*

Classis XXI. MONOECIA.

Ordo I. MONANDRIA.

1. **Zostera** L. Bændeltang.877. *Z. marina* L. (15). H. 1. 6. Fol.

3nervia. — 7—8. 24. — In mari ubique.

2. **Zannichellia** L. Zannichellie.878. *Z. palustris* L. (67). H. 1. 911.

Sine dubio plures species etiam apud nos inveniuntur; cf. Rehb. VIII. 1003—1007. — 6—8. ☉. —

In fossis aqua salsa, subsalsa v. dulci repletis, haud infrequens. *Paa Amager! o. s. v.*3. **Callitriche** L. Vandstjerne.879. *C. l. stagnalis* Scop. (...) fol.

omn. obovato-spatulatis. Rchb. IX. 1184—1186. Bract. falcatae apice conniventes, filamentum elongatum curvulum, styli elongati curvati denique recurvi; "resulae (foliorum) axillares in ramulo ceterum aphyllis"! An *C. verna* l. *repens* H. 1. 910. — 5—8. ☉. — In locis limosis frequens.

880. *C. 2. platycarpa* Kütz. (....) fol. inf. linearibus sup. obovatis, bract. falcatis apice rectiusculis, stylis persistentibus denique recurvatis. Rchb. IX. 1187—1199. H. 1. 910 (*C. verna 2. intermedia*). — 5—8. 24. — In aquis stagnantibus frequens:

881. *C. 3. vernalis* Kütz. (....) fol. inf. linearibus sup. obovatis, bract. subarcuatis, stylis erectis fugacibus. Rchb. IX. 1179—1183. — H. 1. 909 sub *C. verna*. — In aquis cum praecedente.

Obs. Ulterius inquirendae haec species, quarum 2 priores ipse legi, tertia mihi non satis cognita; inquirenda simul C. hamulata Kütz. fol. praecedentium, bract. circinato-falcatis apice hamatis, stylis longissimis divaricatis,

882. *C. 4. autumnalis* L. (2120) fol. omn. linearibus basi latioribus. H. 1. 910. Magis erecta, semper sub aqua. — 7—9. 24. — In aquis stagnantibus et fluitantibus. *Ved Fredriksdals Mölle i Möllebakken! I Damhussöen (!)*

4. **Euphórbia** L. Vortemælk*).

A. Umbella 3fida ramis dichotomis.

883. E. 1. *exigua* L. (592) fol. linearibus, fol. invol. ex basi latiore subcordata adtenuatis acutis. H. 1. 529. — 6—8. ☉. — Inter segetes, loc. argillosis. *Sydsjælland* (1)

884. E. 2. *Peplus* L. (1100) fol. obovatis foliisque invol. subrotundis obtusissimis. H. 1. 528. — 6—8. 24. — In loc. cultis, hortis.

B. Umbella 5fida ramis 3fidis ramulis bifidis.

885. E. 3. *helioscópia* L. (725). H. 1. 530. — 6—8. ☉. — In hortis, inter segetes.

Ordo III. TRIANDRIA.

5. **Spargánium** L. Pindsvinknop.

A. Caulis simplex.

886. S. 1. *natans* (260 fol. planis na-

*) *Euphorbiæ* generi vulgo adscribitur calyx 5partitus, corolla 5petala petalis glanduliformibus, stamina 10—20, pistillum 1 germine pedicellato. Est autem hic flos quem vocant inflorescentia et quidem *primaria* harum plantarum, ex periclinio duplici, floribus ♂ 10—20 monandris nudis floreque ♀ unico centrali monogyno constans, quam inflorescentiam (calathio et coenanthio analogam et jam floribus multis polygynis, v. c. *Ranuncolorum*, *Myosuri*, *Adonidum*, præparatam), cum Petermanno *Syzyganthium*, *Blom-*

tantibus. H. 1. 916. Sequentibus minus et gracilius. — 6—7. 24. — In paludibus. *Lyngby Mosel o. s. v.*

887. S. 2. simplex Huds. (932) fol. basi triquetris erectis. H. 1. 916. — 7—8. 24. — In lacubus, paludibus.

B. Caulis ramosus.

888. S. 3. ramosum Huds. (1282). H. 1. 915. Fol. basi triquetra. — 7—8. 24. — Ad lacus, fossas.

6. *Typha* L. Dunhammer.

889. T. angustifolia L. (815) fol. subcanaliculatis, spicis ♂ et ♀ discretis. H. 1. 914. — 6—7. 24. — In lacubus. *Ved Kastellet, Frborg, Fiurendal H.*

890. T. latifolia L. (645) fol. planis, spic. ♂ et ♀ contiguis. H. 1. 914. — 6—7. 24. — In lacubus, paludibus, copiosior prædente.

7. *Carex* L. Star*).

[Sectiones generis:

I. *Psyllóphora* spica solitaria terminalis.

sterkop, vocamus. Infl. secundaria est umbella in qua satis varie syzyganthia disposita sunt.

*) De inflorescentia *Carieum* v. notam ad p. 13. Fructus verus his ut ceteris Cyperaceis est *carryopsis*, quam hic includit *perigynium*, *Stöv-*

II. Schelhamméra spiculæ in capitulum
basi involucratur congestæ.

III. Vigneæ spica composita terminalis.

IV. Carex spica terminalis ♂ 1 v. plu-
res, laterales ♀.]

Sectio I. PSYLLÓPHORA Ehrh.

A. dioeca (stigm. 2.).

891. C. 1. dioeca L. (369). H. 1. 917.

Fr. ovati crestiuse. margine superne scabriusculi.
Interdum occurrit spica ♂ inferne flore ♀ uno al-
terove instructa. — 5—6. — In pratis sphagnosis
paludosis. *Lundehusmosen!*

B. monoecæ (spica superne mascula).

892. C. 2. pulicaris L. (...) stigm.

2, fr. oblongis utrinque adtenuatis teretibus

veidække, a setis hypogynis sine dubio forma-
tum, utriculū referens. Hujus formā in dia-
gnosibus usum est ubi de fructu dicitur. Ca-
rices certius fructiferae et maturae examinantur;
ubi *bracteola* nominantur eae spicarum femin.
intelliguntur, nec mascularum nisi expressis
verbis dicitur.

Omnes Carices 24 et præcoces.

Icones fidas fere omnium specierum exhibet
Sturms Deutschlands Flora, heft: 47, 50, 53, 55,
57, 61, 69, quod opus seorsim venditur nomine:
Caricologia germanica von Hoppe und Sturm.
Nürnberg 1835.

demum reflexis. H. 1. 918. — 5—6. — In pratis uliginosis, turfosis minus frequens.

893. C. 3. pauciflora Ligthf. (1279) stigm. 3, fr. lanceolato-subulatis teretibus reflexis. H. 1. 919. Spica admodum paucifl., flos ♂ terminalis subsolitarius. — 5—6. — In pratis rara. *Ved Fredriksdal og Bagsvær M. Vahl (!)*
Ved Bidstrupgaard Benz on.

Sectio II. SCHELHAMMÉRA Moench.

894. † C. 4. cyperoides L. (1465). H. 1. 925. Stigm. 2, spic. basi masculæ. — 7. — *Engang funden i en udtørret Dam ved Fredriksborg (!)*

Sectio III. VIGNEA Palis. B.

Obs. Stigmata omnibus 2.

A. Spiculæ superne masculæ.

a. radix repens.

895. C. 5. chordorhiza Ehrh. (1408) spica composita ovata capituliformi, fr. ovatis striatis rostratis, culmo lævi basi ramoso. H. 1. 921. Rad. longæ funiformes, repentes. — 6 — In uliginosis, paludibus profundis. *I Lyngb. Mose Kph. Ved Dronninggaard H.*

896. C. 6. intermedia Gooden. (1343) spica comp. oblonga spiculis supremis et inf.

♀, mediis ♂, fr. bracteolam excedentibus.
 H. 1. 922. Fr. ovati plano-convexi nervosi ala angusta serrulato-scabra cincti, culm. 3gonus angulis scaber, spica conferta v. inferne interrupta, interd. digitata v. vario modo divisa. — 5—6. — In pratis, pascuis frequens.

897. C. 7. arenaria L. (1766) spica comp. ovata, fr. bracteolæ longitudine. H. 1. 921. Fr. ovati, plano-convexi ala dilatata serrulato-scabra cincti, culm. curvatus (apice subnutans) superne scaber. Præcedenti similis sed humilior nutans bracteolis dilatioribus spica magis ovata. — 5—6. — In arenosis frequens.

b. radix fibrosa.

α. virentes fruct. squarrosis bracteolas superantibus.

898. C. 8. vulpina L. (308) spica decomposita ovato-oblonga densa, fr. squarrosopatentibus nervosis, culmo 3qvetro angulis scaberrimo sub spica constricto. H. 1. 922. Bractæ interdum admodum elongantur, quæ modificatio est C. nemorosa Lumn. in H. 1. 923. — 5—6. In pratis, ad fossas. *Paa Amager! Bag Frberg. Have (!) Vesterfælied (!) o. s. v.*

899. C. 9. muricata L. (1526) spica comp. oblonga densa v. basi interrupta, fr.

sqvarroso-patentibus enerviis, culmo superne scabro. H. 1. 923. — 6—7. — In prat. sylvat., collinis graminosis. *Paa Bakkerne im. Charlottenl. og Skh.!*

900. C. 10. *divulsa* Good. (1280) spica comp. spiculis remotis infimis compositis, fr. suberectis enerviis, culmo superne scabro. H. 1. 924. — 6—7. — In collibus graminosis. *Valby Bakke! Gyrtstinge(!)*

β. *fuscuscentes* fruct. adrectis bracteolas æquantibus.

901. C. 11. *paniculata* L. (1116) sp. decompositis paniculatis, fr. ovatis plano-convexis lævibus in rostrum serrulatum sensim adtenuatis, culmo 3qvetro, rad. dense cæspitosa. H. 1. 924. Robusta, bracteolæ fuscae margine scarioso albido. — 5—6. — In paludibus. *Ordrup Mose! o. s. v.*

902. C. 12. *paradoxa* Willd (1887) sp. decompositis paniculatis, fr. ovatis plano-convexis dorso nervosis in rostrum serrulatum subito adtenuatis, culmo 3qvetro, rad. dense cæspitosa. H. 1. 925. Præcedente gracilior, bracteolæ demum candicantes, fr. facie interdum lineis (nec striis) saturatioribus notati. 5—6. — In tur-

fohis. Bagsværd, Rudersdal, Hirschholm H. Lundbygaard (!)

903. C. 13. *teretiuscula* Schkuhr. (1886) sp. compositis dense adgregatis, fr. ovatis dorso facieqve convexiusculis lævibus in rostrum serrulatum sensim angustatis, culmo inferne subtereti superne 3gono, rhizomate obliquo subrepente. H. 1. 925. Ob rhizoma repens culmi removentur et fasciculi simplices videntur; fibri radicis longissimi. — 5—6. — In paludosis frequens. *Lundhusmosen!*

B. Spiculæ superne femineæ.

a. bracteæ inf. culmo longiores foliaceæ.

904. C. 14. *remota* L. (370). H. 1. 753. Spiculæ ovatæ in axi flexuosa alternantes inf. remotæ, fr. adrecti rostrati rostro bifido bracteolis longiores. 6—7. — In sylvis humidis umbrosis haud infrequens.

b. bracteæ spiculâ suâ breviores membranaceæ vel infima spiculam sequentem attingens.

α. fr. squarroso-patentes.

905. C. 15. *stellulata* Schreb. (284 m. b.) H. 1. 928. Spiculæ ovatæ adpropinquatæ sub4, fr. bracteolâ longiores ovati costati rostrum 2dens margine serrulatum; in statu fructifero facile cognoscitur fr. squarroso-patentibus, in flore agrius spiculis paucis apice ♀. — 5—6. — In paludibus humidis, sphagnosis.

β. fr. adrecti.

906. C. 16 leporina L. (1115) spiculis subsex ovato-ellipticis adproximatis, fr. bracteolâ brevioribus eamve æquantibus plano-convexis costatis in rostrum 2dens serrulatum acuminatis. H. 1. 926 (C. ovalis Good.). — 5—6. In pratis siccis, loc. glareos. freqv.

907. C. 17. elongata L. (1236) spiculis 8-9 ovato-oblongis remotiusculis, fr. bracteolam subduplo superantibus plano-convexis costatis in rostrum integrum scabriusculum subexcurvatum acuminatis, culmo scabro. H. 1. 929. — In paludosis, umbrosis humidis. *Lyngby Mose (!) Hirschholm (!) o. s. v.*

908. C. 18. canescens L. (285) spiculis ovatis remotiusculis, fr. bracteolam paulum superantibus ovatis subcostulatis rostro brevissimo integro, culmo lævi apice scabro. H. 1. 927 (C. curta L.). Colore dilute viridi, bracteolis albidis, fr. subrostri statim agnoscenda. — Cum præcedente copiosior.

Sectio IV. CAREX L.

1. Stigmata 2.

Obs. Fr. omnium elliptici v. obovato-elliptici rostro brevi cylindrico ore integro.

A. Spica terminalis vel tota ♂ vel basi ♀, reliquæ ♀.

909. C. 19. æmulans Liebm. et Drej.
(....) spica clavæformi ♂ v. basi fl. paucis ♀ instructa, sp. ♀ ovali-oblongis ovatisve breve pedunc. remotis, bracteis inf. (non vaginantibus) latis culmum superantibus. — Robusta, facie C. Buxbaumii et C. acutæ. Ab illa diff. stigm. 2 (nec 3), fructus forma, ore integro, bracteis cet., ab hac sp. ♂ clavata unica ♀ remotis abbreviatis, rostro fructus paullum longiore. — In altero specimine a me viso spica ♀ intermedia elongatur habitu immutato. — *I en Grøft i Engen hinsides Gjelsbakke ved Røiens Bom, funden Juni 1834 af Liebman og mig selv! I Omegnen af Lyngby, Lange 1837!*

910. C. 20. cæspitosa L. (1281) sp. ♂ lineari elongata, ♀ subsessilib. adpropinquatis oblongis obtusis, fr. costatis compressis persistentibus, bracteis inf. auriculis minimis, fol. vaginis integris. H. l. 932. Magnopere variat et formas profert C. strictæ et acutæ simillimas, difficillimum sæpe est individua ad species suas referre. Fr. virides bracteolæ fuscae fructu angustiores ("spicæ maturæ eleganter ex viridi et fusco variegatæ sunt" Gaud.), modo his breviores obtusæ modo

cas æquantes v. superantes acutæ; stigm. nunc breviora nunc magis elongata. A *C. stricta* diff. habitu minus stricto, bract. auriculis parvis instructis, fol. vaginis integris; a *C. acuta*: sp. ♂ solitaria, ♀ strictioribus, fr. brevioribus latioribusque costatis, bracteis multo minoribus. — Sæpe solitarie crescit nec cæspites format; an semper? — 5—6. — In pratis, turfosis frequens.

911. *C. 21. pacifica* Drej. *) (....) sp. ♂ lineari elongata ♀ subsessilib. adpropinquatis, fr. lævibus compressis deciduis, bracteis basi auriculis 2 amplexantibus, fol. vaginis reticulato-fissis. — A *C. cæspitosa* similiore diff.: auric. bractearum, vaginis foliorum, habitu paullo absimili; a *C. stricta*: colore lutescenti-viridi, culmo humiliore ($\frac{1}{2}$ -1 ped.) præcipue fol. minus strictis, reticulo vaginarum minore et quasi incipiente. — 5—6. — In paludibus, turfosis. *I Lundehusmosen! I Mosen im. Charlottenl. og Ordrup!*

*) Hanc plantam, inter præcedentem et sequentem plane intermediam et characterum utriusque æque participem habitum tamen suum ab utraque paullo diversum servantem, nisi ut speciem propriam proposuissem, duabus illis characteres distinctivos adscribere nequivissem; dubia mea ergo tum primum sublata fuere, quum constitui, duarum specierum certarum servandarum gratia tertiam forte minus certam proponere. Sed hac ipsa de causa *pacificam* eam dixi; sin contra hæc species certamen botanicum excitaverit, hæc sane *pacifica* bene dici poterit æque ac v. c. *Holosteum*, v. *lucens* "a non lucendo".

(Jylland: paa en Skoveng ved Öster Velling! I Thy Steenstrup!)

B. Spicæ ♂ plures.

Obs. His speciebus sæpe omnes spicæ ♀ simul apice floribus ♂ instructæ.

912. C. 22. stricta Good. (....) stricta glaucescens spicis acutis, fr. compressis bracteis culmo brevioribus auriculis subamplectentibus, fol. vaginis reticulato-fissis. H. 1. 933. — 2-3 ped., scaberrima, cæspites magnas formans; bracteolæ ut ceterarum adfinium modo breviores obtusæ modo longiores acutæ. — 5—6 — In paludibus. *Lundehusmosen! Ved Fredriksdals Aa!*

913. C. 23. acuta L. (tab. ined.) viridis nutans fr. convexis, bracteis latis foliaceis culmum superantibus auriculis brevissimis, fol. vaginis integris. H. 1. 934. Spicæ sæpe adproximatæ fere adgregatæ, bracteolarum forma æque varia; individua aliquot habitum C. cæspitosæ induunt sed dignoscuntur bracteis culmum superantib. — Fructus numerosos maturos examinavi sed ne minimum quidem nervum v. costulam respirare potui. 5—6. — In fossis, ad lacuum ripas. *I Sorte Sö ved Randen imod Kjærlighedsstien! (herfra Originalerne til Tegningen i Fl. D.)*

† *C. paludosa* Good., fr. rostratis, bracteolis aristatis. Cfr. Nr. 933.

II. Stigmata 3.

A. Spica terminalis ♂ (v. androgyna inferne ♂).

Obs. Spicæ masc. in nonnullis speciebus interdum accedit altera minor, quasi rudimentaria.

AA. Fructus glabri (non pubescentes).

a. fr. erostres v. rostro brevissimo tereti ore integro truncato instructi.

α. bractæ non vaginantes.

914. *C. 24. Buxbaumii* Wahlenb. (1406) sp. ♂ obovato inferne ♀, sp. ♀ 2—3 ovatis subsessilibus remotis bractea infima foliacea culmum superante. H. 1. 943. Fr. ellipt. læves, bracteolæ cuspidatæ fructum superantes. — *I en Mose ved Farum M. Vahl, Schum.! I en Mose S. for Frdals Sö Hornem.*

915. *C. 25. limosa* L. (646) sp. ♂ linearari, ♀ 1—2 oblongis adpropinquatis longe pedunc. cernuis, bract. angustis culmo brevioribus. H. 1. 945. Fr. subrotundo-ovales costati bracteolis longiores, rad. longe repens stolonif. — 5—6. — *In paludibus profundis, muscosis. Lyngby Mose!*

β. bractæ vaginantes.

916. *C. 25. panicea* L. (261) bracteis

spicam suam subæquantibus, culmo lævi, radice repente. H. 1. 947. Sp. ♀ rarifloræ fr. ovato-globosi breve rostrati læves. — 5—6. — In pratis humidis. *Lundehusmosen!*

917. C. 27. *pallescens* L. (1050) bracteis culmum scabrum superantibus, rad. cæspitosa. H. 1. 947. Sp. ♀ densifloræ fr. ellipt. costati crostres subcompressi, fol. vaginæque pilosa. 5—6. — In prat. sylvat., pascuis.

b. Fructus rostrati rostro plano-convexo bifido.

aa. spicæ ♀ breve pedunc., pedunculis adrectis

α. squarrosæ sp. ♀ breviorib., fr. squarrosis bract. demum refractis.

918. C. 28. *flava* L. (1047) sp. ♀ 2—3, fr. ovatis inflatis in rostrum recurvatum acuminatis, fol. planis. H. 1. 938. Color lateo-viridis, habitus constans, spicarum ♀ numerus et situs varii. — 5—6. — In turfosis frequens.

919. C. 29. *Oederi* Ehrh. (371) sp. ♀ 2—6, fr. densissimis ovatis in rostrum rectum breve acuminatis, fol. planiusculis. H. 1. 939. Præcedenti similis, plerumque humilior, sæpe tamen æque alta; diff. præter notas datas fol. angustioribus, culmo obtusius trigono fr. minoribus. Variat ut præcedens. — 6—8. — In turfosis frequens.

920. *C. 30. extensa* Good. (1709) sp. ♀ 2—4, fr. ovatis utrinque convexis in rostrum breve acuminatis, bract. longissimis culmum superantibus, fol. convoluto-setaceis. *H. I.* 939. 6—7. — In pratis maritimis. *Saltholmen Schlichtkrull!*

β. sp. ♀. elongatæ bract. adrectis, fr. adrecti.

921. *C. 31. fulva* Good. (...) bractea infima culmum superante v. saltem spicam ♂ adtingente, fr. ovatis utrinque convexis nervosis in rostrum rectum margine scabrum acuminatis, bracteolis acutis, culmo scabro. Rad. stolonif., culm. erect. fol. ligulâ oppositifolia brevi truncatâ prædita, color viridi-fulvus, bracteolæ fuscae. *Fl. D.* 1768 plantam diversissimam sistit. — 5—7. — In prat. sylvat., subhumidis. *I en Skoveng im. Rønnede og Kjøge, til Høire fra Veien!*

922. *C. 32. Hornschuchiana* Hoppe (1049. 22..) bractea infima anguste foliacea spicam suam superante masculam non adtingente, culmo superne scabriusculo (cet. præced.). *H. I.* 941? (*C. distans*). Rad. stolonif.! — In pratis, *Ved Flaskekroen Aabye! I Lunde-husm. Lange!*

923. C. 33. *binervis* Sm. (....) bractea infima spicam suam superante, fr. rostro margine lævi, bracteolis ovatis retusis ex emarginatura mucrone serrulato-scabro instructis, culmo lævi. H. 1. 942. Rad. cæspitosa, ligula oppositif. elongata obtusa; reliqua præcedentium. — Fructus rostrum in specc. siccis video læve. — 5—6. — In pratis maritimis. *Saltholmen (!)* *Ved Flaskekroen Aabye!* *Ved Præstø Kamphöv.!*

Obs. Veram *C. distantem* L. nondum vidi nec in *Dania* lectam audivi.

bb. spicæ ♀ longe et tenuiter pedunculatæ pendulæ.

924. C. 34. *pseudo-Cyperus* L. (1117) sp. ♀ cylindricis densifloris, bracteis inf. breviter vaginantibus culmum superantibus. H. 1. 949. Fr. ovato-lanceolati in rostrum bicuspe adtenuati nervosi glabri; culmus scaberrimus; robusta, spectabilis. — 5—6. — In paludosis sylvat., pratis. *Lundhusmosen!* *Ved Brædderne af Fursø!* *Lyngby Mose!*

925. C. 35. *sylvatica* Huds. (404 m.) sp. ♀ linearibus laxifloris, bract. inf. longe vaginantibus apicem culmi non adtingentibus. H. 1. 948. Fr. elliptici 3goni lævissimi in rostrum lineare bifidum acuminati, culm. inf. lævis; late

virens. — 5—6. — In sylvis umbrosis frequens.
Frberg Have! Dyrehaven!

BB. Fructus pubescentes.

a. spicæ ♀ lineares laxifloræ.

926. C. 36. *digitata* L. (1466). H. 1.
 910. Fr. 3goni obovati rostello brevi tereti integro instructi, bracteolas obovatas subæquantes; fol. vagina atropurpureæ, pedunc. vagina membranacea oblique truncata inclusus. — In collinis sylvat., cretaceis v. argillosis. *Brede Bakker! Bakkerne ved Fuursø! Möens Klint v. Maglevandsfaldet!*

b. sp. ♀ subglobosæ ovatæ oblongæve densifloræ (bractæ non vaginantes).

α. radix cæspitosa.

927. C. 37. *pilulifera* L. (1048) sp. ♀ 2—3 subrotundis, bractea inf. lineari-subulata herbacea, culmis fructif. reclinatis. H. 1. 937. Dilute viridis, sp. ♂ brevis sublinearis utrinque adtenuata. — 5—6. In collinis siccis graminosis, sylvaticis frequens.

928. C. 38. *montana* (1769) sp. ♀ 1—2 ovatis, bract. membranaceis retusis ex emarginatura aristatis. H. 1. 937 (C. *collina* Willd.). Culmi graciles elongati, fol. læte viridia, vagina atro-purp., bract. bracteolæque atrofusæ. In specc. Sjæll. spicam ♂ clavatam bracteolas retusas, in Jutlandicis vivis sp. ♂ utrinque adtenuatam br-

eteolas obtusas nec retusas inveni. An plures species continet? — 5—6. — In sylvis umbrosis. *Hareskoven Aabye! Bakkerne hinsides Fuglevad Mølle Kph.! Ved Charlottenl. II.*

β. rad. stolonifera.

929. C. 39. *ericetorum* Poll. (1765) sp. ♀ 1—2 (sæpius 1) subrotundis bracteis membranaceis amplexantibus bracteolis obovatis obtusissimis ciliatis. H. 1. 937 (C. ciliata Willd.). Culm. curvatus, sp. ♂ clavata, bracteolæ fuscae margine scarioso albido. — 4—5. — In collinis siccis, ericetis. *Brede Bakker (!)*

930. C. 40. *præcox* Jacqv. (1527) sp. ♀ 1—3 oblongo-ovatis, bract. brevibus setaceis basi marg. membranac. amplexantibus v. vaginantibus, bracteol. acutis mucronulatis. H. 1. 936. — In collibus graminosis apricis. *I Charlottenlund paa Bakken naar man kommer over Broen! Frbrg Have! o. s. v.*

B. Spicæ ♂ plures.

AA. Fructus glabri.

a. bract. inf. vaginantes (fr. rostellati integri).

931. C. 41. *glauca* Scop. (1051). H. 1. 949 (C. recurva Huds). Sp. ♀ cylindr. pendulæ, fr. ellipt. obtusi compresso convexi. — 5—6. — In humidis graminosis, pasc. sylvat.

b. bract. non vaginantes (fr. rostrum patenter bicuspe).

α. bracteolæ acutæ.

932. C. 42. ampullacea Good. (tab. ined.) fr. subglobosis inflatis, culmo obtusangulo lævi, fol. convoluta-canaliculatis. H. 1. 952. Glaucescens, sp. ♀ cylindr. — 5-6. — In paludosis, fossis freqv. *Lundehusmosen!*

933. C. 43. vesicaria L. (647) fr. ovato-conicis inflatis, culmo acutangulo scabro, fol. planis. H. 1. 952. Viridis v. vir.-fulva, sp. ♀ oblongæ, fr. iis præcedentis majores. — Cum præcedente. *Lundehusmosen!*

β. bracteolæ obtusæ arista serrulato-scabra terminatæ.

934. C. 44. paludosa Good. (1767) fr. ovatis compressis subtrigonis, bracteolis ovato-lanceolatis. H. 1. 951. Glauca scaberrima bracteolis atrofuscis arista longitudine varia, stigm. 2 et 3! sæpe in eadem spica!; bracteolæ spicarum ♂ superiorum obovato-lanc. acutæ, inferiorum obovatæ obtusiusculæ. — Formam monstrosam, sp. ♂ terminali crassa apice lobato-digitata, per plures annos in fossa ved *Hirschholm* observavit *Jacobsen!* — 5-6. — In paludosis frequens.

935. C. 45. riparia Cunt. (1118) fr.

ovato-conicis convexis, bracteolis ovatis. H. 1. 951. Maxima specierum, bracteolæ fructusque griseo-fuscae, bracteolæ masculæ oblongo ovatæ cuspidatæ parum dilutiores. — 6. — In fossis, paludosis rarior. *Ved Roskilde Kmph.! I Søborg Kanal ved Slottet Lyngbye! Ved Skjælskjør Poulsen.*

BB. Fructus hirti.

936. C. 46. filiformis L. (379. 1344) bract. non vaginantibus foliisque convoluto-canaliculatis. H. 1. 950. Fr. ovati obtuse trigoni, rostr. breve bicuspe; sp. ♂ sæpe unica. — 5—6. — In paludibus profundis, fossis aqvisis. *Lyngby Mose!*

937. C. 47. hirta L. (425. 1711) bract. longe vaginantibus foliisque planis. H. 1. 953. Fr. ovati in rostrum bicuspe adtenuati, fol. vaginæque sæpius pilosa, rarius (in C. hirta var. sublævi H.) glabriuscula. — 5—6. — In arenosis humidis siccisque.

Ordo IV. TETRANDRIA.

8. **Alnus** Willd. *Æl.*

938. A. 1. incana DC. (tab. ined.) fol.

ovatis acutis subtus incanis. H. 1. 956. — 4—5. — In dumetis humidis.

939. A. 2. glutinosa Gaertn. (tab. ined.) fol. subrotundis obtusissimis utrinque viridibus. H. 1. 955. — 4—5. — In sylvis humidis.

9. *Littorélla* L. Strandbo.

940. L. lacustris L. (170). H. 1. 954. Filamenta longissima flaccida — 6—7. — In ripis lacuum. *Damhussøen! o. fl. Søer omkr. Kbhavn!*

10. *Urtica* L. Nælde.

941. U. 1. urens L. (739) monoeca fol. ellipticis. H. 1. 957. $\frac{1}{2}$ —1 ped. — 6—8. ☉. — In hortis, loc. cultis.

942. U. 2. dioeca L. (746) dioeca fol. cordatis. H. 1. 958. — 2—3 ped. — 7—8. 24. — In loc. cultis.

Ordo V. (VI). HEX-POLYANDRIA.

11. *Sagittaria* L. Piilblad.

943. S. sagittifolia L. (172). H. 1. 962. Fol. sagittata. — 6—7. 24. — In amnibus lacubus profundis. *Aaen ved Papirsmøllen! Nest ved Aa(!)*

12. **Myriophyllum** L. Tusindblad.

A. Bractæ integræ.

944. M. 1. alterniflorum DC. (fasc. 35) fl. ♂ alternis, spicis virgineis cernuis. Gracile, tenellum. — 6—7. 24. — In lacubus. *I Gurre Sö Liebman!*

945. M. 2. spicatum L. (681) fl. verticillatis, sp. virg. erectis. H. 1. 961. — 6—7. 24. — In fossis, lacubus.

B. Bractæ pinnatifidæ.

946. M. 3. verticillatum L. (1046). H. 1. 962. α . pectinatum bracteis internodio multo brevioribus: M. pectinatum DC. (huc fig.). β . pinnatifidum bract. internodium suum multum superantibus. — M. pectinatum DC. distingvere non possum, sensim in β . transit. — 6—7. 24. — Cum præcedente.

13. **Ceratophyllum** L. Hornblad.

947. C. 1. muticum Cham. (510) fr. apiculato mutico. H. 1. 961 (C. submersum L.). 7—8. 24. — In lacubus rarius. *Ved Roskilde Nolte.*

948. C. 2. oxyacanthum Cham. (2000) fr. trispino spinis 2 basilaribus recurvis. H. 1. 961 (C. demersum L.). — 7—8. 24. — Cum præcedente copiosius.

14. **Arum** L. Arum.

949. *A. maculatum* L. (505). H. 1.
 960. Fol. immaculata, baccæ rubræ. 5—6. 4. —
 In loc. gramin. umbrosis. *Paa Kastelsvolden! i*
Syd-Sjælland ikke sjælden.

15. **Bétula** L. Birk.

950. *B. alba* L. (1467). H. 1. 966. Fol.
 ovata acuta serrata glabra nitida, in uliginosis hu-
 milior pubescens. — 5—6. — In sylvis.

16. **Carpinus** L. Avnbög.

951. *C. Bétulus* L. (1345). H. 1. 969.
 Fol. ovata acuta plicata. — 5—6. — In sylvis ra-
 rior. *Fredriksdals Skov! Syd-Sjæll.!*

17. **Córylus** L. Hassel.

952. *C. Avellána* L. (1468). H. 1. 970.
 Fol. cordato-subrotunda acuta plicata. — 4—5. —
 In sylvis, dumetis.

18. **Fagus** L. Bög.

953. *F. sylvatica* L. (1283). H. 1. 905.
 Fol. ovato-ellipt. — 5—6. — Insularum Danicarum
 ornamentum.

19. **Qvercus** L. Eeg.

954. *Q. pedunculata* Ehrh. (1180).
 H. 1. 963. Fol. oblonga sinuata. 5—6. In sylvis.

Pinus L. Fyr.

1. *P. sylvestris* L. fol. geminis. H. 1. 972.
2. *P. Strobilus* L. fol. qvinis. "Weymuths-Fyr".

Abies DC. Gran.

1. *A. excelsa* Lam. (193) fol. subtetragonis, strobilis pendulis. H. 1. 971 (*Pinus Abies* L.).
2. *A. pectinata* DC. fol. depressoplanis subtus albo-bilineis, strobilis erectis. "Edelgran". *P. Picea* L.

Larix DC. Lærketræ.

1. *L. europæa* DC. *P. Larix* L. — Ut ceteræ Coniferæ plantatur.

Ordo VI (VII). MONADELPHIA.

20. **Xanthium** L. Braadfrö.

955. *X. Strumárium* L. (970). H. 1. 959. Fol. cordata triloba dentata. — 8—9. ☉. — Ad pagos, in ruderatis. *Paa Amager, ved Kjøge, omkr. Stege paa Møen* H.

Ordo VII. (VIII). POLYADELPHIA.

21. **Bryonia** L. Galdebær.

956. *B. alba* L. (813). H. 1. 974. Monoeca fol. palmato-lobata baccæ nigræ. — 5—8. 24. — In sepibus. *Sjælden omkr. Khavn (!) I Nord-sjæll.: v. Helsingør (!) Tidsvilde; i S. Sj.: v. Vibemose! o. s. v.*

Inqvirenda *B. dioeca* Jacqv. H. 1. 975: fl. dioecis baccis rubris.

Classis XXII. DIOECIA.

Ordo I (II). DIANDRIA.

1. **Salix** L. Pül.

I. Squamæ amenti concolores luteo-virides.
A. ante fructus maturitatem caducæ.

957. *S. l. pentandra* L. (943) 5-7andra fol. ovato-ellipticis serratis glaberrimis nitidis petiolo multiglandulo. H. 1. 980. Frutex v. arbor mediocris, nitida, pulchra. — 5—6. — In pratis. *Lundhusmosen!*

958. S. 2. fragilis L. (....) 2andra fol. lanceolatis acuminatis glabris v. subsericeis, caps. pedicello nectarium bis-terve superante. H. 1. 983. Sv. Bot. 373. — 5—6 — Ad sepes, circa pagos.

959. S. 3. alba L. (....) 2andra, fol. lanceolatis acuminatis utrinque sericeis, caps. pedicello nectarium vix æquante. H. 1. 994. Sv. B. 523. Plerumque arbor magna. S. vitellina L. ramis junioribus vitellinis, (E. B. 1389. H. 2. 293) ab Aliis pro varietate hujus, ab Aliis præcedentis habetur. — Circa pagos.

B. squamæ persistentes.

960. S. 4. amygdalina L. (....) 3andra, fol. glaberrimis lanceolatis v. oblongis, squamis apice glabris. H. 1. 980 (S. triandra L.). — 5—6. — In sepibus, ad pagos.

Inquirenda S. undulata Ehrh. (....) 3andra, fol. lanceolatis acuminatis undulatis serrulatis subtus sericeis, squamis apice barbatis, pedicello nectarium bis superante. H. 1. 980.

II. Squamæ amenti apice discolores.

A. Frutices viminales stricti.

961. S. 5. purpurea L. (....) monandra fol. lanceolatis sursum latioribus serru-

latis, antheris purp. defloratis nigris. H. 1. 984 (S. purp. et S. helix.). Sv. B. 589. Opaca. — 4—5. — Ad sepes. Ved Ordrups-Veien! I Frberg Have!

962. S. 6. viminalis L. (....) diandra fol. elongato-linearibus integerrimis subtus sericeis, antheris defloratis luteis. H. 1. 994. Sv. Bot. 211. — Ad sepes haud infrequens!

963. S. 7. lanceolata Ser. (....) stam. præc. fol. lineari-lanceol. subintegerrimis subtus tomentosis canescentibus. Ringius herb. norm. I. 63; II. 59! — Ad sepes haud rara.

B. Frutices v. arbores torulosi.

a. caps. tomentosæ, squamæ pubescentes.

964. S. 8. aurita L. (....) fol. obovatis bulloso-rugosis, amentis oblongis, gemmis glabris. H. 1. 989. Sv. Bot. 565. — 5—6. — In paludosis frequens.

965. S. 10. cinerea L. (946) fol. oblongis rugulosis cinereis, amentis cylindricis, gemmis incanis. H. 1. 992. Præcedente plerumque major. In paludosis minus frequens.

966. S. 10. Capræa L. (245 m.) fol. lato-ellipticis v. ovalibus amentis ovatis gemmis

glabris, H. 1. 992. Sv. B. 98. Maxima adfinium;
fol. latissima. — In paludosis, etiam ad pagos culta.

b. capsulae glabrae, amenti squamæ villosissimæ
villo crispato.

967. S. 11. *hastata* L. (1238). H. 1. 982.

Fol. ovata glabra subtus incana reticulato-venosa.
5—6. — In paludibus. I *Langholmsmosen ved
Dronninggaard* H. In Jyllandia satis frequens!

C. Fruticuli humifusi trunco subterraneo.

968. S. 12. *repens* L. (tab. ined.) amen-
tis cylindricis. H. 1. 990, 991 (S. *incubacea*).

Maxime variabilis foliorum forma et indumento.
 α . lanceolata fol. lanc. subt. sericeis. β . fol.
oblongis utrinque sericeis. γ . *arenaria* fol. ovali-
subrotundis utrinque cano-tomentosis v. sericeis;
amentæ hujus longiores. (H. 1. 991. S. *fusca*; S.
argentea Sm.) Nullum est dubium, has tres ex soli
conditione progigni et invicem in se transire. — α et β .
in paludibus, ericetis subhumidis. γ . in arenosis.

969. S. 13. *rosmarinifolia* L. (....)
amentis subrotundis, H. 1. 991? Si diagnosis
data sufficit, hæc species satis frequens est, v. c.
in *Lundehusmosen*!; sec. cl. Koch. autem nota magis
essentialis hæc est: S. *repens* fol. recurvato-api-
culatis S. *rosmarinifolia* fol. adtenuato-acumi-
natis apice rectis. —

Ordo II (III). TRIANDRIA.

2. **Empetrum** L. Krækling.970. *E. nigrum* L. (975). H. 1. 996.

Fruticulus procumbens, fol. lineari-oblonga, bacca nigra. "Fl. D. 975 differt petalis luteolis emarginatis, stylo basi integro etc., ulterius igitur observandum num alia species existat". Rehb. fl. exc. p. 765. — 5—6. — In paludibus, ericetis. *Lyngby Mose o. s. v.*

Ordo III (IV). TETRANDRIA.

3. **Viscum** L. Fuglelim.971. *V. album* L. (1657). H. 1. 997.

Fol. lanceolata obtusa, caulis dichotomus, baccae globosæ albæ. — 5. 24. — In truncis arborum parasita. *Paa Æbletræer ved Petersværft i S. Sjæll. (!)*

4. **Hippóphaë** L. Tidse.972. *H. rhamnoides* L. (265). H. 1.

999. Fol. lineari-lanc., subtus argenteo-lepidota, baccae oblongæ. — 5—6. — *Stevns Klint, ved Lærkenborg H. Møens Klint!*

5. **Myrica** L. Pors.973. *M. Gale* (301). H. 1. 998. Fol. lan-

ceolata apice serrata. — 5. — In turfosis. Ikke
sjælden i N. Sjæll. (!) I Holmegaardsmosen (!)

Ordo IV (V). PENTANDRIA.

6. **Húmulus** L. Humle.

974. H. **Lúpulus** L. (1239). H. 1.999.

Caulis longissimus scandens angulatus, fol. 5loba.
— 6—7. — In sylvis humidis, ad sepes; copiose
colitur.

Cánnabis L. Hamp.

C. **sativa** L. Copiose colitur.

7. **Juníperus** L. Ene.

975. J. **communis** L. (1119). H. 1.

1007. — 5. — In ericetis. Ved Birkerød H. Min-
dre sjælden i N. Sjæll.; i Syd Sj. paa Feddet ved
Lindersvold!

Ordo V (VII). OCTANDRIA.

8. **Pópulus** L. Poppel.

A. Stamina 12-plura, squamæ amenti glabra:

976. P. l. **nigra** L. (....) fol. deltoi-

deis margine glabris, ramis patulis. H. 1. 1003. — 4—5. — Circa pagos, an vere indigena?

P. pyramidalis Roz. fol. rhombeis marg. glabris, ramis adrectis. Ad limitandas vias plantatur.

P. monilifera Ait. fol. deltoideis marg. pubescentibus. Rarius plantatur.

B. Stamina 8, squamæ amenti ciliata.

977. *P. 2. tremula* L. (2184) fol. suborbiculatis dentatis utrinque glabris. H. 1. 1002. Squamæ amenti ♀ digitato incisæ. — In sylvis.

978. *P. 3. alba* L. (2182) fol. subrotundo-ovatis angulato-dentatis subtus niveo-tomentosis. H. 1. 1001. Squamæ amenti ♀ lanceolatæ ap. crenatæ. — 4—5. — Circa pagos.

979. *P. 4. canescens* Sm. (2183) fol. subrotundo-ovatis angulato-dentatis subtus cinereo-tomentosis. H. 1. 1002. Squ. am. ♀ apice fissæ. — Cum præcedente rarior.

Ordo VI (VIII). ENNEANDRIA.

9. *Mercurialis* L. Bingelurt.

980. *M. 1. perennis* L. (400) caule

simplici fol. scabris. H. 1. 1004. — 4-5. 24.
— In sylvis copiosa.

981. † M. 2. annua L. (...) caule ramoso fol. glabris. H. 1. 1005. — 7-8. ☉. — In hortis, introducta.

10. *Hydrochæris* L. Fröbid.

982. H. morsus Ranæ L. (878). H. 1. 1005. Fol. reniformia integerrima natantia. Fl. albi. — 6-7. 24. — In lacubus, rivulis, fossis turfosis.

Ordo VII (IX). DODECANDRIA.

11. *Stratiótes* L. Krebsklo.

983. S. aloides L. (337). H. 1. 1006. Fol. lineari-lanceolata spinoso-serrata. Fl. albi. — 7-8. 24. — In fossis turfosis. I Gravenen udenfor Vesterport! i Lyngby Mose!*)

*) Finitis jam plantis phanerogamis, ad calcem placet terminos adjicere paucos, quibus explicandis antea occasio aut defuit aut neglecta est.

Calyx = Bæger, sepalum Bægerblad, cal. gamosepalus = c. monosepalus = eenblad et B.

Class. XXIII. CRYPTOGRAMIA.

I. FÍLICES. BRÆGNER*).

1. **Polypódium** L. Engelsöd.

984. P. 1. vulgare L. (1060) fronde
pinnatifida laciniis integris. H. 2. 353. Sori in

Corolla Krone, *petalum* Kronblad, *cor. synpetala* Rchb. = *c. gamopetala* DC. = *monopetala* Autt. = *eenbladet* Krone H. = *sambladet* Krone (*cor. monopetala* est ea cujus petala omnia, uno excepto, abortu desunt).

In capsula semina adfixa sunt *spermatophoro* (quod, si centrale, est autorum *columella* = *Stötten* H.) *Fröstol*, *placentæ* Autt.; cum hoc ea conjungit *spermatopodium*, *Frösträngen* (*funiculus umbilicalis* Autt. *Navlestræng*).

Multa adjectiva descriptiva paullum quoad terminationem mutavi, consulto philologo optimo, ut magis genio lingvæ Romanæ responderent. Quamquam per se intelligentur, tamen hic aliquot notabo, ex quorum analogia cetera explicantur:

bisulcus = *bisulcatus*.

bifolius = *bifoliatus*.

bilabius = *bilabiatus* [*bilabiatus* est *bis labiatus* labiorum numeri nulla habita ratione; *bilabius* autem *labiis duobus instructus*, quod etiam hac voce exprimere volunt botanici].

*) *Sporangium* = capsula H.

apice venulæ superioris. — Floret æstate et autumnno. 24. — In aggeribus lapidosis.

985. P. 2. *Phegopteris* L. (1241)

fronde pinnata pinnis pinnatifidis. H. 2. 355.

Sori in dorso medio venarum venularumve. — 6—8.

24. — In sylvis hic inde.

986. P. 3. *Dryopteris* L. (1943) fronde

ternata foliolis bipinnatis. H. 2. 356. Gracilis.

Sori ut præc. — 7—8. 24. — In sylvis.

2. *Asplenium* L. Radelöv.

987. A. 1. *Trichomanes* L. (119)

fronde pinnata pinnis ovatis crenatis. H. 2.

363. — 6—10 — In aggeribus lapidosis rarius. I

Hareskoven, ved Fuglevad Mølle. Paa Steengjærdet om Skoven ved Ermelund, imod Lyngby o. s. v. (!)

988. A. 1. *septentrionale* Sm. (60)

fronde apice bifida foliolis linearibus apice

bidens (dentibus 2) = *bidentatus* (dentatus dentibus iterum dentatis).

bilocus = *bilocularis*; e. s. p.

semina (in siliqua) *biseriata*; *siliqua ipsa biseriata* (toradet).

anthoclinium paleatum, paleis instructum (*avnet*), non paleaceum, ut vulgo, quod *paleæ simile* quid exprimit (*avnedannet*, *avneagtig*).

subtridentibus. H. 2. 643. Ad muros veteres.
*Ved Fuglevad Mølle Schum. Paa et Gjørde ved
 Farumgaard A. Mörch.*

989. † A. 3. *Ruta muraria* L. (190)
 fronde ternato-decomposita pinnulis subro-
 tundo-cuneiformibus. H. 2. 365. — 7—9. — *Paa
 Nustrup og Bedtofte Kirkemure Kyll.*

3. *Scolopéndrium* Sm. Miltbrægne.

990. † *S. officinarum* Sm. (....).
 H. 2. 366. Frons integra lingvæformis basi cor-
 data. — 7—8. 24. — *Ved Dronninggaard Kyll.*

4. *Athýrium* Roth. Rystebrægne.

991. *A. filix-femina* Roth. (....).
 H. 2. 360 (*Aspidium* Sw.). Frons bipinnata, pin-
 nulæ pinnatifidæ; magnopere variat: *A. molle* Schum.,
trifidum Sch., *ovatum* Sch., *laxum* Sch., *depau-*
peratum Sch. — 7—9. 24. — In sylvis frequens.

5. *Cystópteris* Bernh. Bægerbrægne.

992. *C. l. fragilis* Bernh. (401) fronde
 tripinnata. H. 2. 362 (*Aspidium* Sw.). — 7—8.
 24. — In sylvis aggeribus lapidosis.

993. *C. 2. montana* Link (2187) fronde
 tripinnata. H. 2. 363 (*Aspidium* Sw.). Rarissima:
i en udtørret Ællemose ved Knapstrup Hofm. Bang.

6. *Aspidium* Sw. Mangelöv.

A. Frons decomposita.

994. A. 1. *spinulosum* Sw. (70. 759).
 H. 2. 361. 362 (A. *dilatatum* Sm.). *Lástrea* Presl.
 ut sequentia. Polyp. *Mülleri* Sch., *angustatum*
 Sch. Frons bipinnata pinnulæ argute pinnatifidæ
 laciniis argute serratis; sori in pinnulis hiseriales
 nervo medio adpropinquati. Magnopere variat
 latitudine laciniarum cet. — 7—8. — In sylvis um-
 brosis, humidis, ad sepes frequens.

B. Frons bipinnata v. pinnata pinnis pinnatifidis.

995. A. 2. *filix mas* Sw. (1346) fronde
 bipinnata, pinnulis lato-sublinearibus obtusis
 serratis. H. 1. 360. Sori densi nervo medio ad-
 propinquati. — 7—8. — In sylvis, ad sepes frequens.

996. A. 3. *cristatum* Sw. (1591) fronde
 pinnata pinnis subcordatis pinnatifidis, laciniis
 oblongis obtusis serratis. H. 2. 359. Rarius
 fructif. — 6—7. In sylvis humidis, inter frutices.
*Ved Aæn igjennem Dyrehaven! Törvemosen tæt
 ved Rudersdals Kro Hornem. Ved Birkerød Sch.!*
I Holmegaardsmosen Hornem.

997. A. 4. *Oreópteris* Sw. (1121) fronde
 pinnata, pinnis elongatis acutis pinnatifidis,
 laciniis obtusis subintegerrimis soris margi-

nalibus. H. 2. 359. Pinnæ utrinque magnitudine decrescentes; pulcherrima filix. — 7—8. — In sylvis editis. *Ved Birkerød H.*

998. A. 5. *Thelypteris* Sw. (760) fronde pinnata pinnis pinnatifidis integerrimis, soris confluentibus. H. 2. 358. — 7—8 — In paludosis, fruticetis. *Lyngby Mose.*

7. ***Pteris* L.** Örnebrægne.

999. *P. aquilina* L. (....). H. 2. 367. *Allosorus* aqv. R. Br. Frondes decompositæ. 7—8. In sylvis, ericetis frequens.

8. ***Lomária* Willd.** Kamlöv.

1000. *L. Spicant* Desv. (99). H. 2. 366. (*Blechnum boreale* Sw.) 7—9. — In sylvis editis.

9. ***Struthiopteris* Willd.** Strudsvinge.

1001. *S. europæa* Sw. (169). H. 2. 371. (*S. germanica* Willd.) — 7—8. — In sylvis humidis rarior. *Ved Fredriksborg i Skoven paa den sydvestlige Side af Slottet H. I Hammermølleskoven ved Helsingør! Ved Skjoldnæsholm og Gisselfeldt H. Ved Sparresholm(!)*

10. ***Osmúnda* L.** Kongebrægne.

1002. *O. regalis* L. (317). H. 2. 372. Frons bipinnata pinnulis basi subauriculatis. 7—9.

In sylvis rarior. *Ved Sölleröd (!) Ved Rudersdal og ved Brædderne af tvende Söer ved Landeveien im. Rudersdal og Hirschholm H.*

11. **Botrychium** Sw. Maanerude.

1003. *B. Lunária* Sw. (18). H. 2. 369.

Frons pinnata, pinnæ lunatæ crenatæ. Specimina magna sistunt *B. rutaceum* Hornem. (2. 370.). — 6—8. — In collibus cretaceis. *Ved Brede og Rudergaard H. paa Grøntet ved Töllöse; Tidsvilde H. Möens Klint, ved Maglevandsfaldet, Aborrebjerget!*

12. **Ophioglössum** L. Slangetunge.

1004. *O. vulgatum* L. (147). H. 2. 369.

6—7. — *Imell. Torbæk og Papirsm., ved Brede og Fuursöen H., paa Bakkerne hinsides Fuglevad Mölle! ved Bidstrupgaard H., Storholmen ved Præstö H. Möen: Aborrebjerget!*

II. LYCOPODIACEÆ. ÆLVEFOD-ARTER.

13. **Lycopodium** L. Ælvefod.

A. Flores axillares.

1005. *L. 1. Selágo* L. (104). H. 2. 350.

Fol. 8fariam imbricata. — 7—8. — In sylvis. /

Aldershvile Skov! ved Rudersdal, Tidsvilde, Karlebo Overdrev H.

B. Spicæ terminales.

a. spica solitaria sessilis.

1006. L. 2. inundatum L. (336) fol. integerrimis, spica foliosa. H. 2. 352. Repens 7—8. — In loc. inundatis, ericetis. *Ved Rudersdal og Tidsvilde H.*

1007. L. 3. annotinum L. (127) fol. serrulatis quinquefariis. H. 2. 351. — 7—8. — In sylvis editis. Serta ex eo facta in plateis Hafniæ venduntur.

b. spicæ geminatæ pedunculatæ.

1008. L. 4. clavatum L. (126). H. 2. 349. Repens fol. sparsa serrulata pilifera. — 7—8. In ericetis, sylvis editis.

III. EQUISETACEÆ. PADDEROKKER.

14. *Equisetum* L. Padderokke.

A. Caules uniformes (steriles et fertiles similares) vaginæ dentatæ.

1009. E. 1. hyemale L. (1439) caulib. nudis scaberrimis uniloculis. H. 2. 345. — 7—10. — In sylvis, collinis. *Ved Ørholm! Bræde! Fredriksdal!*

1010. E. 2. *palustre* L. (1183) caul. sulcatis multiloculis, ramis angulatis lævibus. H. 2. 345. — 6—8. — In pratis frequens.

1011. E. 3. *fluviatile* L. (1184) caulib. sulcatis uniloculis ramosis ramis numerosis angulatis elongatis adrectis atrovaginis. H. 2. 345 (E. *limosum* fluviat.). — 7—8. — In paludibus.

1012. E. 4. *limosum* L. (....) caul. præcedentis nudis v. ramis paucis abbreviatis, vaginis viridibus. H. 2. 345 (excl. syn. fl. D.) — 6—8. — In paludibus frequens.

B. Caules bifformes, vaginæ laciniatæ.

a. rami caulium sterilium adrecti v. patentes.

1013. E. 5. *arvense* L. (2001) caule fertili nudo, sterilibus ramosis ramis adrectis sub4angulis. H. 2. 342. — 4—6. — In campis, loc. argill. frequentissimum.

1014. E. 6. *Telmatéja* Ehrh. (1469) caule fertili nudo, ramis sterilium adrectis octangulis. H. 2. 343. — In sylvis humidis. Ved Lethraborg H. 1 Haraldsted Skov ved Ringsted, i Nærheden af Söen og Kilden Aabye. Ved Maglevandsfaldet paa Möen!

1015. E. 7. *umbrosum* L. (1770) caule

fertili demum ramos triquetros patentes emit-
tente (rel. præc.). H. 2. 644. In sylvis.

b. rami ramulique deflexi.

1016. E. 8. *sylvaticum* L. (1182). H.
2. 344. Rami quadranguli ramuli subtrigoni. —
5—6. — In silvis, campis, ad vias.

Appendix.

(P. 165.) 478 b. S. 4. *Téléphium* L. (....)
fol. sparsis ovato-oblongis sessilibus. Rehb.
Cent. VIII. 968. Fl. viridesc. — 7—9. 4. — In
collinis siccis, graminosis. I *Charlottenlund!*

P. 223 ita mutandum:

B. Petioli non auriculati:

a. petala calycem subduplo superantia.

663 a. C. 2. *hirsuta* L. (735). H. 1.
713. (excl. var. *sylvatica* ad C. *amaram* pertinente)
714 (C. *intermedia* Hornem.). Caul. subangulatus,
foliola rad. subrotunda v. suboblonga). — 6—7.
⊙. — Ved *Ulfssund paa Møen Kamp hoven er!*

b. petala calycem superantia.

663 b. C. 3. *amara* L. etc.

INDEX TERMINORUM

quorundam in notis explicatorum.

Achenium 14.

alæ floris papilionacei 239.
 anterior superficies 110.
 anthela 13.
 anthesis 23.
 anthoclinium 55. 250.
 anthodium 14.
 apicalis stylus 22.
 aspergilliforme stigma 22.
 axis 22.
 Basigenum carpidium 72.
 basinervium folium 82.
 bidens 315.
 bifolius 314.
 bilabius 314.
 biloculus 315.
 biserialia semina 315.
 biseriata siliqua 315.
 bisulcus 314.
 bipartibile achenium 57.
 bractæ Cyperacearum 13. 14.
 bractæ graminum 21.
 bracteolæ Cyperacearum 13.
 cf. 285.
 bracteolæ graminum 21.
 Calathium 55. 250.
 calyx graminum 21.
 — scabiosarum 55.
campylospermum 111.
 carnosus fructus (Rosar.) 176.
 carpidium 57.

carpophorum 110.

caryopsis 14.
 columella 314.
 commissura 110.
 commissurale planum 110.
 commissurales costæ 110.
 contiguæ spiculæ 46.
 contigui rami 46.
 contiguus racemus 76.
 coriaceus fructus (Ros.) 176.
 corticata caryopsis 23.
 costæ (Unibellif.) 110.
cremocarpium 111.
 cymba 239.
 Diclinum heterogamum calathium 251.
 — homogamum calathium 251.
 discalæ flores 250.
 discoideum calathium 250.
 discretus racemus 76.
 discus 71. 250.
 disepalus calyx 21.
 distantes spiculæ 46.
 dorsales costæ 110.
 dorsum (fr. Umb.) 110.
 drupacea caryopsis 71.
 drupaceus fructus 57.
 Epigynus discus 110.
 Filiforme stigma 22.
 flores synanthearum 250.

- flosculi* 250.
 frons Lemnarum (et filicum) 2.
funiculus umbilicalis 314.
Gamopetala corolla 314.
gamosepalus calyx 314.
gynophorum 71.
gynostemium 272.
heterogamum calathium 251.
homogamum calathium 251.
hypocrateroides corolla 72.
hypogynæ setæ 13.
hypogynus discus 71.
Infundibularis corolla 72.
interior superficies 110.
interstitia 110.
intramarginales costæ 110.
involucrum Cyperac. 14.
Labellum orchidearum 272.
laterales costæ 110.
lateralis stylus 22.
laterinervium folium 81.
lomatohizeus embryo 215.
Marginales flores 250.
marginantes costæ 110.
margo (fr. Umb.) 110.
monocellnum heterogamum calathium 251.
 — *homogamum calathium* 251.
monopetala corolla 314.
monosepalus calyx 314.
Notorhizeus embryo 215.
nucleatum carpidium 111.
Obtectæ vittæ 111.
oligocalathius caulis 251.
ovarium 22.
Palcaceus 315.
palcæ 250.
paleatum anthoclinium 250.315.
periclinium 55. 250.
perigynium 284.
pilosum anthoclinium 250.
placenta 314.
platyspermum carpidium 111.
plumosum stigma 22.
posterior superficies 110.
præcox fructus 176.
primaria inflorescentia 14.
primariæ costæ 110.
ptychorhizeus embryo 215.
pulposus fructus 176.
Quadrupartibile schizocarpi-um 72.
Radiales flores 250.
radians calathium 250.
radius calathii 250.
raphe 110.
Secundariæ costæ 110.
secundaria inflorescentia 14.
sepalum 313.
 — *Ranunculacearum* 190.
serotinus fructus 176.
sesquiflora spicula 21.
siccis fructus 57.
solenospermum carpidium 111.
solidum carpidium 111.
spermatophorum 314.
spermatopodium 314.
spica Cyperacearum 13.
spicula graminum 21.
spirolobæ 215.
sporangium 314.
spuria spica 22.
spurie terminalis 14.
stylopodium 110.
succosa caryopsis 72.
succosus fructus 57.
superficiales vittæ 111.
synpetala corolla 314.
syzyganthium 283.
Terminalis anthela 14.
Umbilicalis funiculus 314.
uniflora spicula 21.
Vallecula 110.
valvulæ 140 obs.
vexillum floris papilionacei 239.
vittæ (oleifere) 111.

INDEX NOMINUM

genericorum receptorum synonymorumque.

Litteris rectis indicantur nomina generica recepta,

— *cursivis* synonyma,

— nonpareil dictis genera sub quibus militant species antea sub nomine præcedente comprehensæ. In adferendis his synonymis præcipua ratio habita est editionis tertiæ operis cl. *Hornemanni*: *Dansk Oekonomisk Plantelære*, dicti.

A.

Aakande 189.

Abies 305.

Acer 150.

Achillæa 270.

Aconitum 190.

Acorus 124.

Actæa 188.

Adoxa 153.

Ægopodium 115.

Æthusa 117.

Aftenstjerne 224.

Agermaane 171.

Agrimonia 171.

Agropyrum 47.

Agrostemma 166.

Agrostis 25.

Aira 32.

(cfr. Avena, Avenella, Catambrosa, Koeleria, Corynephorus.)

Ajuga 207.

Akkeleie 191.

Alant 268.

Alchemilla 52.

Alectorolophus 209.

Alisma 145.

- Allium* 136.
Allosorus 318.
Alnus 301.
Alopecurus 23.
Alsine 163.
 (cfr. *Stellaria*.)
Alsinella 163.
Althæa 232.
Alyssum 218.
Ammophila 28.
Anagallis 81.
Anchusa 75.
Andemad 2.
Andromeda 154.
Anemone 197.
Angelica 113.
Antennaria 265.
Anthemis 271.
Anthericum 136.
Anthoxanthum 29.
Anthriscus 109.
Anthyllis 236.
Antirrhinum 212.
 (cfr. *Linaria*.)
Apargia 251.
Apium 115.
Aquilegia 191.
Arabis 220.
 (cfr. *Sisymbrium*.)
Aracium 253.
Arbutus 155.
Arctium 259.
Arctostaphylos 155.
Arenaria 163.
 (cfr. *Halianthus*.)
Armeria 120.
Armoracia 220.
Arnica 267.
Arrhenatherum 30.
Artemisia 263.
Arve 81.
Arum 304.
Arundo 26—29.
Asarum 171.
Asclepias 108.
Ask 2.
Asperugo 74.
Asperula 58.
Aspidium 318.
 (cfr. *Athyrium*, *Cystopteris*.)
Asplenium 315.
Aster 268.
Asterocephalus 56.
Astragalus 242.
Athyrium 316.
Atriplex 105.
 (cfr. *Halimulus*.)
Avena 30.
Avenella 32.
Avl 175.
Avnbög 304.
Avnknippe 15.

B.

- Bakkestjerne* 269.
Baldingera 25.
Baldrian 11.
Ballota 205.
Balsamin 97.
Barbaræa 223.
Barsvæg 204.
Bartschia 211.
Bede 105.
Beenved 62.

- Bellis 269.
 Berberis 138.
 Berle 116.
 Berula 116.
 Beta 105.
 Betonica 202.
 Betula 304.
 Bidens 262.
 Bingelurt 313.
 Birk 304.
 Bittermælk 252.
 Björneklo 113.
 Blaabær 147.
 Blaastjerne 57.
 Bladhoved 260.
Blechnum 318.
 Blitum 104.
 Blysinus 15.
 Blærerod 4.
 Boghvede 152.
 Borago 75.
 Borst 251.
 Botrychium 319.
 Braadfrø 305.
 Brachyolobus 220.
 Brachypodium 46.
 Brandbæger 265.
 Brassica 226.
 Bridurt 99.
 Briza 33.
Bromochloa 43.
 Bromus 37.
 (cfr. *Festuca*.)
 Brudelys 154.
 Brunrod 213.
 Bryonia 306.
 Brændeskjærm 116.
 Bröndkarse 224.
 Bröndsel 262.
 Bukkeblad 88.
 Bulliarda 71.
 Bulme 87.
 Bunias 216.
 Bunke 32.
 Bunkehavre 32.
 Buplevrum 114.
 Burre 259.
 Busmekker 115.
 Byg 50.
 Bynke 263.
 Bægerbrægne 316.
 Bændeltang 281.
 Bævregræs 33.
 Bøg 304.
 Börsteax 51.

 C.
 Cakile 215.
 Calamintha 206.
 Calla 281.
 Callitriche 281.
 Calluna 146.
 Caltha 198.
 Camelina 221.
 Campanula 91.
 Cannabis 311.
 Capsella 218.
 Cardamine 222; 322.
 Carlina 258.
 Carduus 261.
 (cfr. *Cirsium*, *Silybum*.)
 Carex 284.
 Carpinus 304.
 Carum 115.
 Catabrosa 39.

- Caucalis* 109.
 (cfr. *Torilis*.)
Centaurea 271.
Centinodium 151.
Centunculus 55.
Cephalanthera 277.
Cerastium 167.
Cerasus 173.
Ceratophyllum 303.
Charophyllum 111.
 (cfr. *Anthriscus*.)
Chamænerium 148.
Chamæplium 225.
Chelidonium 187.
Chenopodium 100.
 (cfr. *Blitum*, *Schoberia*.)
Chrysanthemum 269.
Chrysosplenium 157.
Cichorium 251.
Cicuta 116.
Cineraria 267.
Circæa 3.
Cirsium 260.
Cistus 189.
Cladium 15.
Clinopodium 206.
Cnidium 116.
Cochlearia 219.
 (cfr. *Armoracia*.)
Cochlidiosperma 5.
Codonoprasum 137.
Coeloglossum 276, 277.
Comarum 183.
Conium 112.
Convallaria 132.
 (cfr. *Majanthemum*, *Polygonatum*.)
Convolvulus 83.
- Corallorrhiza* 277.
Cornus 62.
Corylus 304.
Corydalis 233.
Corynephorus 32.
Corvisartia 268.
Cracca 213.
Crambe 216.
Cratægus 174.
Crepis 252.
Cuscuta 62.
Cynanchum 108.
Cynoglossum 74.
Cynosurus 45.
Cyperus 11.
Cystopteris 316.

D.

- Dactylis* 44.
Datura 86.
Delphinium 190.
Dentaria 223.
Desmerurt 153.
Dianthus 158.
Dichostylis 17.
Digitalis 212.
Digraphis 25.
Dipsacus 55.
Dodder 221.
Draba 218.
Draphavre 30.
Drosera 123.
Druehyacinth 134.
Druemunke 188.
Ducurt 148.
Dunhammer 284.
Dyndurt 213.

E.

Echinops 272.
 Echinosperrnum 71.
 Echium 71.
 Edderkopurt 137.
 Eeg 304.
 Elatine 152.
 Elsholzia 201.
 Elymus 50.
 Empetrum 310.
 Ene 311.
 Engblomme 198.
 Engelsöd 314.
Enodium 40.
 Entian 88.
 Epigogium 280.
 Epilobium 148.
 (cfr. Chamænerium.)
 Epipactis 279.
 (cfr. Cephalanthera.)
 Equisetum 320.
 Eranthis 198.
 Erica 146.
 (cfr. Calluna.)
 Erigeron 269.
 Eriophorum 18.
 (cfr. Limnochloa.)
 Erodium 227.
 Eryngium 119.
 Erysimum 224.
 (cfr. Barbaræa, Chamæ-
 plium, Sisymbrium).
 Erythræa 89.
 Esparsette 242.
 Euonymus 62.
 Eupatorium 261.
 Euphorbia 283.

Euphrasia 210.
 Evighedsblomst 565.

F.

Faareleger 120.
 Fagopyrum 152.
 Fagus 301.
 Fedia 12.
 Femling 169.
 Festgræs 29.
 Festuca 41.
 (cfr. Brachypodium, Trie-
 dia, Vulpia.)
 Ficaria 191.
 Fiirblad 153.
 Fiirling 170.
 Filago 264.
 Fladax 14.
 Fladbælle 245.
 Fladknap 272.
 Fladstjerne 161.
 Fliglæbe 276.
 Flipkrave 216.
 Flitterax 33.
 Fnokurt 267.
 Fodangel 109.
 Foldfrø 112.
 Forgjetmigei 76.
 Fragaria 183.
 Fraxinus 2.
 Fredlös 81.
 Fritillaria 134.
 Fröbid 313.
 Fröstjerne 195.
 Fugleklo 242.
 Fugleknude 151.
 Fugleliim 310.

Fuglemælk 136.
 Fuglerede 278.
 Fumaria 232.
 Fyr 305.
 Fölfod 263.

G.

Gaasefod 100.
 Gaasemad 222.
 Gabeklap 225.
 Gagea 134.
 Galanthus 133.
 Galdebær 306.
 Galeobdolon 204.
 Galeopsis 201.
 Galium 58.
 Galtetand 202.
 Gedeblad 93.
 Gederams 148.
 Gedeskjæg 258.
 Gentiana 88.
 Geranium 277.
 (cfr. *Erodium*.)
 Geum 186.
 Gifttyde 116.
 Gjæslingblomst 218.
 Gjögemad 230.
 Gjögourt 273.
 Glaux 83.
 Glechoma 203.
 Glyceria 40.
 (cfr. *Catabrosa*, *Heleo-*
 chloa.)
 Gnaphalium 265.
 (cfr. *Filago*, *Antennaria*,
 Helichrysum.)
 Godtraad 145.

Gran 305.
 Gulddusk 83.
 Guldstjerne 134.
 Gulerød 112.
 Guulax 29.
 Gyclqvæler 214.
 Gyldenriis 268.
 Gymnadenia 275.
 Gypsophila 159.
 Gypsur 159.
 Gyvel 235.

H.

Habenaria 277.
 Halianthus 163.
 Halimus 108.
 Halvsvøb 117.
 Hamp 311.
 Hanekro 201.
 Haremad 251.
 Hareøre 114.
 Hassel 304.
 Havre 30.
 Havtorn 174.
 Hedera 98.
Hedysarum 242.
 Heire 37.
 Heleocharis 16.
 Heleochloa 39.
 Heleogeton 20.
 Helianthemum 189.
 Helichrysum 265.
 Helleborus 198.
 Helosciadium 114.
 Hepatica 197.
 Heracleum 113.
 Herminium 276.

Herniaria 99.
 Hesperis 224.
 Hestegræs 29.
 Hestehov 262.
 Hieracium 254.
 (cfr. Crepis, Aracium.)

Hierochloa 29.
 Himantoglossum 276.

Hippochæris 255.

Hippophae 311.

Hippuris 1.

Hjertelæbe 280.

Hjertespad 205.

Hjorterod 118.

Hjortetröst 261.

Hjelme 28.

Hjörneklap 224.

Holcus 29.

(cfr. Hierochloa, Arrhenatherum.)

Holosteum 52.

Hordeum 50.

Hornblad 303.

Hottonia 81.

Humle 311.

Humulus 311.

Hundegræs 44.

Hundetunge 74.

Huullæbe 247.

Huulsvøb 111.

Hvene 25.

Hyacinthus 134.

Hydrochæris 313.

Hydrocotyle 118.

Hyld 119.

Hyoscyamus 87.

Hypericum 248.

Hyrdetaske 218.

Hængeblomst 257.

Högeskjæg 252.

Högeurt 254.

Hönsetarm 167.

Hör 123.

Hörsilke 62.

I.

Jacobsurt 266.

Jacobæa 266.

Jasione 90.

Jernurt 208.

Impatiens 97.

Inula 268.

Jordbær 183.

Jordrög 232.

Iris 13.

Isolepis 20.

Juncus 126.

Juniperus 311.

K.

Kaal 224.

Kabbeleie 198.

Kalaminthe 206.

Kalmus 124.

Kamgræs 45.

Kamille 271.

Kamlöv 318.

Kantbælle 241.

Kantfrö 17.

Karline 258.

Karse 217.

Kartebolle 55.

Katost 231.

Kattefød 265.

Kattehale 170.

Katteurt 203.

Kiddike 221.
 Kilebæger 47.
 Kirsebærtræ 173.
 Kjællingtand 240.
 Kjøruld 18.
 Klaseskjærm 117.
 Klinte 166.
 Klokke 91.
 Klynger 179.
 Kløftnaal 216.
 Klöver 236.
 Klövkrone 167.
 Knavel 157.
 Knopurt 271.
 Knælæbe 280.
 Kobjælde 197.
 Koshia 100.
 Kodriver 79.
 Koeleria 32.
 Koføde 209.
 Kogleax 19.
 Kokleare 219.
 Kommen 115.
 Kongebrægne 318.
 Kongelys 84.
 Kongepen 255.
 Konval 132.
 Koralrod 277.
 Korneel 62.
 Korsknop 203.
 Kortlæbe 207.
 Kortnæb 111.
 Kortskulpe 220.
 Kragefod 183.
 Krageklo 235.
 Krandsbørste 206.
 Krap 61.
 Krebsklo 313.

Krøgnaal 218.
 Krop 12.
 Kræge 172.
 Krækling 310.
 Kulsukker 76.
 Körvel 109.

L.

Lactuca 256.
 Lamium 203.
 Langnæb 109.
 Lappa 259.
 Lapsana 250.
 Larix 305.
 Laserpitium 112.
 Lastrea 317.
 Lathræa 214.
 Lathyrus 245.
 Lemna 2.
 Leontodon 256.
 Leonurus 205.
 Lepidium 217.
 Lepturus 51.
 Leverurt 120.
 Levisticum 111.
 Libanotis 118.
 Ligusticum 114.
 Limnæchloa 18.
 Limonurt 121.
 Limosella 213.
 Linaria 212.
 Lind 189.
 Linum 123.
 Listera 278.
 Lithospermum 72.
 Littorella 302.
 Lobelia 90.

- Lolium 49.
 Lomaria 318.
 Lonicera 93.
 Loppeurt 267.
 Lostilk 114.
 Lotophyllum 238.
 Lotus 240.
 Lunaria 218.
 Lungeurt 73.
 Luzula 175.
 Lychnis 166.
 Lycopodium 319.
 Lycopsis 75.
 Lycopus 4.
 Lyng 146.
 Lysimachia 81.
 (cfr. Naumburgia.)
 Lythrum 170.
 Læbelös 207.
 Lærkespore 233.
 Lærketræ 305.
 Lög 136.
 Lövefod 52.
 Lövemule 212.
 Lövetand 256.
 IV.
 Maanerude 319.
 Maianthemum 52.
 Maiblomst 52.
 Malachium 167.
 Malaxis 280.
 Malus 175.
 Malva 231.
 Mandstro 119.
 Mangelöv 317.
 Marchalm 50.
 Marietidsel 259.
 Marrubium 205.
 Matricaria 270.
 Medicago 241.
 Meelbær 155.
 Melampyrum 208.
 Melica 33.
 (cfr. Molinia.)
 Melilotus 239.
 Mentha 199.
 Menyanthes 88.
 Mercurialis 313.
 Merian 201.
 Miliegræs 28.
 Miliun 28.
 Miltbrægne 316.
 Milturt 157.
 Mjödurt 174.
 Molinia 40.
 Monotropa 155.
 Montia 51.
 Mosetot 18.
 Munke 90.
 Munkekrone 270.
 Muscari 134.
 Musehale 124.
 Museurt 264.
 Mycelis 257.
 Mynte 199.
 Myosotis 76.
 (cfr. Echinosperrum.)
 Myosurus 124.
 Myrica 311.
 Myriophyllum 303.
 Myrrhis 111.
 Myrtillus 147.
 Mysike 58.
 Mysse 281.

Mælde 105.
Mælkurt 231.
Mærke 116.

N.

Naalebæger 99.
Narcissus 133.
Nardus 51.
Nasturtium 221.
(cfr. *Brachyolobus*.)
Natlys 150.
Natskygge 87.
Naumburgia 83.
Nellike 158.
Nellikero 186.
Neottia 278.
Nepeta 203.
Neslia 221.
Norel 163.
Nuphar 189.
Nymphæa 189.
(cfr. *Nuphar*.)
Nyserod 198.
Næbfrø 15.
Nælde 302.
Nöglekurv 265.
Nökkero 189.

O.

Odontites 211.
Oenanthe 117.
Oenothera 150.
Onobrychis 242.
Ononis 235.
Onopordon 259.
Ophioglossum 319.

Ophrys 276.

(cfr. *Herminium*, *Spiranthes*, *Corallorhiza*, *Neottia*, *Listera*.)

Orchis 273.

(cfr. *Platanthera*, *Gymnadenia*.)

Origanum 201.

Ornithogalum 136.

(cfr. *Gagea*.)

Ornithopus 242.

Orobanche 214.

Orobis 216.

Osmunda 318.

Oxalis 230.

Oxetunge 75.

Oxcoie 269.

Oxycoccus 147.

P.

Padderokke 320.

Panicum 21.

Papaver 188.

Paris 153.

Parietaria 53.

Parnassia 120.

Pastinaca 113.

Peberrod 220.

Pengeurt 216.

Peplis 138.

Perikon 248.

Petasites 262.

Pencedanum 112.

Phalaris 25.

Phellandrium 118.

Phleum 21.

Phragmites 29.

Phyteuma 93.

Pieris 252.
Pigfrö 74.
Pigæble 86.
Piil 306.
Piilblad 302.
Pileurt 138.
Pimpinella 115.
Pindsvinknop 283.
Pingvicula 4.
Pinus 305.
 (cfr. *Abies*, *Larix*.)
Pisum 247.
 (cfr. *Lathyrus*.)
Plantago 53.
Platanthera 272.
Poa 34.
 cfr. *Triodia*, *Glyceria*, *Heleochoa*.)
Polygala 234.
Polygonatum 132.
Polygonum 138.
 (cfr. *Centinodium*, *Tiniaria*, *Fagopyrum*.)
Poppel 312.
Populus 312.
Pors 311.
Poselæbe 276.
Potamogeton 65.
Potentilla 183.
Pragtstjerne 166.
Prenanthes 257.
Primula 79.
Prunella 207.
Prunus 172.
 (cfr. *Cerasus*.)
Pteris 318.
Psyllophora 285.
Pukkellæbe 276.

Pulicaria 267.
Pulmonaria 73.
Pulsatilla 197.
Pyrethrum 270.
Pyrola 155.
Pyrus 175.
 (cfr. *Malus*, *Sorbus*.)
Pæretræ 175.

Q.

Qvalkved 119.
Qvercus 304.
Qvikgræs 47.

R.

Radax 15.
Radioia 71.
Raigræs 49.
Ranunculus 191.
 (cfr. *Ficaria*.)
Rapgræs 33.
Raphanistrum 221.
Raphanus 221.
Rapistrum 221.
Rapunzel 93.
Ravnesod 217.
Regnfand 263.
Remlæbe 277.
Reseda 171.
Rhamnus 94.
Rhynchospora 15.
Ribes 97.
Ribs 97.
Ridderspore 190.
River 74.
Rosa 176.

- Rottboeltia* 51.
Rottehal 21.
Rubia 61.
Rubus 179.
Rundbælle 236.
Rundskulpe 221.
Ruppia 64.
Rævehale 23.
Röllike 270.
Rön 175.
Rörgræs 25.
Rörhvene 26.
- S.**
- Sagina* 170.
Sagittaria 302.
Salicornia 1.
Salix 306.
Salsola 100.
 (cfr. *Kochia*.)
Salturt 1.
Sambucus 119.
Samel 83.
Samolus 83.
Sandkryb 83.
Sandvaaner 163.
Sanicula 118.
Sannikel 118.
Saponaria 160.
Sarothamnus 235.
Satyrium
 (cfr. *Himantoglossum*, *Habenaria*, *Epigogium*.)
Saxifraga 157.
Scabiosa 56.
Scandix 109.
 (cfr. *Anthriscus*, *Myrrhis*.)
Schedonorus 42.
- Schelhammera* 286.
Scheuchzeria 144.
Schoberia 100.
Schoenus 13.
 (cfr. *Rhynchospora*, *Blysmus*.)
Scirpus 20.
 (cfr. *Heleocharis*, *Limnochloa*, *Dichostylis*, *Blysmus*.)
Scleranthus 157.
Scorzonera 258.
Scrophularia 213.
Scutellaria 208.
Sedum 164.
Seglrod 132.
Selinum 114.
 (cfr. *Calidum*, *Peucedanum*.)
Sellerie 115.
Sempervivum 172.
Senebiera 217.
Senecio 269.
 (cfr. *Jacobæa*.)
Sennep 226.
Serapias
 (cfr. *Cephalanthera*, *Epipactis*.)
Serratula 258.
Setaria 21.
Sherardia 57.
Silene 166.
Silybum 259.
Simmer 197.
Sinapis 226.
 (cfr. *Brassica*.)
Sison 114.
Sisymbrium 225.
 (cfr. *Brachyolobus*, *Nasturtium*, *Chamaepium*.)

- Sium 116.
 (cfr. Berula.)
 Siv 126.
 Skarntyde 112.
 Skedeknæ 151.
 Skjaller 209.
 Skjolddrager 208.
 Skjælrod 214.
 Skjæne 14.
 Skjær 258.
 Skjærmax 21.
 Skjærmille 114.
 Skovstjerne 146.
 Skrueax 277.
 Skræppe 110.
 Slangehoved 71.
 Sneglebælle 241.
 Snekløkke 133.
 Snerle 83.
 Snerre 58.
 Snylterod 155.
 Sodaurt 100.
 Solanum 87.
 Soldug 123.
 Solidago 268.
 Solöie 189.
 Sonchus 257.
 Sorbus 175.
 Sparganium 283.
 Spartium 235.
 Spergella 169.
 Spergula 169.
 (cfr. Spergella.)
 Spidsgab 52.
 Spidshale 51.
 Spiræa 174.
 Spiranthes 277.
 Springklap 222.
 Springknap 53.
 Stachys 202.
 Star 284.
 Statice 121.
 Steenbræk 157.
 Steenfrø 72.
 Steenklöver 239.
 Steenurt 264.
 Steffensurt 3.
 Stellaria 161.
 Stilkax 46.
 Stolthendrik 104.
 Storkenæb 227.
 Stormhat 190.
 Strandarve 163.
 Strandbo 302.
 Strandvaaner 215.
 Stratiotes 313.
 Succisa 57.
 Sumprod 279.
 Sumpstraa 16.
 Svalerod 108.
 Svaleurt 187.
 Svinemælk 257.
 Svingel 41.
 Svovlrod 112.
 Sylskulpe 225.
 Symphytum 76.
 Sæbeurt 160.
 Sækbager 218.

T.
 Taarnurt 222.
 Tagrör 29.
 Takkeklap 216.
 Tanacetum 263.
 Tandbæger 205.

Tandbælg 32.
 Tandrod 223.
 Taraxacum 256.
 Teesdalia 216.
 Teucrium 207.
 Thalictrum 195.
 Thesium 99.
 Thlaspi 216.
 (cfr. Capsella, Lepidium.)
 Thymus 205.
 Thyrsanthus 83.
 Tidse 311.
 Tidsel 261.
 Tidselkugle 272.
 Tilia 189.
 Timian 205.
 Tiniaria 151.
 Torilis 109.
 Tormentilla 184.
 Tornblad 234.
 Torskemund 212.
 Traadspore 275.
 Tragopogon 258.
 Tranebær 147.
 Tranehals 227.
 Trehage 144.
 Trichophorum 18.
 Trientalis 146.
 Trifolium 236.
 Triglochin 144.
 Triodia 32.
 Triticum 47.
 Troidurt 211.
 Trollius 198.
 Tulipa 134.
 Turritis 222.
 (cfr. Arabis.)
 Tusindblad 303.

Tusindfryd 269.
 Tusindfrø 71.
 Tusindgylden 89.
 Tussilago 263.
 (cfr. Petasites.)
 Tveblad 171.
 Tvetand 203.
 Typha 284.
 Tyltebær 147.

U.

Ulex 234.
 Ulmus 100.
 Urtica 302.
 Utricularia 4.

V.

Vaccinium 147.
 (cfr. Myrtillus, Oxycoccus.)
 Valeriana 11.
 Valmue 168.
 Vandax 64.
 Vandkryber 138.
 Vandnavle 118.
 Vandstjerne 282.
 Vau 171.
 Vedbende 98.
 Veibred 53.
 Verbascum 84.
 Verbena 208.
 Veronica 5.
 Vibefedt 4.
 Viburnum 119.
 Vicia 242.
 Vikke 242.
 Vindax 26.

Vinterblomme 198.

Vintergrön 155.

Vinterkarse 223.

Viscaria 166.

Viscum 310.

Volverlei 267.

Vortemælk 283.

Vorterød 191.

Vrietorn 94.

Vulpia 45.

Væselhale 45.

X.

Xanthium 305.

Z.

Zannichellia 282.

Zostera 281.

Æ.

Æl 301.

Elm 100.

Ærenpriis 5.

Ært 247.

Æselsfoder 259.

Ö.

Öientröst 210.

Örneöie 253.

ERRATA.

- P. 110 not. l. 16 pro: circumsribens, repono:
circumscribens.
- 111 not. l. 3 pro: scetione, repono: sectione.
- 182 l. 11 pro: corylifoilus — corylifolius.
- 187 l. 3 a basi pro: Svalerod — Svalert.
- 205 l. 2 a basi pro: Serphyllum — Serpyllum.
- 226 l. 8 a basi pro: convasissimum me, repono:
persvasissimum mihi.
- 263 l. 12 pro: Bunke, repono: Bynke.
- 269 post 41 *Chrysanthemum* L. *Oreöie* in-
serendum:
A. Fl. radiales lutei.
- 284 not. l. 3 a basi pro: Carieum, repono:
Caricum.
- 285 not. l. 6 a basi pro: Cariees, repono: Carices.
- — not. l. 9 a basi pro: bracteola, repono:
bracteolæ.
-



